

## (18) ガビチョウ

鳥綱

分類：スズメ目チメドリ科ガルルラクス属

学名：*Garrulax canorus*

### ■原産地と分布


中国南部（揚子江溪谷）からベトナム北部、ラオス北東部にかけて、海南島の山間部、台湾

### ■形態的特徴


全長21～24cm、ツグミ大の鳥。全体的に明るい茶色で、頭頂部や後頸、喉、胸などに暗褐色の縞模様がある尾羽は黒褐色嘴と肢は暗黄色目の周りから後頸に伸びた白色の模様が目立つオスとメスとで体の大きさ羽色に違いはほとんどない。




### ■静岡県内全域の分布情報（2次メッシュ）




■各地の分布情報（3次メッシュ）  
523820




523821




523827




523832




523836




523837




523847




523853




523855




523856




523857




523864



523865




523866







523874




523875




523877




523920




523930




523940




523950




533804



533805



533807



## (19) カオジロガビチョウ

鳥綱

分類：スズメ目チメドリ科ガルルラクス属

学名：*Garrulax sannio*

### ■原産地と分布

インド東北部から中国中・南部、ミャンマー北東部、ラオス北部、ベトナム北部にかけて

### ■形態的特徴

全長 22～24cm、ツグミ大の鳥。全体的に褐色で、頭頂部および下腹部、尾羽は鮮やかなこげ茶色。眉と頬は淡黄白色で目の前でつながり特徴的な模様を形成するオスとメスとで体の大きさ羽色に違いはほとんどない。

### ■静岡県内全域の分布情報（2次メッシュ）

情報なし。

## (20) カオグロガビチョウ

鳥綱

分類：スズメ目チメドリ科ガルルラクス属

学名：*Garrulax perspicillatus*

### ■原産地と分布

中国南部からインドシナにかけて

### ■形態的特徴

全長 28～31.5cm、ヒヨドリ大の大きさ。全体的に灰褐色で、目の周囲は黒色。頭頂、頸、喉、上胸は灰褐色で、背は鈍い褐色。オリーブ褐色の尾は円筒状で長く、下尾筒は明るい茶褐色。オスとメスとで体の大きさ、羽色に違いはほとんどない。

### ■静岡県内全域の分布情報（2次メッシュ）

情報なし。