

(50) ブルーギル

魚類

分類：スズキ目サンフィッシュ科ブルーギル属

学名：*Lepomis macrochirus*

■原産地と分布


原産地は北アメリカ（メキシコ北東部～アメリカ合衆国東部）。現在では、移植により、日本を含む世界各地に生息する。

■形態的特徴


体高が高い。口は小さく、顎の後端は眼の前縁下付近に達する程度。鼻孔は2対。側線（そくせん）は体背側の輪郭にほぼ平行してゆるやかにカーブし、頭部から尾鰭（おびれ）の“付け根”まで連続する。背鰭（せびれ）中央付近には“へこみ”がほとんどない。胸鰭（むなびれ）は長い。尾鰭の後縁はごくあさく湾入する。鱗は細かく、側線鱗数は40～44。体は淡灰褐色で、体側に7～10本ほどの暗色横帯がはいる。鰓蓋（えらぶた）の後端に青みがかかる暗色の丸い突出部がある。最大で全長41cmのものも報告されているが、ふつうは25cm程度まで。




■静岡県内全域の分布情報（2次メッシュ）



■各地の分布情報（3次メッシュ）
513776




523705




523706




523707




523715




523716




523717




523726




523727




523756




523800




523801




523810




523811




523820




523822




523830




523833




523843



523857



523930



(51) コクチバス

魚類

分類：スズキ目サンフィッシュ科オクチバス属

学名：*Micropterus dolomieu*

■原産地と分布


原産地は北アメリカ（アメリカ合衆国東部）。現在では、移植により、日本を含む世界各地に生息する。

■形態的特徴

体高が低い。口は大きく、顎の後端は眼の中央下付近にまで達するが、眼の後縁下を超えることはない。下顎は上顎よりも前につきだす。鼻孔は2対。側線（そくせん）は体背側の輪郭にほぼ平行してゆるやかにカーブし、頭部から尾鰭（おびれ）の“付け根”まで連続する。背鰭（せびれ）中央付近の“へこみ”はそれほど深くない。胸鰭はそれほど長くない。尾鰭の後縁はごくあさく湾入する。鱗は細かく、側線鱗数は68～81。体は茶褐色で、背部はやや暗色がかかり、腹部は白色にちかい。ふつう体側に多数の不明瞭な暗色横帯がはいる。最大で全長69cmのものも報告されているが、ふつうは50cm程度まで。



■静岡県内全域の分布情報（2次メッシュ）



■各地の分布情報（3次メッシュ）

523717

