

## 【難治性の肝炎のうち劇症肝炎】

### 1 主要項目

- (1) 劇症肝炎とは、肝炎のうち初発症状出現後 8 週間以内に高度の肝機能異常に基づいて昏睡Ⅱ度以上の肝性脳症をきたし、プロトロンビン時間が 40% 以下を示すものとする。
- (2) 肝性脳症の昏睡度分類は犬山分類（1972 年）に基づく。（表 1）

### 2 参考所見

- (1) 症状出現後 10 日以内に脳症が発現する急性型と、11 日以降に発現する亜急性型がある。
- (2) 成因分類は「難治性の肝疾患に関する研究班」の指針（2002 年）に基づく。（表 2）

表1：肝性脳症の昏睡度分類

昏睡度	精神症状	参考事項
I	睡眠・覚醒リズムの逆転 多幸気分、ときに抑うつ状態 だらしなく、気にとめない態度	retrospective にしか判定できない場合も多い
II	指南力（とき・場所）をとり違える（confusion） 異常行動（例：お金をまく、化粧品をゴミ箱に捨てるなど） ときに傾眠状態（普通の呼びかけで開眼し、会話ができる） 単純な言動があつたりするが、医師の指示には従う態度をみせる	興奮状態がない 尿、便失禁がない 羽ばたき振戦あり
III	しばしば興奮状態、せん盲状態を伴い、反抗的態度をみせる 嗜睡状態（ほとんど眠っている） 外的刺激で開眼しうるが、医師の指示には従わない、又は従えない（簡単な命令には応じる）	羽ばたき振戦あり 指南力障害は高度
IV	昏睡（完全な意識の消失） 痛み刺激に反応する	刺激に対して、払いのける動作、顔をしかめる
V	深昏睡 痛み刺激に反応しない	

表2：劇症肝炎の成因分類

I. ウイルス型	
1) A型 IgM-HA 抗体陽性	
2) B型 HBs 抗原、IgM-HBc 抗体、HBV-DNA の何れかが陽性	
・急性感染：肝炎発症前にHBs抗原陰性が判明している症例	
・急性感染（疑）：肝炎発症前後のウイルス指標は不明であるが、IgM-HBc抗体が陽性かつHBc抗体が低力値（血清200倍希釈での測定が可能な場合は80%未満）の症例	
・キャリア：肝炎発症前からHBs抗原陽性が判明している症例	
・キャリア（疑）：肝炎発症前後のウイルス指標は不明であるが、IgM-HBc抗体陰性ないしHBc抗体が高力値（血清200倍希釈での測定が可能な場合は95%以上）の何れかを満たす症例	
・判定不能：B型で上記の何れをも満たさない症例	
3) C型 肝炎発症前はHCV抗体陰性で、経過中にHCV抗体ないしはHCV-RNAが陽性化した症例あるいは肝炎発症前のHCV抗体は測定されていないが、HCVコア抗体が低力値で、HCV-RNAが陽性の症例	
4) E型 HEV-RNA陽性	
5) その他 (TTV, EBVなど)	
II. 自己免疫性	
1) 確診 AIH 基準を満たす症例またはステロイドで改善し、減量、中止後に再燃した症例	
2) 疑診 抗核抗体陽性またはIgG 2,000mg/d・でウイルス性、薬剤性の否定された症例	
III. 薬物性 臨床経過またはD-LSTより薬物が特定された症例	
IV. 成因不明 十分な検査が実施されているが、I～IIIの何れにも属さない症例	
V. 分類不能 十分な検査が実施されていない症例	