

# コロナワクチン 本県のアナフィラキシー報告(～4/16)

| No. | 性別 | 年代 | 接種日   | 接種回数 | アレルギー 既往             | 接種～発症 | 症状   | 治療                 | 症状程度入院             | 転帰 | ブライトン分類 |
|-----|----|----|-------|------|----------------------|-------|--|--------------------|--------------------|----|---------|
| 1   | 女  | 50 | 3月13日 | 1    | アトピー性皮膚炎             | 9分    | 呼吸困難・喉のつかえ・嘔気⇒結膜充血、眼瞼腫脹<br>※血圧・SpO2低下なし                              | Ad(2回), Ah, St, RI | 重い入院有<br>(退院日記載無し) | 改善 | レベル3    |
| 2   | 女  | 40 | 3月14日 | 1    | 食物・薬剤(解熱剤)アレルギー      | 5分    | 顔面紅潮、眼瞼血管浮腫、咽頭違和感、嘔声⇒持続咳嗽、嘔気 ※血圧・SpO2低下なし                            | Ad, St, RI         | 重い入院1泊             | 回復 | レベル2    |
| 3   | 女  | 20 | 3月16日 | 1    | 薬剤(抗菌薬)で発疹           | 数分    | 頸部・腹部の痒み、嘔気⇒嘔吐⇒手足のしびれ  | Ah                 | 重くない入院無            | 軽快 | レベル4    |
| 4   | 女  | 40 | 3月25日 | 1    | 食物(果物)・薬剤(抗菌薬等)アレルギー | 8分    | 咳、皮疹   | Ad, Ba, St         | 重い入院1泊             | 軽快 | レベル4    |
| 5   | 女  | 30 | 3月10日 | 1    | なし                   | 10分   | 呼吸困難、狭窄感、一過性の皮疹  | Ad, St             | 重い入院1泊             | 回復 | レベル2    |
| 6   | 女  | 50 | 3月26日 | 1    | 造影剤、全身麻酔薬アレルギー       | すぐ    | アナフィラキシー症状   | あり詳細記載なし           | 重い入院1泊             | 回復 | レベル4    |
| 7   | 女  | 50 | 3月17日 | 1    | 造影剤、麻酔薬、抗菌薬、カニでアレルギー | 5分    | 頭重感、耳の中の痒み、動悸⇒咳嗽、呼吸困難、吸気性喘鳴<br>※SpO2低下なし                             | Ah                 | 重くない入院無            | 回復 | レベル4    |
| 8   | 女  | 30 | 3月11日 | 1    | なし                   | 70分   | 吐き気  | 記載なし               | 重くない入院無            | 回復 | レベル4    |
| 9   | 女  | 40 | 3月10日 | 1    | じんましん                | 2～3分  | 動悸、頭痛、口唇腫脹、舌のしびれ   | 記載なし               | 重くない入院無            | 回復 | レベル4    |
| 10  | 女  | 50 | 4月6日  | 1    | アレルギー性鼻炎、薬剤・食物アレルギー  | 3時間   | 両上眼瞼浮腫、嘔声⇒倦怠感、頭重感、眼の違和感⇒翌朝、顔面浮腫                                      | 抗アレルギー眼剤           | 重くない入院無            | 回復 | レベル2    |
| 11  | 女  | 40 | 4月8日  | 1    | 薬剤・食物・化粧品アレルギー       | 5分    | 顔のほてり、上肢のゾワゾワ感⇒顔面紅潮⇒発汗、湿性咳嗽⇒咳込み、眼瞼浮腫、SpO2 93～94%に下降⇒身体ほてり<br>※血圧低下なし | St, Hb             | 重くない入院無            | 回復 | レベル2    |
| 12  | 女  | 50 | 3月26日 | 1    | 薬剤(造影剤、麻酔薬)アレルギー     | 5分    | 喘鳴、呼吸困難、嘔気⇒乾性咳嗽  | Ad(2回)             | 重い入院1泊             | 回復 | レベル2    |
| 13  | 男  | 20 | 4月7日  | 1    | 喘息、じんましん             | 20分   | 全身じんましん、全身搔痒感、顔面頰部に紅斑  | 記載なし               | 重くない入院無            | 回復 | レベル4    |
| 14  | 男  | 30 | 4月6日  | 1    | 喘息、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎  | 15分   | 全身搔痒感、顔面紅潮、悪心、嘔吐   | 記載なし               | 重くない入院無            | 回復 | レベル4    |
| 15  | 女  | 50 | 4月5日  | 1    | 喘息、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎  | 15分   | 全身発赤、全身搔痒感、悪心、嘔吐   | 記載なし               | 重くない入院無            | 回復 | レベル4    |

\* 治療薬の略号

Ad: アドレナリン、Hb: 抗ヒスタミン剤

St: ステロイド剤、RI: 急速輸液

Ba: 気管支拡張剤吸入

4月8日までの約3.1万回接種時点で、

報告医がアナフィラキシーと判断している副反応が15例

うち、男性 2例、女性 13例

アレルギー疾患の既往あり 13例、なし 2例

入院 6例、入院なし 9例、ブライトン分類レベル3以下 6例

全15例が症状改善し、14例が軽快もしくは回復

アナフィラキシー発生頻度は、約5人/1万回

ブライトン分類レベル3以下では発生頻度は、約2人/1万回