



下田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低い有意でない、▲ 高い有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1,674	455	440.4	103.3	95.5	111.7	▲	1,661	139	138.5	100.4	85.6	117.6	▲
メタボ予備群	1,674	304	265.3	114.6	103.5	126.8	▲▲	1,661	93	83.0	112.1	92.0	136.5	▲
肥満者	1,674	896	852.0	105.2	100.6	110.0	▲▲	1,661	383	384.0	99.7	91.4	108.9	▽
高血圧症有病者	1,636	863	775.7	111.3	106.3	116.5	▲▲	1,616	620	578.0	107.3	100.9	114.1	▲▲
高血圧症予備群	1,636	219	210.3	104.1	92.1	117.8	▲	1,616	201	195.4	102.9	90.4	117.1	▲
脂質異常症有病者	1,676	959	938.7	102.2	98.0	106.5	▲	1,663	878	865.6	101.4	96.9	106.1	▲
糖尿病有病者	1,668	234	243.5	96.1	85.3	108.2	▽	1,658	111	114.7	96.7	80.9	115.7	▽
糖尿病予備群	1,668	174	243.8	71.4	62.0	82.1	▽▽	1,658	103	197.7	52.1	43.2	62.8	▽▽
習慣的喫煙者	1,710	543	515.8	105.3	98.2	112.8	▲	1,777	200	139.4	143.5	126.0	163.4	▲▲

東伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1,158	351	314.3	111.7	102.4	121.8	▲▲	1,154	117	104.2	112.2	94.6	133.2	▲
メタボ予備群	1,158	217	182.6	118.9	105.4	134.0	▲▲	1,154	52	57.8	90.0	69.0	117.3	▽
肥満者	1,158	676	592.5	114.1	108.7	119.8	▲▲	1,154	289	270.0	107.0	96.9	118.3	▲
高血圧症有病者	1,126	583	555.4	105.0	99.2	111.1	▲	1,139	491	443.2	110.8	103.6	118.4	▲▲
高血圧症予備群	1,126	169	143.1	118.1	102.8	135.7	▲▲	1,139	159	141.6	112.3	97.2	129.6	▲
脂質異常症有病者	1,165	679	656.5	103.4	98.5	108.6	▲	1,156	635	636.6	99.7	94.7	105.1	▽
糖尿病有病者	1,160	184	178.0	103.4	90.6	118.0	▲	1,156	85	87.8	96.8	78.9	118.7	▽
糖尿病予備群	1,160	153	174.3	87.8	75.7	101.7	▽	1,156	164	147.7	111.0	96.4	127.9	▲
習慣的喫煙者	1,252	426	368.3	115.7	107.1	124.9	▲▲	1,321	181	97.9	184.8	161.5	211.5	▲▲

河津町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	608	170	160.0	106.3	93.5	120.7	▲	546	40	45.8	87.3	64.8	117.6	▽
メタボ予備群	608	104	96.5	107.8	90.5	128.4	▲	546	25	27.3	91.6	62.4	134.2	▽
肥満者	608	327	309.6	105.6	98.1	113.7	▲	546	117	126.5	92.5	78.8	108.6	▽
高血圧症有病者	592	311	280.9	110.7	102.5	119.5	▲▲	533	219	191.8	114.2	103.1	126.4	▲▲
高血圧症予備群	592	99	76.1	130.1	108.7	155.7	▲▲	533	62	64.4	96.2	76.2	121.6	▽
脂質異常症有病者	608	337	340.4	99.0	92.2	106.3	▽	546	304	285.1	106.6	99.0	114.9	▲
糖尿病有病者	608	80	88.7	90.2	73.5	110.6	▽	541	33	37.7	87.6	63.0	121.9	▽
糖尿病予備群	608	64	89.0	71.9	57.1	90.7	▽▽	541	34	64.7	52.6	38.0	72.8	▽▽
習慣的喫煙者	650	225	197.8	113.8	102.4	126.4	▲▲	578	62	45.4	136.6	108.0	172.7	▲▲

南伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	700	219	191.2	114.5	102.6	127.8	▲▲	758	66	67.1	98.4	78.1	123.8	▽
メタボ予備群	700	128	109.8	116.6	99.7	136.4	▲	758	34	37.5	90.6	65.3	125.8	▽
肥満者	700	406	357.7	113.5	106.6	120.9	▲▲	758	177	176.4	100.3	88.2	114.1	▲
高血圧症有病者	687	372	343.6	108.3	101.1	116.0	▲▲	735	327	283.4	115.4	106.4	125.1	▲▲
高血圧症予備群	687	84	86.6	97.0	79.4	118.5	▽	735	83	90.6	91.7	74.9	112.2	▽
脂質異常症有病者	701	396	394.6	100.3	94.0	107.1	▲	758	410	408.7	100.3	94.0	107.1	▲
糖尿病有病者	696	122	107.8	113.2	96.3	132.9	▲	756	45	56.5	79.6	60.0	105.7	▽
糖尿病予備群	696	81	104.4	77.6	63.2	95.2	▽▽	756	52	94.5	55.0	42.3	71.5	▽▽
習慣的喫煙者	724	227	207.5	109.4	98.2	121.8	▲	826	80	61.4	130.2	105.8	160.3	▲▲

松崎町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	582	184	158.8	115.9	102.8	130.5	▲▲	580	38	52.2	72.8	53.6	99.0	▽▽
メタボ予備群	582	102	91.9	111.0	93.1	132.4	▲	580	47	29.0	161.9	123.2	212.9	▲▲
肥満者	582	338	298.5	113.2	105.7	121.3	▲▲	580	143	135.5	105.5	91.5	121.6	▲
高血圧症有病者	564	312	278.9	111.9	103.9	120.5	▲▲	558	238	217.6	109.4	99.4	120.4	▲
高血圧症予備群	564	89	71.8	123.9	102.4	149.9	▲▲	558	69	69.4	99.4	79.7	124.0	▽
脂質異常症有病者	582	346	328.7	105.3	98.4	112.6	▲	580	311	319.0	97.5	90.4	105.1	▽
糖尿病有病者	582	78	89.5	87.1	70.9	107.1	▽	575	41	43.7	93.9	69.9	126.0	▽
糖尿病予備群	582	72	87.9	81.9	66.0	101.6	▽	575	38	73.6	51.6	38.0	70.2	▽▽
習慣的喫煙者	614	187	181.2	103.2	91.6	116.3	▲	649	57	47.9	119.1	93.0	152.6	▲

西伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	664	208	180.3	115.3	103.1	129.1	▲▲	757	66	68.2	96.8	76.9	121.8	▽
メタボ予備群	664	127	104.9	121.1	103.6	141.6	▲▲	757	54	37.6	143.5	111.1	185.5	▲▲
肥満者	663	397	339.8	116.8	109.8	124.3	▲▲	757	197	176.9	111.4	98.8	125.6	▲
高血圧症有病者	654	378	322.0	117.4	110.0	125.3	▲▲	740	325	290.6	111.8	103.1	121.3	▲▲
高血圧症予備群	654	78	83.3	93.7	76.1	115.3	▽	740	96	91.9	104.5	86.7	125.9	▲
脂質異常症有病者	664	404	374.7	107.8	101.5	114.6	▲▲	759	448	415.6	107.8	101.6	114.4	▲▲
糖尿病有病者	651	103	100.1	102.9	86.2	122.9	▲	742	48	57.2	83.9	63.9	110.3	▽
糖尿病予備群	651	66	97.8	67.5	53.7	84.8	▽▽	742	51	95.1	53.6	41.2	69.9	▽▽
習慣的喫煙者	725	268	213.7	125.4	114.1	137.9	▲▲	825	88	59.8	147.1	120.8	179.1	▲▲

熱海市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2,104	606	576.8	105.1	98.3	112.3	▲	2,452	212	222.9	95.1	83.7	108.1	▽
メタボ予備群	2,104	359	330.8	108.5	98.8	119.2	▲	2,452	111	122.3	90.8	75.7	108.8	▽
肥満者	2,104	1,187	1,077.6	110.2	106.1	114.4	▲▲	2,450	601	572.8	104.9	97.9	112.4	▲
高血圧症有病者	2,082	1,025	1,040.2	98.5	94.3	102.9	▽	2,425	919	950.7	96.7	91.9	101.7	▽
高血圧症予備群	2,082	287	263.8	108.8	97.8	121.1	▲	2,425	321	301.1	106.6	96.3	118.0	▲
脂質異常症有病者	2,104	1,276	1,187.4	107.5	103.8	111.2	▲▲	2,450	1,351	1,354.3	99.8	96.3	103.4	▽
糖尿病有病者	2,091	379	325.7	116.4	106.3	127.4	▲▲	2,443	184	188.2	97.8	85.1	112.3	▽
糖尿病予備群	2,091	227	317.0	71.6	63.4	80.9	▽▽	2,443	241	314.6	76.6	68.0	86.3	▽▽
習慣的喫煙者	2,118	686	610.3	112.4	105.7	119.5	▲▲	2,574	350	184.8	189.3	171.9	208.6	▲▲

伊東市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	5,527	1,601	1,517.6	105.5	101.3	109.9	▲▲	6,045	492	553.0	89.0	81.8	96.7	▽▽
メタボ予備群	5,527	928	868.5	106.9	100.8	113.3	▲▲	6,045	290	300.8	96.4	86.3	107.8	▽
肥満者	5,526	2,970	2,831.0	104.9	102.4	107.5	▲▲	6,045	1,344	1,415.5	94.9	90.6	99.5	▽▽
高血圧症有病者	5,390	2,740	2,709.2	101.1	98.5	103.8	▲	5,974	2,321	2,366.3	98.1	95.0	101.2	▽
高血圧症予備群	5,390	722	680.6	106.1	99.2	113.5	▲	5,974	793	742.9	106.7	100.1	113.8	▲▲
脂質異常症有病者	5,528	3,257	3,119.7	104.4	102.1	106.7	▲▲	6,039	3,423	3,344.5	102.3	100.1	104.6	▲▲
糖尿病有病者	5,468	890	850.9	104.6	98.5	111.0	▲	6,006	445	465.6	95.6	87.5	104.4	▽
糖尿病予備群	5,468	711	825.9	86.1	80.4	92.2	▽▽	6,006	593	773.7	76.6	71.0	82.7	▽▽
習慣的喫煙者	5,762	1,829	1,656.2	110.4	106.4	114.7	▲▲	6,493	898	465.7	192.8	181.6	204.7	▲▲

沼津市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	17,510	4,815	4,461.3	107.9	105.4	110.5	▲▲	16,561	1,462	1,326.2	110.2	105.1	115.6	▲▲
メタボ予備群	17,510	3,200	2,794.0	114.5	111.1	118.1	▲▲	16,561	1,083	827.6	130.9	123.8	138.3	▲▲
肥満者	17,510	9,769	8,870.8	110.1	108.7	111.6	▲▲	16,561	4,279	3,814.8	112.2	109.4	115.0	▲▲
高血圧症有病者	17,271	8,007	7,816.0	102.4	100.9	104.1	▲▲	16,348	5,792	5,567.3	104.0	102.0	106.2	▲▲
高血圧症予備群	17,271	2,223	2,244.4	99.0	95.4	102.9	▽	16,348	1,946	1,943.4	100.1	96.2	104.3	▲
脂質異常症有病者	17,501	9,964	9,739.2	102.3	101.0	103.6	▲▲	16,552	8,477	8,357.8	101.4	100.0	102.9	▲
糖尿病有病者	17,390	2,519	2,412.8	104.4	100.8	108.1	▲▲	16,436	1,025	1,087.1	94.3	89.0	99.9	▽▽
糖尿病予備群	17,390	2,123	2,472.3	85.9	82.6	89.3	▽▽	16,436	1,367	1,889.0	72.4	68.9	76.1	▽▽
習慣的喫煙者	18,127	6,186	5,640.6	109.7	107.5	111.9	▲▲	18,652	1,993	1,530.2	130.2	125.1	135.6	▲▲

三島市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	9,285	2,489	2,383.0	104.4	101.0	108.0	▲▲	9,489	796	763.9	104.2	97.6	111.3	▲
メタボ予備群	9,285	1,529	1,478.0	103.5	98.9	108.2	▲	9,489	471	472.1	99.8	91.5	108.8	▽
肥満者	9,285	4,890	4,706.3	103.9	101.9	105.9	▲▲	9,489	2,228	2,184.6	102.0	98.4	105.7	▲
高血圧症有病者	8,984	4,166	4,126.9	100.9	98.8	103.2	▲	9,131	3,109	3,166.2	98.2	95.5	101.0	▽
高血圧症予備群	8,984	1,113	1,161.1	95.9	90.8	101.2	▽	9,131	1,053	1,088.9	96.7	91.4	102.3	▽
脂質異常症有病者	9,257	5,351	5,155.5	103.8	102.0	105.6	▲▲	9,403	4,964	4,767.4	104.1	102.2	106.1	▲▲
糖尿病有病者	9,213	1,359	1,294.6	105.0	100.0	110.2	▲▲	9,414	622	627.8	99.1	91.9	106.8	▽
糖尿病予備群	9,213	1,164	1,316.2	88.4	83.9	93.3	▽▽	9,414	764	1,084.4	70.5	65.9	75.4	▽▽
習慣的喫煙者	9,515	2,902	2,928.1	99.1	96.2	102.1	▽	10,337	910	836.6	108.8	102.3	115.6	▲▲

裾野市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4,169	1,071	1,073.2	99.8	94.8	105.0	▽	4,062	389	336.1	115.8	105.4	127.1	▲▲
メタボ予備群	4,169	795	660.5	120.4	113.1	128.1	▲▲	4,062	235	201.3	116.8	103.2	132.1	▲▲
肥満者	4,169	2,260	2,109.3	107.1	104.2	110.2	▲▲	4,062	1,099	937.8	117.2	111.5	123.2	▲▲
高血圧症有病者	4,126	1,932	1,898.6	101.8	98.5	105.1	▲	3,996	1,504	1,418.8	106.0	101.9	110.3	▲▲
高血圧症予備群	4,126	547	530.4	103.1	95.4	111.5	▲	3,996	471	478.6	98.4	90.5	107.1	▽
脂質異常症有病者	4,166	2,393	2,316.3	103.3	100.7	106.0	▲▲	4,059	2,167	2,085.5	103.9	101.0	106.9	▲▲
糖尿病有病者	4,128	528	586.1	90.1	83.2	97.5	▽▽	4,028	291	278.7	104.4	93.5	116.5	▲
糖尿病予備群	4,128	482	589.4	81.8	75.2	88.9	▽▽	4,028	353	475.0	74.3	67.3	82.1	▽▽
習慣的喫煙者	4,299	1,451	1,303.2	111.3	106.8	116.1	▲▲	4,272	366	333.4	109.8	99.6	121.0	▲

伊豆市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いがあり有意でない、▲ 高いがあり有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2,924	865	778.3	111.1	105.1	117.5	▲▲	2,985	275	261.7	105.1	93.9	117.5	▲
メタボ予備群	2,924	471	460.7	102.2	94.2	111.0	▲	2,985	141	149.0	94.6	80.6	111.1	▽
肥満者	2,924	1,585	1,487.6	106.5	103.1	110.1	▲▲	2,985	816	694.2	117.5	110.9	124.6	▲▲
高血圧症有病者	2,879	1,626	1,387.9	117.2	113.5	121.0	▲▲	2,940	1,323	1,103.6	119.9	115.2	124.7	▲▲
高血圧症予備群	2,879	338	366.7	92.2	83.4	101.8	▽	2,940	308	361.2	85.3	76.8	94.7	▽▽
脂質異常症有病者	2,925	1,677	1,638.2	102.4	99.2	105.6	▲	2,982	1,667	1,610.2	103.5	100.3	106.9	▲▲
糖尿病有病者	2,913	496	434.6	114.1	105.4	123.6	▲▲	2,980	291	219.0	132.9	119.2	148.1	▲▲
糖尿病予備群	2,913	434	429.3	101.1	92.7	110.2	▲	2,980	371	372.1	99.7	90.7	109.6	▽
習慣的喫煙者	2,965	979	874.9	111.9	106.3	117.8	▲▲	3,240	353	242.6	145.5	131.9	160.5	▲▲

伊豆の国市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4,555	1,279	1,168.9	109.4	104.5	114.6	▲▲	4,675	407	383.8	106.0	96.7	116.3	▲
メタボ予備群	4,555	765	724.4	105.6	99.0	112.6	▲	4,675	206	232.6	88.6	77.6	101.1	▽
肥満者	4,554	2,494	2,307.2	108.1	105.3	111.0	▲▲	4,675	1,183	1,079.0	109.6	104.4	115.1	▲▲
高血圧症有病者	4,417	2,186	2,024.8	108.0	104.8	111.2	▲▲	4,390	1,738	1,564.8	111.1	107.1	115.2	▲▲
高血圧症予備群	4,417	538	570.1	94.4	87.2	102.1	▽	4,390	438	527.5	83.0	76.0	90.7	▽▽
脂質異常症有病者	4,552	2,625	2,533.7	103.6	101.1	106.2	▲▲	4,666	2,527	2,393.9	105.6	102.8	108.4	▲▲
糖尿病有病者	4,532	702	637.4	110.1	102.9	117.8	▲▲	4,662	328	318.1	103.1	93.0	114.3	▲
糖尿病予備群	4,532	532	646.3	82.3	76.0	89.1	▽▽	4,662	429	546.1	78.6	71.8	85.9	▽▽
習慣的喫煙者	4,643	1,605	1,425.1	112.6	108.3	117.1	▲▲	5,071	582	402.9	144.4	133.9	155.8	▲▲

函南町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3,181	812	798.8	101.7	95.8	107.8	▲	3,041	245	241.9	101.3	89.9	114.1	▲
メタボ予備群	3,181	574	507.8	113.0	105.0	121.7	▲▲	3,041	170	151.8	112.0	96.8	129.5	▲
肥満者	3,181	1,716	1,605.9	106.9	103.5	110.3	▲▲	3,041	769	699.7	109.9	103.4	116.8	▲▲
高血圧症有病者	3,077	1,362	1,374.1	99.1	95.3	103.1	▽	2,931	1,049	999.8	104.9	100.0	110.1	▲
高血圧症予備群	3,077	398	400.1	99.5	90.8	109.0	▽	2,931	355	348.2	101.9	92.5	112.3	▲
脂質異常症有病者	3,173	1,787	1,758.8	101.6	98.5	104.7	▲	3,025	1,557	1,522.0	102.3	98.8	105.9	▲
糖尿病有病者	3,158	428	429.4	99.7	91.3	108.8	▽	3,024	182	198.6	91.6	79.7	105.4	▽
糖尿病予備群	3,158	424	442.7	95.8	87.7	104.6	▽	3,024	294	345.6	85.1	76.3	94.8	▽▽
習慣的喫煙者	3,210	1,084	1,004.4	107.9	102.8	113.3	▲▲	3,293	344	269.1	127.9	115.8	141.2	▲▲

清水町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2,896	823	721.2	114.1	107.7	120.9	▲▲	2,789	253	215.1	117.6	104.6	132.2	▲▲
メタボ予備群	2,896	507	464.2	109.2	101.0	118.2	▲▲	2,789	188	139.5	134.8	117.5	154.6	▲▲
肥満者	2,896	1,607	1,462.4	109.9	106.4	113.5	▲▲	2,789	749	639.9	117.0	110.1	124.4	▲▲
高血圧症有病者	2,823	1,323	1,239.6	106.7	102.6	111.0	▲▲	2,720	926	893.3	103.7	98.4	109.2	▲
高血圧症予備群	2,823	386	369.5	104.5	95.3	114.6	▲	2,720	346	319.0	108.5	98.3	119.6	▲
脂質異常症有病者	2,894	1,682	1,603.7	104.9	101.7	108.2	▲▲	2,780	1,393	1,367.4	101.9	98.2	105.7	▲
糖尿病有病者	2,882	423	385.6	109.7	100.5	119.7	▲▲	2,773	183	175.3	104.4	90.8	120.0	▲
糖尿病予備群	2,882	381	401.9	94.8	86.4	104.1	▽	2,773	208	307.7	67.6	59.3	77.0	▽▽
習慣的喫煙者	2,962	1,009	941.6	107.2	101.9	112.6	▲▲	3,005	320	252.5	126.7	114.3	140.5	▲▲

長泉町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3,482	883	868.0	101.7	96.1	107.7	▲	3,526	278	263.1	105.7	94.5	118.2	▲
メタボ予備群	3,482	563	556.7	101.1	93.8	109.0	▲	3,526	184	174.6	105.4	91.6	121.2	▲
肥満者	3,482	1,788	1,756.3	101.8	98.6	105.1	▲	3,526	814	804.0	101.2	95.4	107.5	▲
高血圧症有病者	3,423	1,498	1,507.3	99.4	95.7	103.2	▽	3,426	1,087	1,088.5	99.9	95.1	104.9	▽
高血圧症予備群	3,423	446	446.6	99.9	91.6	108.9	▽	3,426	384	396.2	96.9	88.2	106.4	▽
脂質異常症有病者	3,479	1,928	1,925.9	100.1	97.2	103.1	▲	3,519	1,788	1,681.7	106.3	102.9	109.8	▲▲
糖尿病有病者	3,443	442	463.3	95.4	87.5	104.0	▽	3,493	216	213.7	101.1	88.9	114.9	▲
糖尿病予備群	3,443	413	479.9	86.1	78.6	94.2	▽▽	3,493	254	375.7	67.6	60.1	76.1	▽▽
習慣的喫煙者	3,515	1,132	1,108.2	102.1	97.4	107.1	▲	3,906	302	334.9	90.2	81.0	100.4	▽

御殿場市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低い有意でない、▲ 高い有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	6,894	1,964	1,781.5	110.2	106.2	114.4	▲▲	7,007	639	578.2	110.5	102.7	118.9	▲▲
メタボ予備群	6,894	1,141	1,092.1	104.5	99.1	110.1	▲	7,007	397	347.6	114.2	103.9	125.5	▲▲
肥満者	6,894	3,782	3,491.3	108.3	106.1	110.6	▲▲	7,007	1,915	1,617.1	118.4	114.0	123.0	▲▲
高血圧症有病者	6,841	3,348	3,158.9	106.0	103.5	108.6	▲▲	6,918	2,581	2,439.6	105.8	102.6	109.0	▲▲
高血圧症予備群	6,841	762	879.9	86.6	81.0	92.5	▽▽	6,918	760	829.5	91.6	85.7	97.9	▽▽
脂質異常症有病者	6,889	4,127	3,835.4	107.6	105.6	109.7	▲▲	6,991	3,796	3,592.6	105.7	103.4	107.9	▲▲
糖尿病有病者	6,769	1,018	967.5	105.2	99.5	111.3	▲	6,909	522	475.5	109.8	101.2	119.1	▲▲
糖尿病予備群	6,769	755	971.4	77.7	72.7	83.1	▽▽	6,909	544	813.7	66.9	61.7	72.4	▽▽
習慣的喫煙者	7,046	2,562	2,136.5	119.9	116.3	123.6	▲▲	7,694	837	610.1	137.2	128.8	146.1	▲▲

小山町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1,411	427	378.7	112.8	104.2	122.0	▲▲	1,495	139	130.1	106.8	91.2	125.1	▲
メタボ予備群	1,411	229	221.8	103.2	91.7	116.2	▲	1,495	91	74.0	122.9	100.8	149.9	▲▲
肥満者	1,411	790	718.6	109.9	105.0	115.1	▲▲	1,495	421	346.7	121.4	112.0	131.6	▲▲
高血圧症有病者	1,394	707	677.9	104.3	99.0	109.8	▲	1,468	586	550.0	106.6	100.1	113.4	▲▲
高血圧症予備群	1,394	179	176.7	101.3	88.4	116.1	▲	1,468	180	179.2	100.4	87.6	115.1	▲
脂質異常症有病者	1,408	841	789.3	106.5	102.1	111.2	▲▲	1,490	879	796.2	110.4	105.8	115.2	▲▲
糖尿病有病者	1,397	211	211.6	99.7	88.1	112.9	▽	1,479	96	108.6	88.4	72.9	107.2	▽
糖尿病予備群	1,397	182	206.9	88.0	76.9	100.7	▽	1,479	107	183.1	58.4	48.7	70.1	▽▽
習慣的喫煙者	1,439	477	416.9	114.4	106.3	123.1	▲▲	1,659	136	124.8	109.0	92.8	128.0	▲

富士宮市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	12,492	3,278	3,141.4	104.3	101.4	107.4	▲▲	11,492	967	901.3	107.3	101.1	113.8	▲▲
メタボ予備群	12,492	2,203	1,994.7	110.4	106.4	114.6	▲▲	11,492	631	572.4	110.2	102.3	118.7	▲▲
肥満者	12,492	6,721	6,310.1	106.5	104.8	108.2	▲▲	11,492	2,889	2,637.8	109.5	106.2	113.0	▲▲
高血圧症有病者	12,285	5,700	5,463.1	104.3	102.4	106.3	▲▲	11,259	3,950	3,759.2	105.1	102.5	107.7	▲▲
高血圧症予備群	12,285	1,643	1,599.0	102.7	98.3	107.4	▲	11,259	1,417	1,328.5	106.7	101.7	111.9	▲▲
脂質異常症有病者	12,502	7,075	6,933.3	102.0	100.5	103.6	▲▲	11,501	5,910	5,713.1	103.4	101.7	105.3	▲▲
糖尿病有病者	12,386	1,687	1,686.9	100.0	95.7	104.5	▲	11,432	759	737.1	103.0	96.3	110.2	▲
糖尿病予備群	12,386	1,547	1,738.9	89.0	85.0	93.1	▽▽	11,432	1,106	1,287.2	85.9	81.3	90.8	▽▽
習慣的喫煙者	12,991	4,618	4,079.3	113.2	110.7	115.8	▲▲	12,984	1,432	1,076.1	133.1	126.9	139.6	▲▲

富士市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	23,655	6,058	5,914.4	102.4	100.3	104.6	▲▲	20,086	1,571	1,536.6	102.2	97.6	107.0	▲
メタボ予備群	23,655	4,060	3,785.9	107.2	104.4	110.2	▲▲	20,086	1,051	1,004.2	104.7	98.9	110.8	▲
肥満者	23,655	12,550	11,946.9	105.0	103.8	106.3	▲▲	20,086	4,839	4,600.7	105.2	102.7	107.7	▲▲
高血圧症有病者	23,211	10,496	10,243.8	102.5	101.1	103.9	▲▲	19,431	6,358	6,319.8	100.6	98.7	102.6	▲
高血圧症予備群	23,211	2,861	3,032.0	94.4	91.3	97.5	▽▽	19,431	2,197	2,280.4	96.3	92.7	100.1	▽
脂質異常症有病者	23,677	13,735	13,125.0	104.6	103.6	105.7	▲▲	20,118	10,346	9,845.6	105.1	103.7	106.5	▲▲
糖尿病有病者	23,457	3,148	3,163.1	99.5	96.4	102.7	▽	19,929	1,158	1,244.1	93.1	88.2	98.3	▽▽
糖尿病予備群	23,457	2,828	3,283.9	86.1	83.3	89.1	▽▽	19,929	1,670	2,200.1	75.9	72.6	79.4	▽▽
習慣的喫煙者	24,148	8,728	7,640.7	114.2	112.4	116.1	▲▲	22,285	2,495	1,891.6	131.9	127.3	136.7	▲▲

島田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	10,667	2,517	2,698.9	93.3	90.2	96.5	▽▽	9,192	574	722.6	79.4	73.5	85.9	▽▽
メタボ予備群	10,667	1,507	1,699.6	88.7	84.7	92.9	▽▽	9,192	343	457.6	75.0	67.6	83.1	▽▽
肥満者	10,667	4,887	5,390.0	90.7	88.8	92.5	▽▽	9,192	1,721	2,109.0	81.6	78.2	85.1	▽▽
高血圧症有病者	10,556	4,671	4,736.3	98.6	96.6	100.7	▽	9,087	3,046	3,026.9	100.6	97.8	103.5	▲
高血圧症予備群	10,556	1,509	1,371.0	110.1	105.1	115.2	▲▲	9,087	1,162	1,072.3	108.4	102.8	114.3	▲▲
脂質異常症有病者	10,670	5,713	5,922.1	96.5	94.8	98.2	▽▽	9,225	4,376	4,590.0	95.3	93.3	97.4	▽▽
糖尿病有病者	10,591	1,408	1,458.2	96.6	92.0	101.3	▽	9,188	517	592.8	87.2	80.3	94.7	▽▽
糖尿病予備群	10,591	1,608	1,495.9	107.5	102.8	112.4	▲▲	9,188	1,299	1,036.7	125.3	119.2	131.7	▲▲
習慣的喫煙者	10,894	3,293	3,398.0	96.9	94.2	99.7	▽▽	10,033	572	827.0	69.2	63.9	74.8	▽▽

焼津市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	14,657	3,642	3,649.3	99.8	97.1	102.6	▽	12,521	956	967.3	98.8	93.1	104.9	▽
メタボ予備群	14,657	2,251	2,346.3	95.9	92.4	99.6	▽▽	12,521	588	624.4	94.2	87.2	101.7	▽
肥満者	14,656	7,273	7,394.0	98.4	96.8	99.9	▽▽	12,520	2,792	2,868.9	97.3	94.2	100.5	▽
高血圧症有病者	14,460	6,317	6,338.0	99.7	97.9	101.5	▽	12,172	3,983	3,997.6	99.6	97.2	102.2	▽
高血圧症予備群	14,460	1,966	1,891.3	103.9	99.9	108.2	▲	12,172	1,469	1,429.4	102.8	98.1	107.7	▲
脂質異常症有病者	14,657	7,681	8,116.7	94.6	93.2	96.1	▽▽	12,544	5,787	6,173.6	93.7	92.0	95.5	▽▽
糖尿病有病者	14,478	1,982	1,940.3	102.2	98.1	106.3	▲	12,425	835	787.7	106.0	99.4	113.0	▲
糖尿病予備群	14,478	2,069	2,020.5	102.4	98.5	106.5	▲	12,425	1,838	1,384.1	132.8	127.4	138.4	▲▲
習慣的喫煙者	15,596	5,222	4,967.7	105.1	102.9	107.4	▲▲	14,149	1,122	1,183.1	94.8	89.8	100.2	▽

藤枝市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	15,577	3,524	3,915.1	90.0	87.5	92.6	▽▽	14,546	630	1,138.5	55.3	51.3	59.7	▽▽
メタボ予備群	15,577	2,277	2,483.3	91.7	88.3	95.2	▽▽	14,546	473	723.1	65.4	59.9	71.4	▽▽
肥満者	15,577	7,200	7,860.4	91.6	90.1	93.1	▽▽	14,546	2,669	3,336.0	80.0	77.4	82.7	▽▽
高血圧症有病者	15,188	6,604	6,770.6	97.5	95.8	99.3	▽▽	13,789	4,641	4,638.6	100.1	97.8	102.4	▲
高血圧症予備群	15,188	2,088	1,973.2	105.8	101.8	110.0	▲▲	13,789	1,585	1,628.4	97.3	93.0	101.8	▽
脂質異常症有病者	15,581	8,262	8,633.7	95.7	94.3	97.1	▽▽	14,596	6,823	7,229.8	94.4	92.8	96.0	▽▽
糖尿病有病者	15,349	1,896	2,093.4	90.6	86.9	94.4	▽▽	14,476	798	931.5	85.7	80.2	91.5	▽▽
糖尿病予備群	15,349	1,987	2,153.0	92.3	88.7	96.1	▽▽	14,476	1,288	1,624.8	79.3	75.3	83.4	▽▽
習慣的喫煙者	15,960	4,605	4,991.5	92.3	90.1	94.5	▽▽	16,323	1,004	1,346.9	74.5	70.3	79.1	▽▽

牧之原市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4,314	1,111	1,109.9	100.1	95.2	105.3	▲	3,783	290	308.7	93.9	84.2	104.9	▽
メタボ予備群	4,314	628	685.4	91.6	85.3	98.5	▽▽	3,783	161	188.6	85.4	73.5	99.2	▽▽
肥満者	4,314	2,139	2,185.6	97.9	95.0	100.8	▽	3,783	801	871.8	91.9	86.4	97.7	▽▽
高血圧症有病者	4,210	1,990	1,941.3	102.5	99.3	105.8	▲	3,613	1,298	1,271.3	102.1	97.8	106.6	▲
高血圧症予備群	4,210	586	543.4	107.8	100.1	116.2	▲▲	3,613	492	435.4	113.0	104.1	122.6	▲▲
脂質異常症有病者	4,334	2,470	2,414.6	102.3	99.7	105.0	▲	3,799	1,972	1,949.2	101.2	98.1	104.3	▲
糖尿病有病者	4,292	582	608.1	95.7	88.8	103.2	▽	3,788	255	255.8	99.7	88.6	112.2	▽
糖尿病予備群	4,292	697	616.3	113.1	105.7	121.0	▲▲	3,788	650	444.2	146.3	136.5	156.8	▲▲
習慣的喫煙者	4,656	1,581	1,436.4	110.1	105.8	114.5	▲▲	4,157	326	332.3	98.1	88.5	108.8	▽

吉田町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3,114	787	780.3	100.9	95.0	107.1	▲	2,584	183	198.9	92.0	80.1	105.7	▽
メタボ予備群	3,114	470	496.9	94.6	87.1	102.8	▽	2,584	121	128.4	94.2	79.2	112.1	▽
肥満者	3,114	1,531	1,570.8	97.5	94.1	101.0	▽	2,584	627	591.1	106.1	99.1	113.5	▲
高血圧症有病者	3,014	1,381	1,340.5	103.0	99.1	107.1	▲	2,420	781	799.1	97.7	92.3	103.5	▽
高血圧症予備群	3,014	406	392.4	103.5	94.6	113.2	▲	2,420	361	285.0	126.7	115.2	139.2	▲▲
脂質異常症有病者	3,118	1,708	1,727.5	98.9	95.8	102.1	▽	2,588	1,283	1,269.3	101.1	97.2	105.1	▲
糖尿病有病者	3,064	476	416.4	114.3	105.3	124.1	▲▲	2,569	151	161.7	93.4	80.0	108.9	▽
糖尿病予備群	3,064	466	430.0	108.4	99.7	117.8	▲	2,569	348	284.6	122.3	111.0	134.8	▲▲
習慣的喫煙者	3,226	1,091	1,017.2	107.3	102.2	112.5	▲▲	2,786	252	231.5	108.9	96.8	122.4	▲

川根本町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	724	203	197.4	102.8	91.5	115.5	▲	681	51	60.8	83.8	64.4	109.1	▽
メタボ予備群	724	90	113.7	79.1	65.2	96.0	▽▽	681	32	34.0	94.0	67.1	131.8	▽
肥満者	724	344	370.1	93.0	86.1	100.3	▽	681	147	158.8	92.6	80.3	106.8	▽
高血圧症有病者	721	381	356.7	106.8	99.7	114.4	▲	678	279	258.8	107.8	98.5	117.9	▲
高血圧症予備群	721	106	91.4	115.9	97.2	138.2	▲	678	75	83.8	89.5	72.4	110.8	▽
脂質異常症有病者	724	400	407.8	98.1	91.9	104.7	▽	681	338	373.0	90.6	84.0	97.7	▽▽
糖尿病有病者	712	92	110.3	83.4	69.0	100.9	▽	669	54	50.3	107.3	83.1	138.6	▲
糖尿病予備群	712	137	107.5	127.5	109.7	148.2	▲▲	669	129	85.1	151.6	129.9	177.0	▲▲
習慣的喫煙者	808	250	235.7	106.1	95.7	117.6	▲	808	40	60.3	66.4	49.1	89.8	▽▽

磐田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	17,866	4,318	4,463.0	96.8	94.3	99.2	▽▽	15,985	1,196	1,233.3	97.0	92.0	102.3	▽
メタボ予備群	17,866	2,692	2,851.7	94.4	91.2	97.7	▽▽	15,985	832	792.8	104.9	98.4	111.9	▲
肥満者	17,865	8,655	9,007.5	96.1	94.7	97.5	▽▽	15,985	3,564	3,657.8	97.4	94.7	100.2	▽
高血圧症有病者	17,522	7,445	7,737.5	96.2	94.6	97.8	▽▽	15,648	4,931	5,148.3	95.8	93.6	98.0	▽▽
高血圧症予備群	17,522	2,381	2,281.2	104.4	100.7	108.2	▲▲	15,648	1,999	1,836.1	108.9	104.6	113.3	▲▲
脂質異常症有病者	17,874	9,543	9,893.3	96.5	95.2	97.8	▽▽	16,096	7,572	7,881.9	96.1	94.5	97.6	▽▽
糖尿病有病者	17,721	2,395	2,392.7	100.1	96.5	103.8	▲	15,957	1,112	1,009.7	110.1	104.2	116.4	▲▲
糖尿病予備群	17,721	2,811	2,471.9	113.7	110.0	117.5	▲▲	15,957	2,187	1,767.4	123.7	119.2	128.5	▲▲
習慣的喫煙者	18,613	5,653	5,866.4	96.4	94.3	98.4	▽▽	17,935	1,166	1,498.1	77.8	73.7	82.2	▽▽

掛川市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	10,750	2,457	2,723.9	90.2	87.2	93.3	▽▽	9,922	742	795.3	93.3	87.1	99.9	▽▽
メタボ予備群	10,750	1,577	1,707.2	92.4	88.3	96.6	▽▽	9,922	463	492.1	94.1	86.2	102.7	▽
肥満者	10,749	4,996	5,423.7	92.1	90.3	94.0	▽▽	9,921	2,100	2,278.9	92.1	88.8	95.7	▽▽
高血圧症有病者	10,705	4,478	4,814.4	93.0	91.0	95.1	▽▽	9,806	3,165	3,342.5	94.7	92.1	97.4	▽▽
高血圧症予備群	10,705	1,495	1,384.1	108.0	103.1	113.1	▲▲	9,806	1,238	1,164.4	106.3	101.0	111.9	▲▲
脂質異常症有病者	10,757	5,771	5,962.9	96.8	95.1	98.5	▽▽	9,977	5,004	5,025.2	99.6	97.7	101.5	▽
糖尿病有病者	10,669	1,348	1,476.3	91.3	86.9	95.9	▽▽	9,921	598	656.1	91.1	84.4	98.4	▽▽
糖尿病予備群	10,669	1,547	1,503.1	102.9	98.4	107.7	▲	9,921	1,245	1,138.2	109.4	103.9	115.1	▲▲
習慣的喫煙者	11,196	3,392	3,459.6	98.0	95.4	100.8	▽	10,943	664	885.5	75.0	69.7	80.6	▽▽

袋井市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8,707	2,078	2,189.2	94.9	91.5	98.5	▽▽	7,768	616	604.5	101.9	94.6	109.8	▲
メタボ予備群	8,707	1,348	1,386.3	97.2	92.6	102.1	▽	7,768	414	384.4	107.7	98.2	118.1	▲
肥満者	8,707	4,138	4,391.3	94.2	92.2	96.3	▽▽	7,768	1,817	1,778.2	102.2	98.2	106.3	▲
高血圧症有病者	8,634	3,643	3,839.8	94.9	92.6	97.2	▽▽	7,680	2,466	2,536.9	97.2	94.1	100.4	▽
高血圧症予備群	8,634	1,233	1,119.9	110.1	104.6	115.9	▲▲	7,680	1,030	901.2	114.3	108.1	120.9	▲▲
脂質異常症有病者	8,709	4,564	4,822.2	94.6	92.8	96.5	▽▽	7,811	3,722	3,842.4	96.9	94.7	99.1	▽▽
糖尿病有病者	8,620	1,205	1,176.7	102.4	97.2	107.8	▲	7,733	533	495.1	107.7	99.3	116.7	▲
糖尿病予備群	8,620	1,427	1,206.2	118.3	112.9	124.0	▲▲	7,733	973	862.9	112.8	106.4	119.5	▲▲
習慣的喫煙者	9,129	2,861	2,846.2	100.5	97.6	103.6	▲	8,788	626	730.1	85.7	79.6	92.4	▽▽

御前崎市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2,840	738	737.3	100.1	94.1	106.5	▲	2,715	244	227.9	107.1	95.1	120.6	▲
メタボ予備群	2,840	427	450.2	94.8	86.9	103.5	▽	2,715	143	135.1	105.9	90.3	124.1	▲
肥満者	2,840	1,439	1,440.6	99.9	96.3	103.6	▽	2,715	659	627.7	105.0	98.3	112.2	▲
高血圧症有病者	2,766	1,293	1,290.6	100.2	96.3	104.2	▲	2,566	1,028	934.3	110.0	105.0	115.3	▲▲
高血圧症予備群	2,766	389	355.7	109.4	99.8	119.9	▲	2,566	356	312.1	114.1	103.6	125.6	▲▲
脂質異常症有病者	2,841	1,644	1,584.9	103.7	100.5	107.0	▲▲	2,729	1,456	1,422.1	102.4	98.9	106.0	▲
糖尿病有病者	2,829	381	405.1	94.0	85.7	103.2	▽	2,724	195	189.9	102.7	89.8	117.5	▲
糖尿病予備群	2,829	460	407.4	112.9	103.9	122.7	▲▲	2,724	379	325.9	116.3	106.0	127.6	▲▲
習慣的喫煙者	2,984	1,025	906.2	113.1	107.7	118.8	▲▲	2,930	238	227.8	104.5	92.5	117.9	▲

菊川市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4,533	1,096	1,148.1	95.5	90.7	100.5	▽	4,288	351	337.6	104.0	94.1	114.9	▲
メタボ予備群	4,533	691	718.4	96.2	89.8	103.0	▽	4,288	205	211.6	96.9	84.8	110.6	▽
肥満者	4,533	2,168	2,284.6	94.9	92.1	97.8	▽▽	4,287	970	982.0	98.8	93.5	104.4	▽
高血圧症有病者	4,476	1,951	2,018.6	96.6	93.5	99.9	▽▽	4,233	1,388	1,419.9	97.8	93.7	102.0	▽
高血圧症予備群	4,476	590	576.9	102.3	94.9	110.2	▲	4,233	541	498.8	108.5	100.3	117.3	▲▲
脂質異常症有病者	4,536	2,405	2,511.6	95.8	93.2	98.4	▽▽	4,316	2,086	2,137.8	97.6	94.6	100.6	▽
糖尿病有病者	4,522	587	626.7	93.7	86.9	101.0	▽	4,296	264	279.2	94.6	84.2	106.2	▽
糖尿病予備群	4,522	643	635.3	101.2	94.3	108.7	▲	4,296	458	483.4	94.7	86.9	103.2	▽
習慣的喫煙者	4,640	1,424	1,423.2	100.1	95.8	104.4	▲	4,590	286	374.5	76.4	68.3	85.4	▽▽

森町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1,814	428	479.6	89.2	82.2	96.9	▽▽	1,724	138	143.0	96.5	82.3	113.2	▽
メタボ予備群	1,814	269	285.4	94.3	84.4	105.2	▽	1,724	68	85.7	79.3	62.9	100.1	▽
肥満者	1,814	830	920.7	90.1	85.8	94.8	▽▽	1,724	393	397.2	98.9	90.7	107.9	▽
高血圧症有病者	1,802	857	858.6	99.8	95.1	104.8	▽	1,718	623	603.7	103.2	96.9	109.8	▲
高血圧症予備群	1,802	252	229.9	109.6	97.8	122.9	▲	1,718	226	207.1	109.1	96.7	123.2	▲
脂質異常症有病者	1,817	1,004	1,015.5	98.9	94.9	103.0	▽	1,734	906	899.4	100.7	96.3	105.4	▲
糖尿病有病者	1,805	257	267.0	96.3	86.0	107.8	▽	1,723	145	118.2	122.6	105.0	143.2	▲▲
糖尿病予備群	1,805	357	264.5	135.0	123.0	148.1	▲▲	1,723	296	204.9	144.5	130.3	160.2	▲▲
習慣的喫煙者	1,912	603	572.6	105.3	98.6	112.5	▲	1,877	123	147.3	83.5	70.4	99.0	▽▽

湖西市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	5,416	1,305	1,386.3	94.1	89.8	98.7	▽▽	5,059	409	409.1	100.0	91.2	109.6	▽
メタボ予備群	5,416	888	861.4	103.1	97.1	109.4	▲	5,059	273	251.5	108.6	96.8	121.7	▲▲
肥満者	5,416	2,701	2,742.1	98.5	95.9	101.1	▽	5,059	1,254	1,165.4	107.6	102.6	112.8	▲▲
高血圧症有病者	5,301	2,337	2,421.4	96.5	93.7	99.5	▽▽	5,056	1,716	1,743.1	98.4	94.8	102.3	▽
高血圧症予備群	5,301	716	685.0	104.5	97.7	111.8	▲	5,056	623	602.1	103.5	96.2	111.3	▲
脂質異常症有病者	5,434	2,834	3,022.4	93.8	91.4	96.2	▽▽	5,157	2,504	2,608.1	96.0	93.4	98.7	▽▽
糖尿病有病者	5,404	760	756.2	100.5	94.1	107.3	▲	5,124	382	342.1	111.7	101.5	122.9	▲▲
糖尿病予備群	5,404	800	768.6	104.1	97.7	110.9	▲	5,124	644	590.8	109.0	101.5	117.1	▲▲
習慣的喫煙者	5,553	1,654	1,709.0	96.8	93.0	100.7	▽	5,506	348	444.3	78.3	70.8	86.7	▽▽

静岡市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	66,139	16,980	16,626.1	102.1	100.6	103.7	▲▲	57,579	4,596	4,385.6	104.8	101.8	107.9	▲▲
メタボ予備群	66,139	10,357	10,581.7	97.9	96.0	99.8	▽▽	57,579	2,740	2,881.9	95.1	91.5	98.7	▽▽
肥満者	66,135	33,602	33,438.1	100.5	99.4	101.6	▲	57,576	13,037	13,182.4	98.9	97.2	100.6	▽
高血圧症有病者	64,229	29,600	28,607.7	103.5	102.3	104.7	▲▲	55,986	17,993	18,073.6	99.6	98.1	101.0	▽
高血圧症予備群	64,229	8,148	8,379.3	97.2	95.1	99.4	▽▽	55,986	6,216	6,556.9	94.8	92.5	97.2	▽▽
脂質異常症有病者	66,172	37,350	36,730.3	101.7	100.7	102.7	▲▲	57,798	28,260	28,219.3	100.1	99.0	101.3	▲
糖尿病有病者	65,360	8,850	8,885.7	99.6	97.5	101.7	▽	56,816	3,446	3,533.4	97.5	94.3	100.8	▽
糖尿病予備群	65,360	8,552	9,201.3	92.9	91.0	94.9	▽▽	56,816	5,863	6,261.9	93.6	91.2	96.1	▽▽
習慣的喫煙者	68,804	20,918	21,719.1	96.3	95.0	97.6	▽▽	64,209	5,443	5,446.8	99.9	97.3	102.6	▽

静岡市葵区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	23,904	6,023	6,015.6	100.1	98.0	102.3	▲	20,982	1,633	1,597.6	102.2	97.7	106.9	▲
メタボ予備群	23,904	3,672	3,821.4	96.1	93.4	98.9	▽▽	20,982	940	1,049.6	89.6	84.3	95.2	▽▽
肥満者	23,902	11,958	12,082.8	99.0	97.8	100.2	▽	20,980	4,603	4,801.2	95.9	93.5	98.3	▽▽
高血圧症有病者	23,068	10,681	10,310.6	103.6	102.2	105.0	▲▲	20,291	6,435	6,557.6	98.1	96.2	100.1	▽
高血圧症予備群	23,068	2,998	3,005.4	99.8	96.6	103.0	▽	20,291	2,326	2,377.9	97.8	94.3	101.5	▽
脂質異常症有病者	23,916	13,589	13,274.2	102.4	101.3	103.5	▲▲	21,066	10,256	10,285.7	99.7	98.4	101.1	▽
糖尿病有病者	23,596	3,147	3,215.7	97.9	94.8	101.0	▽	20,646	1,177	1,283.6	91.7	86.9	96.8	▽▽
糖尿病予備群	23,596	2,953	3,324.3	88.8	86.0	91.8	▽▽	20,646	2,043	2,276.8	89.7	86.2	93.4	▽▽
習慣的喫煙者	24,965	7,203	7,849.6	91.8	90.1	93.5	▽▽	23,691	1,826	2,012.0	90.8	87.0	94.7	▽▽

静岡市駿河区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	18,800	4,724	4,692.2	100.7	98.3	103.1	▲	16,305	1,200	1,226.5	97.8	92.8	103.2	▽
メタボ予備群	18,800	2,902	3,013.0	96.3	93.2	99.5	▽▽	16,305	736	815.6	90.2	84.2	96.7	▽▽
肥満者	18,798	9,423	9,496.4	99.2	97.9	100.6	▽	16,305	3,558	3,727.6	95.5	92.8	98.2	▽▽
高血圧症有病者	18,276	8,267	8,053.1	102.7	101.1	104.3	▲▲	15,896	4,951	5,057.8	97.9	95.7	100.1	▽
高血圧症予備群	18,276	2,316	2,391.0	96.9	93.3	100.5	▽	15,896	1,683	1,852.5	90.8	86.9	94.9	▽▽
脂質異常症有病者	18,803	10,582	10,424.4	101.5	100.3	102.8	▲▲	16,371	7,925	7,918.5	100.1	98.6	101.6	▲
糖尿病有病者	18,536	2,506	2,490.3	100.6	97.1	104.3	▲	16,049	957	984.5	97.2	91.6	103.2	▽
糖尿病予備群	18,536	2,446	2,594.2	94.3	91.0	97.7	▽▽	16,049	1,618	1,749.6	92.5	88.4	96.7	▽▽
習慣的喫煙者	19,855	6,052	6,324.8	95.7	93.8	97.7	▽▽	18,255	1,532	1,562.7	98.0	93.6	102.7	▽

静岡市清水区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	23,435	6,233	5,918.3	105.3	103.2	107.5	▲▲	20,292	1,763	1,561.6	112.9	108.1	117.9	▲▲
メタボ予備群	23,435	3,783	3,747.3	101.0	98.1	103.8	▲	20,292	1,064	1,016.7	104.7	98.9	110.7	▲
肥満者	23,435	12,221	11,858.8	103.1	101.8	104.3	▲▲	20,291	4,876	4,653.6	104.8	102.3	107.3	▲▲
高血圧症有病者	22,885	10,652	10,244.0	104.0	102.6	105.4	▲▲	19,799	6,607	6,458.2	102.3	100.4	104.3	▲▲
高血圧症予備群	22,885	2,834	2,983.0	95.0	91.9	98.2	▽▽	19,799	2,207	2,326.5	94.9	91.3	98.5	▽▽
脂質異常症有病者	23,453	13,179	13,031.8	101.1	100.0	102.2	▲▲	20,361	10,079	10,015.1	100.6	99.3	102.0	▲
糖尿病有病者	23,228	3,197	3,179.7	100.5	97.5	103.7	▲	20,121	1,312	1,265.3	103.7	98.6	109.1	▲
糖尿病予備群	23,228	3,153	3,282.7	96.0	93.1	99.1	▽▽	20,121	2,202	2,235.5	98.5	94.8	102.3	▽
習慣的喫煙者	23,984	7,663	7,544.6	101.6	99.8	103.4	▲	22,263	2,085	1,872.0	111.4	107.1	115.9	▲▲

浜松市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	78,681	18,781	19,410.2	96.8	95.4	98.2	▽▽	68,205	5,194	5,037.6	103.1	100.3	105.9	▲▲
メタボ予備群	78,681	12,295	12,614.5	97.5	95.8	99.2	▽▽	68,205	3,426	3,402.8	100.7	97.3	104.1	▲
肥満者	78,679	38,439	39,639.8	97.0	96.0	97.9	▽▽	68,205	15,068	15,551.9	96.9	95.3	98.4	▽▽
高血圧症有病者	76,960	31,790	33,376.4	95.2	94.2	96.3	▽▽	67,387	20,142	20,955.6	96.1	94.8	97.5	▽▽
高血圧症予備群	76,960	9,708	10,087.4	96.2	94.3	98.2	▽▽	67,387	7,570	7,791.2	97.2	95.0	99.4	▽▽
脂質異常症有病者	78,851	42,855	43,582.4	98.3	97.4	99.3	▽▽	68,945	32,534	32,870.2	99.0	97.9	100.1	▽
糖尿病有病者	77,355	10,240	10,219.9	100.2	98.3	102.2	▲	67,060	4,214	4,025.4	104.7	101.5	107.9	▲▲
糖尿病予備群	77,355	12,538	10,711.4	117.1	115.0	119.1	▲▲	67,060	8,979	7,182.9	125.0	122.4	127.6	▲▲
習慣的喫煙者	81,505	23,413	26,109.8	89.7	88.5	90.8	▽▽	76,896	5,218	6,671.4	78.2	76.1	80.4	▽▽

浜松市中央区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	58,761	14,238	14,452.5	98.5	97.2	99.8	▽▽	50,854	3,836	3,710.6	103.4	100.5	106.3	▲▲
メタボ予備群	58,761	9,242	9,433.0	98.0	96.3	99.7	▽▽	50,854	2,487	2,539.9	97.9	94.5	101.4	▽
肥満者	58,759	29,043	29,603.5	98.1	97.4	98.8	▽▽	50,854	11,111	11,585.1	95.9	94.5	97.4	▽▽
高血圧症有病者	57,626	23,618	24,859.4	95.0	94.2	95.9	▽▽	50,265	14,857	15,418.3	96.4	95.2	97.6	▽▽
高血圧症予備群	57,626	7,292	7,567.7	96.4	94.5	98.3	▽▽	50,265	5,646	5,791.3	97.5	95.3	99.7	▽▽
脂質異常症有病者	58,890	32,082	32,541.7	98.6	97.9	99.3	▽▽	51,453	23,947	24,340.7	98.4	97.6	99.2	▽▽
糖尿病有病者	57,829	7,686	7,598.0	101.2	99.2	103.1	▲	50,064	3,117	2,959.3	105.3	102.1	108.7	▲▲
糖尿病予備群	57,829	9,343	7,991.9	116.9	115.0	118.9	▲▲	50,064	6,717	5,306.5	126.6	124.1	129.1	▲▲
習慣的喫煙者	60,813	17,570	19,566.8	89.8	88.8	90.8	▽▽	57,567	4,073	5,046.8	80.7	78.5	83.0	▽▽

浜松市浜名区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低い有意でない、▲ 高い有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	17,231	3,875	4,237.5	91.4	89.0	94.0	▽▽	14,968	1,164	1,122.0	103.7	98.3	109.5	▲
メタボ予備群	17,231	2,683	2,757.5	97.3	94.1	100.7	▽	14,968	810	743.2	109.0	102.1	116.3	▲▲
肥満者	17,231	8,155	8,665.4	94.1	92.7	95.6	▽▽	14,968	3,422	3,414.0	100.2	97.4	103.2	▲
高血圧症有病者	16,747	6,925	7,256.0	95.4	93.8	97.1	▽▽	14,790	4,499	4,682.0	96.1	93.8	98.4	▽▽
高血圧症予備群	16,747	2,102	2,189.7	96.0	92.3	99.8	▽▽	14,790	1,659	1,714.0	96.8	92.6	101.2	▽
脂質異常症有病者	17,267	9,259	9,527.1	97.2	95.9	98.5	▽▽	15,100	7,259	7,248.5	100.1	98.5	101.8	▲
糖尿病有病者	16,897	2,140	2,225.5	96.2	92.5	100.0	▽▽	14,642	953	897.8	106.1	100.0	112.7	▲
糖尿病予備群	16,897	2,725	2,327.5	117.1	113.2	121.1	▲▲	14,642	1,896	1,585.8	119.6	114.8	124.5	▲▲
習慣的喫煙者	17,762	4,989	5,667.5	88.0	86.0	90.1	▽▽	16,580	979	1,412.5	69.3	65.3	73.6	▽▽

浜松市天竜区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2,689	668	720.2	92.7	86.9	99.0	▽▽	2,383	194	205.0	94.6	82.7	108.2	▽
メタボ予備群	2,689	370	424.0	87.3	79.4	95.9	▽▽	2,383	129	119.7	107.8	91.2	127.4	▲
肥満者	2,689	1,241	1,371.0	90.5	86.9	94.3	▽▽	2,383	535	552.9	96.8	89.8	104.2	▽
高血圧症有病者	2,587	1,247	1,261.1	98.9	95.0	102.9	▽	2,332	786	855.4	91.9	86.8	97.3	▽▽
高血圧症予備群	2,587	314	330.0	95.2	85.8	105.5	▽	2,332	265	285.9	92.7	82.8	103.8	▽
脂質異常症有病者	2,694	1,514	1,513.5	100.0	96.8	103.4	▲	2,392	1,328	1,281.1	103.7	100.0	107.4	▲▲
糖尿病有病者	2,629	414	396.4	104.4	95.6	114.0	▲	2,354	144	168.2	85.6	73.1	100.2	▽
糖尿病予備群	2,629	470	392.1	119.9	110.5	130.1	▲▲	2,354	366	290.6	126.0	114.7	138.3	▲▲
習慣的喫煙者	2,930	854	875.5	97.5	92.2	103.2	▽	2,749	166	212.1	78.3	67.6	90.7	▽▽