



# 下田市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1,605	443	402.0	110.2	101.8	119.3	▲▲	1,490	102	117.5	86.8	72.0	104.7	▽
メタボ予備群	1,605	292	262.2	111.4	100.4	123.5	▲▲	1,490	97	76.1	127.4	105.2	154.3	▲▲
肥満者	1,605	899	836.4	107.5	102.9	112.2	▲▲	1,490	359	349.7	102.6	93.8	112.3	▲
高血圧症有病者	1,501	788	675.5	116.6	111.2	122.4	▲▲	1,412	517	477.7	108.2	101.1	115.9	▲▲
高血圧症予備群	1,501	199	175.5	113.4	99.6	129.0	▲	1,412	183	153.9	118.9	103.9	136.1	▲▲
脂質異常症有病者	1,597	966	933.3	103.5	99.5	107.7	▲	1,489	813	807.9	100.6	96.1	105.4	▲
糖尿病有病者	1,497	222	218.1	101.8	90.2	114.9	▲	1,410	82	98.7	83.1	67.4	102.5	▽
糖尿病予備群	1,497	161	209.5	76.9	66.4	88.9	▽▽	1,410	93	160.9	57.8	47.5	70.3	▽▽
習慣的喫煙者	1,606	525	497.0	105.6	98.5	113.3	▲	1,491	158	119.1	132.7	114.5	153.7	▲▲

# 東伊豆町



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1,090	349	285.3	122.3	112.2	133.3	▲▲	1,076	88	93.1	94.5	77.4	115.4	▽
メタボ予備群	1,090	198	176.9	111.9	98.7	126.9	▲	1,076	51	55.2	92.4	70.7	120.8	▽
肥満者	1,090	652	571.5	114.1	108.7	119.8	▲▲	1,076	274	255.9	107.1	96.7	118.6	▲
高血圧症有病者	1,022	543	485.8	111.8	105.5	118.4	▲▲	1,033	428	385.1	111.1	103.4	119.5	▲▲
高血圧症予備群	1,022	159	118.8	133.8	116.0	154.3	▲▲	1,033	125	117.4	106.5	90.4	125.5	▲
脂質異常症有病者	1,091	700	641.9	109.1	104.3	114.0	▲▲	1,078	658	619.2	106.3	101.3	111.5	▲▲
糖尿病有病者	1,012	154	156.9	98.2	84.9	113.5	▽	1,043	70	80.1	87.4	69.7	109.5	▽
糖尿病予備群	1,012	115	146.7	78.4	66.0	93.1	▽▽	1,043	106	128.3	82.6	69.0	98.9	▽▽
習慣的喫煙者	1,091	371	322.3	115.1	106.0	125.0	▲▲	1,078	137	78.2	175.2	149.9	204.8	▲▲

# 河津町



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	610	176	155.4	113.2	100.0	128.2	▲	528	41	43.2	94.9	70.7	127.3	▽
メタボ予備群	610	119	99.3	119.8	102.0	140.7	▲▲	528	29	26.8	108.1	75.9	154.0	▲
肥満者	610	347	318.4	109.0	101.7	116.8	▲▲	528	130	124.5	104.4	90.0	121.2	▲
高血圧症有病者	574	318	263.6	120.7	112.1	129.8	▲▲	503	204	177.9	114.7	103.2	127.5	▲▲
高血圧症予備群	574	78	66.9	116.5	94.8	143.2	▲	503	67	55.7	120.3	96.3	150.3	▲
脂質異常症有病者	607	348	355.3	97.9	91.4	104.9	▽	526	311	289.6	107.4	100.0	115.3	▲▲
糖尿病有病者	566	87	84.9	102.5	84.5	124.3	▲	500	31	36.3	85.4	60.8	120.1	▽
糖尿病予備群	566	64	80.4	79.6	63.2	100.3	▽	500	20	58.4	34.3	22.3	52.7	▽▽
習慣的喫煙者	610	207	184.8	112.0	100.3	125.1	▲▲	528	44	40.4	108.9	82.1	144.5	▲

# 南伊豆町



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	618	186	161.9	114.9	101.9	129.5	▲▲	646	35	54.7	64.0	46.4	88.3	▽▽
メタボ予備群	618	117	100.0	117.0	99.4	137.7	▲	646	33	32.8	100.6	72.2	140.2	▲
肥満者	618	353	323.4	109.2	102.0	116.9	▲▲	646	133	152.8	87.0	74.8	101.3	▽
高血圧症有病者	576	323	277.7	116.3	108.2	125.0	▲▲	625	277	227.3	121.9	111.6	133.0	▲▲
高血圧症予備群	576	71	66.8	106.3	85.5	132.1	▲	625	68	70.0	97.2	77.7	121.6	▽
脂質異常症有病者	612	367	359.5	102.1	95.7	108.9	▲	642	341	362.7	94.0	87.4	101.1	▽
糖尿病有病者	569	107	89.5	119.6	100.8	141.8	▲▲	612	37	46.5	79.6	58.2	108.7	▽
糖尿病予備群	569	66	83.2	79.3	63.2	99.5	▽▽	612	41	74.3	55.2	41.1	74.1	▽▽
習慣的喫煙者	618	199	181.2	109.9	98.0	123.2	▲	646	69	47.7	144.7	115.8	180.8	▲▲

# 松崎町



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	559	154	147.0	104.8	91.6	119.8	▲	540	38	45.2	84.0	61.9	114.2	▽
メタボ予備群	559	103	90.6	113.7	95.5	135.3	▲▲	540	38	27.7	137.0	100.9	186.1	▲▲▲
肥満者	559	322	293.4	109.7	102.2	117.8	▲▲▲	540	141	127.7	110.4	95.8	127.2	▲▲
高血圧症有病者	504	286	242.8	117.8	109.1	127.1	▲▲▲	503	210	181.6	115.6	104.3	128.2	▲▲▲
高血圧症予備群	504	67	58.5	114.4	91.6	143.0	▲▲	503	78	56.6	137.7	112.3	168.8	▲▲▲
脂質異常症有病者	554	342	326.6	104.7	98.1	111.8	▲▲	536	283	303.0	93.4	86.2	101.2	▽
糖尿病有病者	499	82	78.4	104.6	85.9	127.5	▲▲	495	35	37.2	94.1	68.4	129.5	▽
糖尿病予備群	499	59	73.3	80.5	63.4	102.3	▽	495	38	60.2	63.2	46.5	85.7	▽▽
習慣的喫煙者	559	155	166.5	93.1	81.4	106.4	▽	540	36	40.7	88.5	64.5	121.3	▽

# 西伊豆町



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	576	160	149.6	107.0	93.8	122.0	▲	631	46	53.4	86.2	65.3	113.8	▽
メタボ予備群	576	104	93.7	111.0	93.3	132.1	▲	631	33	32.1	102.8	73.8	143.3	▲
肥満者	576	321	301.7	106.4	98.9	114.4	▲	631	158	149.4	105.7	92.4	121.0	▲
高血圧症有病者	532	290	251.8	115.2	106.6	124.5	▲▲	592	258	218.6	118.0	107.7	129.4	▲▲
高血圧症予備群	532	87	61.9	140.5	116.0	170.3	▲▲	592	74	66.9	110.7	89.4	136.9	▲
脂質異常症有病者	572	342	336.2	101.7	95.1	108.8	▲	630	368	355.2	103.6	97.0	110.6	▲
糖尿病有病者	527	84	81.3	103.3	84.9	125.7	▲	597	42	45.4	92.4	69.1	123.7	▽
糖尿病予備群	527	52	76.1	68.4	52.8	88.5	▽▽	597	56	72.5	77.2	60.2	99.1	▽▽
習慣的喫煙者	577	204	171.3	119.1	106.7	133.0	▲▲	630	64	46.9	136.4	108.1	172.0	▲▲

# 熱海市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2,218	661	590.3	112.0	105.1	119.3	▲▲	2,553	237	225.4	105.2	93.2	118.7	▲
メタボ予備群	2,218	400	358.3	111.6	102.2	122.0	▲▲	2,553	124	130.4	95.1	80.2	112.9	▽
肥満者	2,217	1,297	1,163.6	111.5	107.6	115.4	▲▲	2,553	657	608.1	108.0	101.2	115.4	▲▲
高血圧症有病者	2,098	1,063	1,022.9	103.9	99.6	108.4	▲	2,476	942	942.1	100.0	95.1	105.1	▽
高血圧症予備群	2,098	268	243.3	110.1	98.5	123.1	▲	2,476	381	282.7	134.8	123.0	147.8	▲▲
脂質異常症有病者	2,210	1,396	1,303.2	107.1	103.8	110.6	▲▲	2,549	1,510	1,478.9	102.1	98.9	105.4	▲
糖尿病有病者	2,072	408	330.4	123.5	113.3	134.7	▲▲	2,467	195	194.7	100.2	87.6	114.5	▲
糖尿病予備群	2,072	249	306.1	81.3	72.4	91.4	▽▽	2,467	255	309.2	82.5	73.4	92.6	▽▽
習慣的喫煙者	2,218	714	643.4	111.0	104.5	117.9	▲▲	2,553	363	180.5	201.1	183.0	221.1	▲▲

# 伊東市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。



「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	5,312	1,552	1,418.6	109.4	105.0	114.0	▲▲	5,922	500	527.7	94.8	87.2	103.0	▽
メタボ予備群	5,312	857	857.0	100.0	94.1	106.3	▽	5,922	294	302.1	97.3	87.2	108.7	▽
肥満者	5,312	2,890	2,786.8	103.7	101.2	106.3	▲▲	5,922	1,344	1,413.6	95.1	90.8	99.6	▽▽
高血圧症有病者	5,116	2,612	2,489.9	104.9	102.1	107.7	▲▲	5,736	2,297	2,213.8	103.8	100.6	107.1	▲▲
高血圧症予備群	5,116	700	592.5	118.1	110.3	126.5	▲▲	5,736	718	657.7	109.2	102.0	116.8	▲▲
脂質異常症有病者	5,294	3,313	3,120.3	106.2	104.0	108.4	▲▲	5,914	3,513	3,443.0	102.0	99.9	104.2	▲
糖尿病有病者	5,044	871	796.7	109.3	103.0	116.1	▲▲	5,631	437	450.4	97.0	88.8	106.1	▽
糖尿病予備群	5,044	668	738.3	90.5	84.4	97.1	▽▽	5,631	586	711.2	82.4	76.4	88.9	▽▽
習慣的喫煙者	5,317	1,693	1,523.5	111.1	106.9	115.6	▲▲	5,930	766	414.5	184.8	173.1	197.2	▲▲



# 沼津市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	17,714	4,588	4,356.5	105.3	102.8	107.9	▲▲	16,631	1,393	1,279.6	108.9	103.7	114.3	▲▲▲
メタボ予備群	17,714	3,246	2,904.7	111.7	108.4	115.2	▲▲	16,631	1,038	845.5	122.8	116.0	130.0	▲▲▲
肥満者	17,714	9,880	9,214.2	107.2	105.9	108.6	▲▲	16,631	4,313	3,889.9	110.9	108.1	113.7	▲▲▲
高血圧症有病者	17,154	7,447	7,446.8	100.0	98.4	101.7	▲	16,095	5,191	5,268.3	98.5	96.4	100.7	▽
高血圧症予備群	17,154	1,938	2,012.8	96.3	92.4	100.3	▽	16,095	1,513	1,726.8	87.6	83.6	91.8	▽▽
脂質異常症有病者	17,625	10,297	10,273.1	100.2	99.0	101.5	▲	16,581	8,872	8,827.8	100.5	99.1	101.9	▲
糖尿病有病者	17,189	2,483	2,410.1	103.0	99.4	106.7	▲	16,112	981	1,084.7	90.4	85.3	95.9	▽▽
糖尿病予備群	17,189	1,967	2,346.2	83.8	80.5	87.3	▽▽	16,112	1,285	1,773.4	72.5	68.8	76.3	▽▽
習慣的喫煙者	17,714	6,105	5,570.3	109.6	107.5	111.8	▲▲	16,638	1,775	1,355.9	130.9	125.5	136.6	▲▲

# 三島市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	9,088	2,331	2,245.5	103.8	100.3	107.5	▲▲	9,172	744	703.0	105.8	98.9	113.3	▲
メタボ予備群	9,088	1,514	1,488.1	101.7	97.2	106.5	▲	9,172	419	465.2	90.1	82.1	98.8	▽▽
肥満者	9,088	4,782	4,727.6	101.2	99.2	103.1	▲	9,172	2,145	2,143.7	100.1	96.5	103.8	▲
高血圧症有病者	8,881	3,881	3,872.7	100.2	97.9	102.6	▲	8,915	2,822	2,901.6	97.3	94.4	100.2	▽
高血圧症予備群	8,881	1,088	1,041.1	104.5	98.9	110.4	▲	8,915	1,061	953.8	111.2	105.2	117.6	▲▲
脂質異常症有病者	9,021	5,405	5,259.4	102.8	101.1	104.5	▲▲	9,089	4,955	4,825.7	102.7	100.8	104.6	▲▲
糖尿病有病者	8,653	1,282	1,227.6	104.4	99.4	109.8	▲	8,743	622	590.5	105.3	97.8	113.5	▲
糖尿病予備群	8,653	1,103	1,187.9	92.9	87.9	98.0	▽▽	8,743	840	963.3	87.2	81.8	92.9	▽▽
習慣的喫煙者	9,092	2,790	2,839.3	98.3	95.3	101.3	▽	9,174	802	748.9	107.1	100.3	114.3	▲▲

# 裾野市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4,177	1,066	1,038.4	102.7	97.5	108.1	▲	4,085	358	326.1	109.8	99.5	121.1	▲
メタボ予備群	4,177	776	680.0	114.1	107.1	121.6	▲▲	4,085	264	206.5	127.9	113.9	143.6	▲▲
肥満者	4,177	2,267	2,166.9	104.6	101.8	107.6	▲▲	4,085	1,090	958.6	113.7	108.1	119.6	▲▲
高血圧症有病者	4,014	1,801	1,776.6	101.4	98.0	104.9	▲	3,914	1,453	1,340.6	108.4	104.1	112.9	▲▲
高血圧症予備群	4,014	519	467.7	111.0	102.5	120.2	▲▲	3,914	469	427.1	109.8	100.9	119.5	▲▲
脂質異常症有病者	4,164	2,461	2,422.9	101.6	99.1	104.2	▲	4,071	2,286	2,206.9	103.6	100.8	106.4	▲▲
糖尿病有病者	3,991	521	571.6	91.1	84.2	98.7	▽▽	3,918	285	276.9	102.9	92.1	115.0	▲
糖尿病予備群	3,991	451	547.6	82.4	75.5	89.8	▽▽	3,918	298	446.9	66.7	59.8	74.3	▽▽
習慣的喫煙者	4,177	1,398	1,278.2	109.4	104.8	114.1	▲▲	4,086	361	319.9	112.9	102.3	124.5	▲▲

# 伊豆市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3,114	900	808.8	111.3	105.3	117.5	▲▲	3,076	310	262.4	118.2	106.4	131.2	▲▲▲
メタボ予備群	3,114	465	504.1	92.3	84.9	100.3	▽	3,076	165	157.1	105.0	90.6	121.7	▲
肥満者	3,114	1,655	1,627.2	101.7	98.4	105.1	▲	3,076	886	729.0	121.5	115.0	128.4	▲▲▲
高血圧症有病者	3,022	1,683	1,410.8	119.3	115.6	123.1	▲▲	2,979	1,364	1,086.7	125.5	120.7	130.5	▲▲▲
高血圧症予備群	3,022	345	351.3	98.2	89.0	108.4	▽	2,979	347	335.6	103.4	93.7	114.1	▲
脂質異常症有病者	3,107	1,881	1,823.4	103.2	100.3	106.1	▲▲	3,074	1,819	1,749.5	104.0	101.0	107.1	▲▲▲
糖尿病有病者	3,002	540	455.9	118.4	109.8	127.8	▲▲	2,956	289	223.9	129.1	115.8	143.9	▲▲▲
糖尿病予備群	3,002	409	429.3	95.3	87.1	104.2	▽	2,956	360	359.7	100.1	90.9	110.2	▲
習慣的喫煙者	3,117	1,033	924.9	111.7	106.3	117.4	▲▲	3,082	301	226.9	132.6	119.2	147.6	▲▲▲

# 伊豆の国市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4,628	1,293	1,155.8	111.9	106.8	117.1	▲▲	4,748	445	378.5	117.6	107.7	128.3	▲▲▲
メタボ予備群	4,628	794	756.2	105.0	98.6	111.8	▲	4,748	216	240.7	89.7	78.9	102.1	▽
肥満者	4,626	2,567	2,408.2	106.6	103.9	109.4	▲▲	4,748	1,244	1,114.6	111.6	106.5	117.0	▲▲▲
高血圧症有病者	4,549	2,186	2,007.9	108.9	105.7	112.2	▲▲	4,618	1,759	1,568.6	112.1	108.1	116.3	▲▲▲
高血圧症予備群	4,549	546	532.2	102.6	94.9	110.9	▲	4,618	483	501.8	96.3	88.5	104.7	▽
脂質異常症有病者	4,616	2,758	2,693.8	102.4	100.0	104.8	▲▲	4,738	2,625	2,570.7	102.1	99.6	104.7	▲
糖尿病有病者	4,556	691	650.3	106.3	99.3	113.8	▲	4,650	345	324.8	106.2	96.1	117.5	▲
糖尿病予備群	4,556	563	627.0	89.8	83.2	97.0	▽▽	4,650	477	526.0	90.7	83.3	98.7	▽▽
習慣的喫煙者	4,629	1,589	1,425.4	111.5	107.2	116.0	▲▲	4,748	506	372.6	135.8	125.2	147.4	▲▲▲

# 函南町



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3,192	798	776.5	102.8	96.8	109.1	▲	2,948	216	226.3	95.4	84.0	108.5	▽
メタボ予備群	3,192	594	523.9	113.4	105.5	121.9	▲▲	2,948	159	149.9	106.0	91.2	123.3	▲
肥満者	3,192	1,739	1,656.9	105.0	101.7	108.3	▲▲	2,948	733	689.7	106.3	99.8	113.1	▲
高血圧症有病者	3,124	1,348	1,335.4	100.9	97.0	105.1	▲	2,869	979	935.0	104.7	99.5	110.1	▲
高血圧症予備群	3,124	383	366.8	104.4	95.1	114.6	▲	2,869	330	307.1	107.5	97.1	118.9	▲
脂質異常症有病者	3,173	1,826	1,845.2	99.0	96.1	101.9	▽	2,933	1,527	1,560.6	97.8	94.5	101.3	▽
糖尿病有病者	3,091	433	426.4	101.5	93.1	110.8	▲	2,836	178	190.3	93.6	81.2	107.8	▽
糖尿病予備群	3,091	437	417.1	104.8	96.1	114.2	▲	2,836	271	310.9	87.2	77.9	97.6	▽▽
習慣的喫煙者	3,194	1,101	1,010.2	109.0	103.9	114.3	▲▲	2,949	313	241.1	129.8	117.0	144.1	▲▲

# 清水町



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2,924	751	699.6	107.4	101.0	114.2	▲▲	2,819	252	207.2	121.6	108.2	136.8	▲▲▲
メタボ予備群	2,924	536	482.3	111.1	103.0	119.9	▲▲	2,819	197	143.0	137.8	120.5	157.5	▲▲▲
肥満者	2,924	1,631	1,517.2	107.5	104.1	111.0	▲▲	2,819	763	655.6	116.4	109.6	123.6	▲▲▲
高血圧症有病者	2,855	1,248	1,190.1	104.9	100.6	109.3	▲▲	2,734	908	849.3	106.9	101.4	112.7	▲▲▲
高血圧症予備群	2,855	342	336.5	101.6	92.1	112.2	▲	2,734	325	286.6	113.4	102.5	125.5	▲▲
脂質異常症有病者	2,907	1,714	1,688.4	101.5	98.5	104.6	▲	2,811	1,489	1,454.1	102.4	98.9	106.0	▲
糖尿病有病者	2,821	397	379.8	104.5	95.5	114.5	▲	2,725	172	174.5	98.6	85.4	113.9	▽
糖尿病予備群	2,821	324	375.9	86.2	77.8	95.5	▽▽	2,725	231	287.5	80.4	71.1	90.9	▽▽
習慣的喫煙者	2,924	983	943.8	104.2	99.0	109.6	▲	2,820	296	238.9	123.9	111.3	137.9	▲▲

# 長泉町



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。



「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3,477	853	833.3	102.4	96.6	108.5	▲	3,436	229	244.5	93.7	82.7	106.1	▽
メタボ予備群	3,477	598	571.7	104.6	97.3	112.5	▲	3,436	167	172.9	96.6	83.4	111.9	▽
肥満者	3,477	1,840	1,800.9	102.2	99.0	105.4	▲	3,436	773	795.2	97.2	91.4	103.4	▽
高血圧症有病者	3,402	1,388	1,424.7	97.4	93.6	101.4	▽	3,324	1,003	1,001.6	100.1	95.1	105.4	▲
高血圧症予備群	3,402	428	399.9	107.0	98.0	116.9	▲	3,324	391	344.4	113.5	103.5	124.5	▲▲
脂質異常症有病者	3,461	2,000	2,007.2	99.6	96.9	102.5	▽	3,425	1,791	1,728.3	103.6	100.4	107.0	▲▲
糖尿病有病者	3,307	434	450.0	96.4	88.4	105.2	▽	3,287	199	204.7	97.2	85.0	111.2	▽
糖尿病予備群	3,307	364	442.1	82.3	74.8	90.7	▽▽	3,287	248	338.0	73.4	65.1	82.7	▽▽
習慣的喫煙者	3,478	1,136	1,112.1	102.2	97.4	107.1	▲	3,437	262	297.2	88.1	78.5	99.0	▽▽



# 御殿場市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	6,909	1,979	1,731.0	114.3	110.2	118.6	▲▲	6,971	660	555.9	118.7	110.5	127.5	▲▲▲
メタボ予備群	6,909	1,208	1,124.2	107.5	102.1	113.0	▲▲	6,971	415	353.8	117.3	107.0	128.6	▲▲▲
肥満者	6,908	3,827	3,590.0	106.6	104.4	108.9	▲▲	6,971	1,957	1,637.1	119.5	115.2	124.1	▲▲▲
高血圧症有病者	6,639	3,236	2,970.1	109.0	106.3	111.6	▲▲	6,766	2,635	2,298.3	114.6	111.3	118.1	▲▲
高血圧症予備群	6,639	842	773.7	108.8	102.2	115.8	▲▲	6,766	813	738.3	110.1	103.3	117.4	▲▲
脂質異常症有病者	6,890	4,204	4,017.4	104.6	102.7	106.6	▲▲	6,954	3,920	3,776.9	103.8	101.7	105.9	▲▲
糖尿病有病者	6,533	1,055	946.4	111.5	105.5	117.7	▲▲	6,667	524	470.1	111.5	102.8	120.9	▲▲
糖尿病予備群	6,533	769	904.6	85.0	79.6	90.8	▽▽	6,667	625	761.7	82.1	76.2	88.3	▽▽
習慣的喫煙者	6,909	2,476	2,110.3	117.3	113.7	121.1	▲▲	6,974	781	548.8	142.3	133.3	151.9	▲▲

# 小山町



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1,423	415	372.4	111.4	102.8	120.8	▲▲	1,505	139	128.5	108.2	92.4	126.7	▲
メタボ予備群	1,423	239	229.6	104.1	92.7	116.8	▲	1,505	79	76.4	103.4	83.5	128.1	▲
肥満者	1,423	816	743.1	109.8	105.0	114.8	▲▲	1,505	429	356.1	120.5	111.2	130.5	▲▲
高血圧症有病者	1,356	662	643.4	102.9	97.4	108.6	▲	1,436	571	529.5	107.8	101.2	114.9	▲▲
高血圧症予備群	1,356	172	157.0	109.6	95.3	126.0	▲	1,436	179	162.0	110.5	96.4	126.7	▲
脂質異常症有病者	1,416	873	830.6	105.1	100.9	109.5	▲▲	1,495	909	849.9	107.0	102.7	111.4	▲▲
糖尿病有病者	1,332	229	206.5	110.9	98.6	124.7	▲	1,418	108	109.1	99.0	82.6	118.6	▽
糖尿病予備群	1,332	168	192.0	87.5	76.0	100.8	▽	1,418	132	174.2	75.8	64.4	89.1	▽▽
習慣的喫煙者	1,423	458	414.1	110.6	102.6	119.3	▲▲	1,505	123	110.0	111.9	94.5	132.5	▲

# 富士宮市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	12,590	3,152	3,056.8	103.1	100.1	106.2	▲▲	11,396	886	860.2	103.0	96.8	109.6	▲
メタボ予備群	12,590	2,248	2,066.3	108.8	104.9	112.9	▲▲	11,396	657	578.3	113.6	105.6	122.2	▲▲
肥満者	12,590	6,714	6,532.8	102.8	101.1	104.4	▲▲	11,396	2,841	2,658.1	106.9	103.6	110.3	▲▲
高血圧症有病者	12,083	5,674	5,167.7	109.8	107.8	111.9	▲▲	10,803	3,826	3,486.5	109.7	107.0	112.5	▲▲
高血圧症予備群	12,083	1,427	1,417.7	100.7	96.0	105.6	▲	10,803	1,232	1,153.7	106.8	101.4	112.4	▲▲
脂質異常症有病者	12,550	7,294	7,294.1	100.0	98.6	101.5	▽	11,377	6,107	5,981.3	102.1	100.4	103.8	▲▲
糖尿病有病者	12,039	1,640	1,662.0	98.7	94.4	103.1	▽	10,846	732	719.3	101.8	95.0	109.0	▲
糖尿病予備群	12,039	1,474	1,624.5	90.7	86.6	95.1	▽▽	10,846	998	1,179.5	84.6	79.8	89.7	▽▽
習慣的喫煙者	12,591	4,530	3,989.3	113.6	111.0	116.2	▲▲	11,399	1,241	943.8	131.5	124.9	138.4	▲▲

# 富士市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲▲ 高いが無意味、▲▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	23,508	5,999	5,677.4	105.7	103.5	107.9	▲▲	20,082	1,550	1,461.9	106.0	101.2	111.0	▲▲▲
メタボ予備群	23,508	4,147	3,868.8	107.2	104.4	110.1	▲▲	20,082	1,083	1,021.0	106.1	100.3	112.2	▲▲▲
肥満者	23,507	12,534	12,206.7	102.7	101.5	103.9	▲▲	20,082	4,943	4,665.2	106.0	103.5	108.5	▲▲
高血圧症有病者	22,569	10,361	9,583.1	108.1	106.6	109.6	▲▲	19,109	6,455	5,909.2	109.2	107.2	111.4	▲▲
高血圧症予備群	22,569	2,827	2,654.5	106.5	103.0	110.1	▲▲	19,109	2,145	2,009.1	106.8	102.7	111.0	▲▲
脂質異常症有病者	23,399	14,075	13,605.2	103.5	102.4	104.5	▲▲	20,050	10,667	10,336.3	103.2	101.9	104.5	▲▲
糖尿病有病者	22,455	3,049	3,074.1	99.2	96.1	102.4	▽	19,046	1,156	1,209.8	95.6	90.5	100.9	▽
糖尿病予備群	22,455	2,690	3,023.4	89.0	86.0	92.1	▽▽	19,046	1,593	2,006.2	79.4	75.8	83.1	▽▽
習慣的喫煙者	23,509	8,577	7,529.9	113.9	112.1	115.8	▲▲	20,086	2,219	1,715.8	129.3	124.6	134.3	▲▲

# 島田市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	10,609	2,383	2,589.0	92.0	88.9	95.3	▽▽	9,295	537	697.9	76.9	70.9	83.4	▽▽
メタボ予備群	10,609	1,579	1,737.5	90.9	86.9	95.0	▽▽	9,295	389	471.2	82.6	75.0	90.9	▽▽
肥満者	10,609	4,971	5,505.2	90.3	88.5	92.1	▽▽	9,295	1,795	2,164.6	82.9	79.6	86.4	▽▽
高血圧症有病者	10,147	4,343	4,376.7	99.2	97.1	101.5	▽	8,809	2,704	2,822.5	95.8	92.9	98.8	▽▽
高血圧症予備群	10,147	1,309	1,188.7	110.1	104.8	115.7	▲▲	8,809	950	938.8	101.2	95.4	107.4	▲
脂質異常症有病者	10,516	5,892	6,115.4	96.3	94.8	98.0	▽▽	9,243	4,736	4,852.4	97.6	95.7	99.5	▽▽
糖尿病有病者	10,122	1,371	1,409.8	97.2	92.6	102.1	▽	8,798	539	581.3	92.7	85.5	100.5	▽
糖尿病予備群	10,122	1,546	1,373.6	112.5	107.6	117.7	▲▲	8,798	1,052	956.2	110.0	104.1	116.3	▲▲
習慣的喫煙者	10,609	3,261	3,349.2	97.4	94.7	100.1	▽	9,282	581	770.1	75.4	69.8	81.5	▽▽

# 焼津市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	14,703	3,594	3,537.3	101.6	98.8	104.5	▲	12,687	939	945.3	99.3	93.5	105.5	▽
メタボ予備群	14,703	2,374	2,417.8	98.2	94.7	101.8	▽	12,687	613	643.6	95.2	88.3	102.7	▽
肥満者	14,700	7,385	7,622.9	96.9	95.4	98.4	▽▽	12,687	2,851	2,954.3	96.5	93.5	99.6	▽▽
高血圧症有病者	14,219	6,180	5,996.0	103.1	101.2	105.0	▲▲	12,221	4,008	3,863.5	103.7	101.2	106.4	▲▲
高血圧症予備群	14,219	1,941	1,671.3	116.1	111.5	120.9	▲▲	12,221	1,408	1,292.9	108.9	103.8	114.3	▲▲
脂質異常症有病者	14,588	8,097	8,471.4	95.6	94.2	96.9	▽▽	12,638	6,159	6,596.8	93.4	91.7	95.0	▽▽
糖尿病有病者	13,978	1,961	1,903.4	103.0	99.0	107.2	▲	11,892	838	779.9	107.4	100.8	114.5	▲▲
糖尿病予備群	13,978	1,997	1,873.6	106.6	102.4	110.9	▲▲	11,892	1,804	1,281.2	140.8	135.1	146.8	▲▲
習慣的喫煙者	14,703	4,974	4,711.6	105.6	103.3	107.9	▲▲	12,682	1,023	1,060.5	96.5	91.1	102.2	▽

# 藤枝市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	14,942	3,241	3,593.2	90.2	87.5	92.9	▽▽	13,605	590	1,005.7	58.7	54.3	63.4	▽▽
メタボ予備群	14,942	2,312	2,452.2	94.3	90.9	97.8	▽▽	13,605	434	687.7	63.1	57.6	69.1	▽▽
肥満者	14,942	7,022	7,737.3	90.8	89.3	92.3	▽▽	13,605	2,565	3,161.2	81.1	78.4	84.0	▽▽
高血圧症有病者	14,413	6,131	6,089.8	100.7	98.8	102.6	▲	13,132	4,265	4,108.0	103.8	101.3	106.4	▲▲
高血圧症予備群	14,413	1,894	1,691.4	112.0	107.5	116.7	▲▲	13,132	1,516	1,382.6	109.7	104.7	114.8	▲▲
脂質異常症有病者	14,826	8,199	8,599.8	95.3	94.0	96.7	▽▽	13,561	6,672	7,034.3	94.8	93.3	96.5	▽▽
糖尿病有病者	14,117	1,745	1,926.5	90.6	86.8	94.6	▽▽	12,752	723	831.0	87.0	81.2	93.3	▽▽
糖尿病予備群	14,117	1,796	1,890.8	95.0	91.0	99.1	▽▽	12,752	1,184	1,366.9	86.6	82.1	91.4	▽▽
習慣的喫煙者	14,943	4,463	4,767.2	93.6	91.4	95.9	▽▽	13,597	883	1,141.2	77.4	72.7	82.4	▽▽

# 牧之原市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。



「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4,261	1,015	1,056.9	96.0	91.0	101.3	▽	3,761	264	292.4	90.3	80.4	101.4	▽
メタボ予備群	4,261	721	695.7	103.6	97.0	110.7	▲	3,761	173	191.3	90.5	78.3	104.5	▽
肥満者	4,261	2,153	2,215.3	97.2	94.4	100.1	▽	3,761	799	879.7	90.8	85.4	96.6	▽▽
高血圧症有病者	4,150	1,939	1,824.8	106.3	102.9	109.7	▲▲	3,651	1,283	1,203.9	106.6	102.0	111.3	▲▲
高血圧症予備群	4,150	522	485.5	107.5	99.3	116.4	▲	3,651	450	394.7	114.0	104.6	124.2	▲▲
脂質異常症有病者	4,206	2,458	2,452.7	100.2	97.7	102.8	▲	3,735	1,970	2,015.5	97.7	94.8	100.7	▽
糖尿病有病者	4,084	579	582.3	99.4	92.3	107.2	▽	3,595	256	246.3	103.9	92.4	116.9	▲
糖尿病予備群	4,084	625	562.5	111.1	103.4	119.4	▲▲	3,595	623	403.4	154.4	143.9	165.8	▲▲
習慣的喫煙者	4,281	1,449	1,330.9	108.9	104.4	113.5	▲▲	3,770	311	303.1	102.6	92.3	114.1	▲



# 吉田町



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2,928	726	702.9	103.3	97.0	110.0	▲	2,486	165	178.9	92.2	79.6	106.8	▽
メタボ予備群	2,928	476	481.0	99.0	91.2	107.4	▽	2,486	109	125.9	86.6	72.1	104.0	▽
肥満者	2,928	1,459	1,517.1	96.2	92.8	99.7	▽▽	2,486	587	575.9	101.9	95.0	109.4	▲
高血圧症有病者	2,838	1,242	1,193.5	104.1	99.8	108.5	▲	2,407	697	727.1	95.9	90.1	102.0	▽
高血圧症予備群	2,838	388	333.5	116.4	106.1	127.6	▲▲	2,407	289	250.8	115.2	103.5	128.3	▲▲
脂質異常症有病者	2,862	1,668	1,661.1	100.4	97.4	103.6	▲	2,457	1,211	1,258.3	96.2	92.5	100.2	▽
糖尿病有病者	2,773	410	376.9	108.8	99.5	118.9	▲	2,376	150	148.1	101.3	86.8	118.2	▲
糖尿病予備群	2,773	397	371.1	107.0	97.7	117.1	▲	2,376	355	246.3	144.1	131.0	158.6	▲▲
習慣的喫煙者	2,928	1,057	940.1	112.4	107.2	118.0	▲▲	2,479	236	212.8	110.9	98.3	125.2	▲

# 川根本町



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	783	208	207.6	100.2	89.2	112.5	▲	672	51	58.1	87.8	67.5	114.3	▽
メタボ予備群	783	101	126.3	80.0	66.7	95.9	▽▽	672	32	34.5	92.7	66.1	130.0	▽
肥満者	783	375	410.3	91.4	85.0	98.3	▽▽	672	149	159.7	93.3	81.0	107.5	▽
高血圧症有病者	737	404	357.2	113.1	105.9	120.8	▲▲	644	267	238.4	112.0	102.2	122.7	▲▲
高血圧症予備群	737	86	85.3	100.8	82.6	122.9	▲	644	63	73.0	86.3	68.3	109.1	▽
脂質異常症有病者	779	425	458.8	92.6	86.9	98.8	▽▽	668	361	385.6	93.6	87.3	100.4	▽
糖尿病有病者	720	118	114.4	103.1	87.5	121.6	▲	643	58	49.1	118.0	92.4	150.8	▲
糖尿病予備群	720	141	106.0	133.0	114.7	154.2	▲▲	643	125	78.9	158.4	135.3	185.3	▲▲
習慣的喫煙者	784	237	228.0	104.0	93.5	115.6	▲	672	33	49.0	67.3	48.3	93.9	▽▽

# 磐田市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	18,091	3,975	4,379.0	90.8	88.4	93.2	▽▽	16,022	1,193	1,185.4	100.6	95.4	106.1	▲
メタボ予備群	18,091	2,956	2,966.1	99.7	96.5	102.9	▽	16,022	814	808.5	100.7	94.3	107.5	▲
肥満者	18,091	8,894	9,375.5	94.9	93.5	96.2	▽▽	16,022	3,676	3,722.4	98.8	96.1	101.5	▽
高血圧症有病者	17,417	6,822	7,414.4	92.0	90.4	93.7	▽▽	15,354	4,392	4,821.8	91.1	88.9	93.3	▽▽
高血圧症予備群	17,417	1,996	2,042.4	97.7	93.9	101.7	▽	15,354	1,732	1,620.1	106.9	102.4	111.6	▲▲
脂質異常症有病者	18,035	10,393	10,471.7	99.2	98.0	100.5	▽	15,965	8,436	8,274.9	101.9	100.5	103.4	▲▲
糖尿病有病者	17,407	2,326	2,387.7	97.4	93.9	101.1	▽	15,395	1,088	993.9	109.5	103.5	115.7	▲▲
糖尿病予備群	17,407	2,563	2,337.1	109.7	105.9	113.5	▲▲	15,395	1,815	1,635.3	111.0	106.4	115.8	▲▲
習慣的喫煙者	18,097	5,549	5,737.7	96.7	94.7	98.8	▽▽	15,966	985	1,336.9	73.7	69.4	78.2	▽▽

# 掛川市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	10,633	2,344	2,607.0	89.9	86.8	93.1	▽▽	10,014	691	764.2	90.4	84.2	97.1	▽▽
メタボ予備群	10,633	1,654	1,735.2	95.3	91.3	99.6	▽▽	10,014	449	507.0	88.6	81.0	96.8	▽▽
肥満者	10,633	5,028	5,510.1	91.2	89.5	93.1	▽▽	10,013	2,141	2,335.1	91.7	88.4	95.1	▽▽
高血圧症有病者	10,340	4,130	4,482.9	92.1	90.0	94.3	▽▽	9,635	2,855	3,124.7	91.4	88.6	94.2	▽▽
高血圧症予備群	10,340	1,277	1,208.5	105.7	100.5	111.1	▲▲	9,635	1,072	1,032.7	103.8	98.2	109.7	▲
脂質異常症有病者	10,586	5,941	6,151.8	96.6	95.0	98.2	▽▽	9,981	5,242	5,285.5	99.2	97.4	101.0	▽
糖尿病有病者	10,329	1,364	1,444.9	94.4	89.9	99.1	▽▽	9,565	605	639.3	94.6	87.7	102.1	▽
糖尿病予備群	10,329	1,406	1,401.4	100.3	95.6	105.2	▲	9,565	1,139	1,049.1	108.6	102.9	114.5	▲▲
習慣的喫煙者	10,635	3,179	3,318.3	95.8	93.1	98.6	▽▽	9,983	649	815.1	79.6	74.0	85.7	▽▽

# 袋井市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8,385	1,890	2,033.5	92.9	89.4	96.7	▽▽	7,405	579	550.7	105.1	97.3	113.6	▲
メタボ予備群	8,385	1,320	1,371.3	96.3	91.7	101.1	▽	7,405	403	373.0	108.0	98.4	118.7	▲
肥満者	8,385	4,052	4,340.0	93.4	91.3	95.4	▽▽	7,405	1,756	1,720.9	102.0	98.0	106.2	▲
高血圧症有病者	8,179	3,166	3,490.7	90.7	88.3	93.2	▽▽	7,145	2,125	2,255.2	94.2	91.0	97.6	▽▽
高血圧症予備群	8,179	1,032	957.2	107.8	101.9	114.1	▲▲	7,145	805	755.6	106.5	99.9	113.6	▲
脂質異常症有病者	8,354	4,681	4,846.1	96.6	94.8	98.4	▽▽	7,385	3,748	3,833.7	97.8	95.6	100.0	▽▽
糖尿病有病者	8,150	1,142	1,122.0	101.8	96.5	107.3	▲	7,147	494	464.4	106.4	97.8	115.7	▲
糖尿病予備群	8,150	1,168	1,094.9	106.7	101.2	112.4	▲▲	7,147	814	762.6	106.7	100.1	113.8	▲▲
習慣的喫煙者	8,388	2,598	2,642.4	98.3	95.3	101.5	▽	7,386	532	615.1	86.5	79.8	93.8	▽▽

# 御前崎市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2,829	741	714.0	103.8	97.6	110.4	▲	2,759	216	222.2	97.2	85.6	110.4	▽
メタボ予備群	2,829	444	460.4	96.4	88.6	105.0	▽	2,759	169	140.5	120.3	104.0	139.1	▲▲
肥満者	2,828	1,459	1,472.6	99.1	95.6	102.7	▽	2,758	705	648.5	108.7	102.0	115.8	▲▲
高血圧症有病者	2,776	1,224	1,245.9	98.2	94.2	102.4	▽	2,686	938	917.0	102.3	97.2	107.7	▲
高血圧症予備群	2,776	399	324.1	123.1	112.5	134.8	▲▲	2,686	351	294.1	119.3	108.3	131.5	▲▲
脂質異常症有病者	2,816	1,676	1,645.3	101.9	98.8	105.0	▲	2,747	1,515	1,506.3	100.6	97.3	104.0	▲
糖尿病有病者	2,684	379	392.2	96.6	88.1	106.1	▽	2,609	201	186.6	107.7	94.4	123.0	▲
糖尿病予備群	2,684	424	374.3	113.3	103.8	123.6	▲▲	2,609	332	302.7	109.7	99.3	121.2	▲
習慣的喫煙者	2,830	957	862.0	111.0	105.5	116.9	▲▲	2,757	219	215.2	101.8	89.7	115.5	▲

# 菊川市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果		
					下限値	上限値						下限値	上限値			
メタボ該当者	4,532	1,023	1,111.3	92.1	87.2	97.1	▽▽	4,214	319	316.7	100.7	90.7	111.8	▲		
メタボ予備群	4,532	680	737.9	92.2	86.0	98.7	▽▽	4,214	203	212.0	95.8	83.8	109.4	▽		
肥満者	4,532	2,156	2,344.7	92.0	89.2	94.8	▽▽	4,214	953	979.7	97.3	92.0	102.8	▽		
高血圧症有病者	4,364	1,830	1,900.5	96.3	93.0	99.7	▽▽	4,033	1,311	1,291.6	101.5	97.1	106.1	▲		
高血圧症予備群	4,364	496	508.9	97.5	89.8	105.8	▽	4,033	452	429.2	105.3	96.6	114.8	▲		
脂質異常症有病者	4,510	2,536	2,616.6	96.9	94.5	99.4	▽▽	4,200	2,170	2,196.6	98.8	96.0	101.7	▽		
糖尿病有病者	4,361	550	612.9	89.7	83.0	97.0	▽▽	4,016	243	265.6	91.5	81.0	103.3	▽		
糖尿病予備群	4,361	579	591.5	97.9	90.8	105.5	▽	4,016	428	435.2	98.4	90.0	107.5	▽		
習慣的喫煙者	4,532	1,427	1,404.1	101.6	97.4	106.1	▲	4,200	287	346.3	82.9	74.2	92.6	▽▽		

# 森町



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。



「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1,835	396	471.2	84.0	77.0	91.7	▽▽	1,730	146	137.0	106.6	91.3	124.4	▲
メタボ予備群	1,835	256	296.6	86.3	77.1	96.7	▽▽	1,730	69	87.8	78.6	62.4	99.0	▽▽
肥満者	1,835	829	956.2	86.7	82.4	91.2	▽▽	1,730	395	404.6	97.6	89.6	106.4	▽
高血圧症有病者	1,774	751	817.1	91.9	87.1	97.0	▽▽	1,662	498	555.5	89.7	83.3	96.5	▽▽
高血圧症予備群	1,774	189	206.2	91.7	80.1	104.9	▽	1,662	189	180.8	104.5	91.4	119.5	▲
脂質異常症有病者	1,832	1,080	1,072.7	100.7	96.9	104.6	▲	1,728	956	941.8	101.5	97.3	105.9	▲
糖尿病有病者	1,791	246	267.1	92.1	82.0	103.4	▽	1,694	136	116.3	116.9	99.5	137.3	▲
糖尿病予備群	1,791	367	253.6	144.7	132.2	158.5	▲▲	1,694	320	191.0	167.5	151.8	184.8	▲▲
習慣的喫煙者	1,835	568	552.1	102.9	96.1	110.1	▲	1,730	117	136.8	85.5	71.8	101.8	▽



# 湖西市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	5,586	1,305	1,386.6	94.1	89.8	98.7	▽▽	5,200	396	409.4	96.7	88.1	106.2	▽
メタボ予備群	5,586	916	911.9	100.5	94.7	106.5	▲	5,200	261	263.7	99.0	88.0	111.3	▽
肥満者	5,586	2,801	2,902.1	96.5	94.0	99.1	▽▽	5,200	1,310	1,219.1	107.5	102.6	112.6	▲▲
高血圧症有病者	5,532	2,352	2,422.1	97.1	94.2	100.1	▽	5,081	1,682	1,698.4	99.0	95.3	102.9	▽
高血圧症予備群	5,532	683	646.7	105.6	98.5	113.2	▲	5,081	606	549.7	110.2	102.4	118.7	▲▲
脂質異常症有病者	5,572	3,071	3,244.8	94.6	92.4	96.9	▽▽	5,157	2,715	2,783.4	97.5	95.1	100.1	▽
糖尿病有病者	5,392	770	767.4	100.3	94.0	107.1	▲	4,994	387	346.8	111.6	101.5	122.7	▲▲
糖尿病予備群	5,392	823	738.9	111.4	104.6	118.5	▲▲	4,994	632	563.2	112.2	104.4	120.6	▲▲
習慣的喫煙者	5,586	1,675	1,722.2	97.3	93.5	101.2	▽	5,155	334	409.2	81.6	73.6	90.5	▽▽

# 静岡市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲▲ 高いが無意でない、▲▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	66,322	16,948	16,108.8	105.2	103.6	106.8	▲▲	57,773	4,466	4,182.2	106.8	103.7	110.0	▲▲▲
メタボ予備群	66,322	10,628	10,901.9	97.5	95.6	99.4	▽▽	57,773	2,899	2,938.5	98.7	95.1	102.3	▽
肥満者	66,317	34,037	34,455.0	98.8	97.7	99.8	▽▽	57,767	13,237	13,411.4	98.7	97.0	100.4	▽
高血圧症有病者	64,315	29,349	27,419.9	107.0	105.8	108.3	▲▲	55,731	17,537	17,006.7	103.1	101.6	104.7	▲▲▲
高血圧症予備群	64,315	7,728	7,560.8	102.2	99.9	104.5	▲	55,731	5,809	5,824.3	99.7	97.2	102.3	▽
脂質異常症有病者	65,504	38,515	38,119.0	101.0	100.0	102.1	▲▲	57,482	29,402	29,571.5	99.4	98.3	100.6	▽
糖尿病有病者	63,405	8,712	8,744.2	99.6	97.6	101.7	▽	55,576	3,368	3,486.3	96.6	93.4	99.9	▽▽
糖尿病予備群	63,405	8,165	8,574.5	95.2	93.2	97.3	▽▽	55,576	5,398	5,796.5	93.1	90.7	95.6	▽▽
習慣的喫煙者	66,327	20,717	21,129.0	98.1	96.7	99.4	▽▽	57,805	4,948	4,961.8	99.7	97.0	102.5	▽

# 静岡市葵区



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	23,839	5,893	5,799.7	101.6	99.5	103.8	▲	21,023	1,577	1,517.7	103.9	99.3	108.8	▲
メタボ予備群	23,839	3,851	3,914.8	98.4	95.7	101.2	▽	21,023	1,040	1,068.8	97.3	91.9	103.0	▽
肥満者	23,837	12,046	12,381.9	97.3	96.1	98.5	▽▽	21,023	4,678	4,876.7	95.9	93.6	98.3	▽▽
高血圧症有病者	23,098	10,554	9,870.5	106.9	105.5	108.4	▲▲	20,246	6,349	6,154.6	103.2	101.1	105.2	▲▲
高血圧症予備群	23,098	2,794	2,713.5	103.0	99.6	106.5	▲	20,246	2,173	2,113.5	102.8	98.9	106.8	▲
脂質異常症有病者	23,589	13,862	13,726.7	101.0	99.9	102.0	▲	20,970	10,667	10,771.7	99.0	97.8	100.3	▽
糖尿病有病者	22,852	3,110	3,157.4	98.5	95.4	101.7	▽	20,252	1,191	1,264.3	94.2	89.3	99.4	▽▽
糖尿病予備群	22,852	2,759	3,092.6	89.2	86.2	92.3	▽▽	20,252	1,796	2,105.9	85.3	81.7	89.0	▽▽
習慣的喫煙者	23,841	7,172	7,577.1	94.7	92.9	96.4	▽▽	21,039	1,644	1,808.6	90.9	86.9	95.1	▽▽

# 静岡市駿河区



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	18,862	4,787	4,542.9	105.4	102.9	107.9	▲▲	16,217	1,141	1,152.3	99.0	93.8	104.6	▽
メタボ予備群	18,862	2,905	3,106.0	93.5	90.5	96.6	▽▽	16,217	784	824.0	95.2	89.0	101.7	▽
肥満者	18,861	9,530	9,791.7	97.3	96.0	98.7	▽▽	16,215	3,601	3,756.7	95.9	93.2	98.6	▽▽
高血圧症有病者	18,416	8,102	7,750.2	104.5	102.9	106.2	▲▲	15,712	4,680	4,691.8	99.7	97.4	102.1	▽
高血圧症予備群	18,416	2,205	2,168.0	101.7	97.9	105.7	▲	15,712	1,536	1,628.1	94.3	90.1	98.8	▽▽
脂質異常症有病者	18,680	10,928	10,857.6	100.6	99.5	101.8	▲	16,171	8,099	8,212.3	98.6	97.2	100.1	▽
糖尿病有病者	18,152	2,412	2,467.7	97.7	94.3	101.3	▽	15,625	924	959.1	96.3	90.6	102.4	▽
糖尿病予備群	18,152	2,413	2,434.2	99.1	95.6	102.8	▽	15,625	1,511	1,600.6	94.4	90.1	98.9	▽▽
習慣的喫煙者	18,863	5,912	6,056.9	97.6	95.6	99.6	▽▽	16,228	1,416	1,413.1	100.2	95.5	105.2	▲

# 静岡市清水区



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	23,621	6,268	5,766.2	108.7	106.5	110.9	▲▲	20,533	1,748	1,512.2	115.6	110.7	120.7	▲▲▲
メタボ予備群	23,621	3,872	3,881.2	99.8	97.0	102.6	▽	20,533	1,075	1,045.7	102.8	97.2	108.7	▲
肥満者	23,619	12,461	12,281.5	101.5	100.3	102.7	▲▲	20,529	4,958	4,778.0	103.8	101.4	106.2	▲▲▲
高血圧症有病者	22,801	10,693	9,799.2	109.1	107.7	110.6	▲▲	19,773	6,508	6,160.2	105.6	103.6	107.7	▲▲▲
高血圧症予備群	22,801	2,729	2,679.3	101.9	98.5	105.4	▲	19,773	2,100	2,082.7	100.8	97.0	104.9	▲
脂質異常症有病者	23,235	13,725	13,534.7	101.4	100.4	102.5	▲▲	20,341	10,636	10,587.6	100.5	99.2	101.7	▲
糖尿病有病者	22,401	3,190	3,119.1	102.3	99.2	105.5	▲	19,699	1,253	1,263.0	99.2	94.2	104.5	▽
糖尿病予備群	22,401	2,993	3,047.7	98.2	95.1	101.4	▽	19,699	2,091	2,090.0	100.0	96.2	104.0	▲
習慣的喫煙者	23,623	7,633	7,495.0	101.8	100.0	103.7	▲▲	20,538	1,888	1,740.0	108.5	104.1	113.1	▲▲▲

# 浜松市



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果		
					下限値	上限値						下限値	上限値			
メタボ該当者	78,255	17,581	18,615.4	94.4	93.1	95.8	▽▽	67,621	4,663	4,743.7	98.3	95.5	101.2	▽		
メタボ予備群	78,255	12,453	12,895.2	96.6	94.9	98.3	▽▽	67,621	3,431	3,427.3	100.1	96.8	103.5	▲		
肥満者	78,253	38,776	40,533.2	95.7	94.7	96.6	▽▽	67,621	15,213	15,633.5	97.3	95.8	98.9	▽▽		
高血圧症有病者	76,701	28,302	31,732.3	89.2	88.2	90.2	▽▽	65,501	17,280	19,307.1	89.5	88.2	90.8	▽▽		
高血圧症予備群	76,701	7,412	9,032.2	82.1	80.2	84.0	▽▽	65,501	5,504	6,751.6	81.5	79.4	83.7	▽▽		
脂質異常症有病者	78,014	45,102	45,231.5	99.7	98.8	100.6	▽	67,175	33,890	33,882.7	100.0	99.0	101.1	▲		
糖尿病有病者	74,545	9,886	9,979.5	99.1	97.1	101.0	▽	63,415	3,966	3,869.3	102.5	99.3	105.7	▲		
糖尿病予備群	74,545	11,120	9,895.0	112.4	110.3	114.5	▲▲	63,415	7,658	6,461.4	118.5	115.9	121.2	▲▲		
習慣的喫煙者	78,265	22,524	25,346.6	88.9	87.7	90.0	▽▽	67,097	4,584	5,878.2	78.0	75.7	80.3	▽▽		

# 浜松市中区



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	22,393	5,053	5,315.6	95.1	92.8	97.3	▽▽	19,712	1,285	1,353.6	94.9	90.2	99.9	▽▽
メタボ予備群	22,393	3,526	3,693.5	95.5	92.7	98.3	▽▽	19,712	945	1,001.5	94.4	88.8	100.2	▽
肥満者	22,391	11,147	11,601.0	96.1	94.9	97.3	▽▽	19,712	4,168	4,548.2	91.6	89.3	94.1	▽▽
高血圧症有病者	21,959	7,839	9,061.8	86.5	85.0	88.0	▽▽	19,112	4,590	5,493.4	83.6	81.5	85.6	▽▽
高血圧症予備群	21,959	1,984	2,587.5	76.7	73.6	79.9	▽▽	19,112	1,476	1,953.4	75.6	72.0	79.3	▽▽
脂質異常症有病者	22,335	13,009	12,949.9	100.5	99.4	101.5	▲	19,587	9,640	9,777.3	98.6	97.2	100.0	▽▽
糖尿病有病者	21,390	2,902	2,858.1	101.5	98.3	104.9	▲	18,551	1,113	1,101.3	101.1	95.6	106.8	▲
糖尿病予備群	21,390	3,064	2,840.7	107.9	104.5	111.3	▲▲	18,551	2,163	1,855.0	116.6	112.2	121.1	▲▲
習慣的喫煙者	22,397	6,208	7,287.7	85.2	83.5	87.0	▽▽	19,561	1,443	1,743.9	82.7	78.8	86.8	▽▽

# 浜松市東区



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。



「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	12,545	2,785	2,923.9	95.3	92.2	98.4	▽▽	10,149	625	688.5	90.8	84.2	97.8	▽▽
メタボ予備群	12,545	2,048	2,075.2	98.7	94.9	102.6	▽	10,149	519	513.5	101.1	93.1	109.8	▲
肥満者	12,545	6,293	6,485.0	97.0	95.4	98.7	▽▽	10,149	2,216	2,338.7	94.8	91.4	98.2	▽▽
高血圧症有病者	12,284	4,460	4,943.9	90.2	88.2	92.3	▽▽	9,865	2,491	2,806.3	88.8	85.8	91.8	▽▽
高血圧症予備群	12,284	1,207	1,450.6	83.2	78.9	87.7	▽▽	9,865	898	1,002.2	89.6	84.3	95.3	▽▽
脂質異常症有病者	12,486	7,129	7,219.7	98.7	97.3	100.2	▽	10,096	4,955	4,981.6	99.5	97.5	101.4	▽
糖尿病有病者	11,999	1,465	1,558.3	94.0	89.7	98.6	▽▽	9,589	529	562.5	94.0	86.7	102.1	▽
糖尿病予備群	11,999	1,680	1,564.9	107.4	102.8	112.1	▲▲	9,589	1,085	944.7	114.9	108.7	121.4	▲▲
習慣的喫煙者	12,547	3,744	4,135.4	90.5	88.2	93.0	▽▽	10,107	727	908.8	80.0	74.7	85.7	▽▽



# 浜松市西区



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果		
					下限値	上限値						下限値	上限値			
メタボ該当者	11,385	2,514	2,722.1	92.4	89.3	95.5	▽▽	10,255	759	719.9	105.4	98.6	112.8	▲		
メタボ予備群	11,385	1,847	1,878.0	98.3	94.4	102.5	▽	10,255	530	520.6	101.8	93.8	110.5	▲		
肥満者	11,385	5,639	5,906.8	95.5	93.7	97.2	▽▽	10,255	2,429	2,373.8	102.3	98.9	105.9	▲		
高血圧症有病者	11,169	4,045	4,647.2	87.0	85.0	89.2	▽▽	9,842	2,683	2,920.8	91.9	89.0	94.8	▽▽		
高血圧症予備群	11,169	1,104	1,316.2	83.9	79.4	88.6	▽▽	9,842	784	1,017.6	77.0	72.1	82.3	▽▽		
脂質異常症有病者	11,348	6,559	6,589.1	99.5	98.0	101.1	▽	10,135	5,117	5,121.8	99.9	98.0	101.8	▽		
糖尿病有病者	10,815	1,461	1,458.2	100.2	95.6	105.0	▲	9,538	651	585.9	111.1	103.3	119.5	▲▲		
糖尿病予備群	10,815	1,671	1,442.9	115.8	110.9	120.9	▲▲	9,538	1,189	976.3	121.8	115.6	128.3	▲▲		
習慣的喫煙者	11,386	3,173	3,677.8	86.3	83.8	88.8	▽▽	10,090	609	884.3	68.9	63.8	74.3	▽▽		

# 浜松市南区



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	10,009	2,468	2,378.0	103.8	100.3	107.3	▲▲	8,446	644	592.9	108.6	100.9	116.9	▲▲▲
メタボ予備群	10,009	1,594	1,651.8	96.5	92.3	100.9	▽	8,446	464	428.1	108.4	99.3	118.3	▲
肥満者	10,009	5,197	5,187.6	100.2	98.3	102.1	▲	8,446	2,072	1,953.5	106.1	102.2	110.1	▲▲▲
高血圧症有病者	9,856	3,845	4,065.9	94.6	92.3	96.9	▽▽	8,204	2,406	2,423.4	99.3	96.0	102.6	▽
高血圧症予備群	9,856	990	1,162.1	85.2	80.4	90.3	▽▽	8,204	663	845.1	78.5	73.0	84.3	▽▽
脂質異常症有病者	9,983	5,812	5,789.8	100.4	98.8	102.0	▲	8,376	4,247	4,225.5	100.5	98.4	102.6	▲
糖尿病有病者	9,665	1,339	1,287.5	104.0	99.0	109.2	▲	8,031	536	488.7	109.7	101.2	118.9	▲▲▲
糖尿病予備群	9,665	1,593	1,280.0	124.5	119.1	130.1	▲▲	8,031	1,048	815.0	128.6	121.6	135.9	▲▲▲
習慣的喫煙者	10,011	3,153	3,250.8	97.0	94.3	99.8	▽▽	8,359	695	731.6	95.0	88.6	101.9	▽

# 浜松市北区



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8,826	1,921	2,133.7	90.0	86.6	93.6	▽▽	7,945	526	576.3	91.3	84.1	99.0	▽▽
メタボ予備群	8,826	1,468	1,447.2	101.4	96.9	106.2	▲	7,945	400	402.5	99.4	90.4	109.2	▽
肥満者	8,826	4,306	4,573.4	94.2	92.2	96.2	▽▽	7,945	1,865	1,841.9	101.3	97.4	105.3	▲
高血圧症有病者	8,650	3,279	3,659.6	89.6	87.2	92.0	▽▽	7,713	2,107	2,347.2	89.8	86.6	93.1	▽▽
高血圧症予備群	8,650	833	1,014.9	82.1	77.0	87.5	▽▽	7,713	638	805.5	79.2	73.6	85.2	▽▽
脂質異常症有病者	8,802	5,078	5,110.2	99.4	97.6	101.1	▽	7,909	4,151	4,069.5	102.0	99.9	104.1	▲
糖尿病有病者	8,245	1,096	1,133.7	96.7	91.5	102.1	▽	7,247	487	461.7	105.5	96.9	114.8	▲
糖尿病予備群	8,245	1,261	1,109.0	113.7	108.1	119.5	▲▲	7,247	900	765.2	117.6	110.7	124.9	▲▲
習慣的喫煙者	8,827	2,533	2,805.1	90.3	87.4	93.3	▽▽	7,907	461	673.7	68.4	62.7	74.7	▽▽

# 浜松市浜北区



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味、▲ 高いが無意味、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	10,391	2,216	2,441.6	90.8	87.5	94.1	▽▽	8,725	636	616.2	103.2	95.9	111.1	▲
メタボ予備群	10,391	1,545	1,710.6	90.3	86.3	94.5	▽▽	8,725	461	437.9	105.3	96.4	114.9	▲
肥満者	10,391	4,913	5,363.4	91.6	89.8	93.5	▽▽	8,725	1,946	2,014.2	96.6	93.0	100.4	▽
高血圧症有病者	10,143	3,690	4,134.1	89.3	87.0	91.6	▽▽	8,444	2,279	2,513.2	90.7	87.6	93.9	▽▽
高血圧症予備群	10,143	993	1,192.9	83.2	78.5	88.2	▽▽	8,444	798	871.2	91.6	85.8	97.8	▽▽
脂質異常症有病者	10,360	5,940	5,985.8	99.2	97.6	100.9	▽	8,685	4,375	4,366.2	100.2	98.2	102.3	▲
糖尿病有病者	9,864	1,231	1,296.1	95.0	90.2	100.0	▽▽	8,194	519	506.3	102.5	94.4	111.3	▲
糖尿病予備群	9,864	1,443	1,289.8	111.9	106.7	117.3	▲▲	8,194	963	838.1	114.9	108.4	121.8	▲▲
習慣的喫煙者	10,391	2,921	3,373.5	86.6	84.0	89.3	▽▽	8,685	520	752.2	69.1	63.7	75.1	▽▽

# 浜松市天竜区



## グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2,706	624	700.6	89.1	83.2	95.4	▽▽	2,389	188	196.2	95.8	83.6	109.8	▽
メタボ予備群	2,706	425	439.0	96.8	88.8	105.6	▽	2,389	112	123.2	90.9	75.9	108.9	▽
肥満者	2,706	1,281	1,416.0	90.5	87.0	94.1	▽▽	2,389	517	563.3	91.8	85.1	99.0	▽▽
高血圧症有病者	2,640	1,144	1,219.8	93.8	89.8	97.9	▽▽	2,321	724	803.0	90.2	84.9	95.8	▽▽
高血圧症予備群	2,640	301	307.9	97.8	87.9	108.7	▽	2,321	247	256.6	96.2	85.6	108.2	▽
脂質異常症有病者	2,700	1,575	1,587.0	99.2	96.1	102.4	▽	2,387	1,405	1,340.9	104.8	101.3	108.3	▲▲
糖尿病有病者	2,567	392	387.6	101.1	92.4	110.7	▲	2,265	131	163.0	80.4	68.1	94.8	▽▽
糖尿病予備群	2,567	408	367.6	111.0	101.6	121.3	▲▲	2,265	310	267.0	116.1	104.8	128.7	▲▲
習慣的喫煙者	2,706	792	816.2	97.0	91.5	102.9	▽	2,388	129	183.7	70.2	59.4	83.0	▽▽