

目次

★	発生動向総覧	P 1～2
★	感染症発生動向警報システムによる保健所の警報状況	P 3
★	指定届出機関からの特記事項欄コメント	P 3～5
★	全数把握感染症集計表	P 6
★	定点把握感染症集計表	P 7～11
★	定点把握感染症推移グラフ	P 12～16
★	定点把握感染症集計表（月報）	P 17～20
★	定点把握感染症推移グラフ（月報）	P 21～22
★	新型コロナウイルスのPCR検査等の状況	P 23
★	国内及び静岡県内の季節性インフルエンザの流行状況	P 24～25
★	サル痘	P 26～27
★	県内での麻しん（はしか）患者の発生	P 28～29



発生動向総覧

《第2週コメント》1月19日集計分

県内のインフルエンザの定点当たり報告数が4.62となり、先週の3.19から増加が続いています。

◆全数届出の感染症

- 1 類感染症 報告なし
- 2 類感染症 結核（東部（1）、静岡市（3）、中部（1）、西部（4）、浜松市（1））
- 3 類感染症 腸管出血性大腸菌感染症（東部（1））
- 4 類感染症 報告なし
- 5 類感染症 急性脳炎（静岡市（1）、浜松市（1））、侵襲性インフルエンザ菌感染症（東部（1））、梅毒（東部（3）、西部（1）、浜松市（3））

新型インフルエンザ等感染症

新型コロナウイルス（賀茂（599）、熱海（892）、東部（5,351）、御殿場（914）、富士（4,071）、静岡市（7,939）中部（4,115）、西部（4,359）、浜松市（8,991）、自己検査（3,641））


◆定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）

環境衛生科学研究所
感染症情報センター

令和5年第2(1/9~1/15)の動向


インフルエンザ

全県で罹患数642、定点当たり4.62の患者発生あり、県内全域で前週より増加したがその増加スピードは前週より穏やか。東部地区で定点当たり4.14、中部地区で定点当たり4.74、西部地区で定点当たり5.02の発生あり。西部地区が前週の2倍と急激に増加した。増加ペースに注視が必要。




感染性胃腸炎

全県で罹患数374、定点当たり4.20の患者発生あり、県下全地区で前週より増加した。東部地区で定点当たり3.66、中部地区で定点当たり4.67、西部地区で定点当たり4.37の患者発生あり、増加は東部地区が最も急激で前週から3倍の増加。




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

全県で罹患数10、定点当たり0.11の患者発生あり、県全体では前週より増加したが、東部地区のみ1/2に減少した。定点当たり東部地区で0.03、中部地区で0.15、西部地区で0.17の患者発生あり。症状から新型コロナウイルス、インフルエンザ等との迅速な類症鑑別が必須。




流行性角結膜炎

全県で罹患数4、定点当たり0.18の患者発生あり、東部地区での増加が顕著だった影響をうけ、中部及び西部地区では減少したものの全県的には増加となった。定点当たり、東部地区で0.29、中部地区で0.13、西部地区で0.14の患者発生あり。一過性の増加である可能性もあり、今後の動向に注視が必要。



- ・風疹、麻疹とも患者発生なし。
- ・手足口病、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ、ロタウイルスによる感染性胃腸炎は患者発生なし。
- ・RSウイルス感染症は全県で罹患数15、定点当たり0.17の患者発生あり。県下全地区で減少し、R4年冬期の流行は完全に終息したと示唆される。
- ・第1週に定点当たり患者報告数の多かった疾病は、順に1) インフルエンザ 2) 感染性胃腸炎 3) 流行性角結膜炎 4) RSウイルス感染症 5) 咽頭結膜熱であった。
- ・全県で流行期の疾病はインフルエンザと感染性胃腸炎で、地区限定で流行している疾病はなし。

【インフルエンザ罹患数推移】



【県内衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出状況(2022/2023シーズン)】
(令和4年36～令和5年2週)

		検体搬入数	A/H1 pdm09	A/H3	B/山形系統	B/Victoria系統
R4 36～47週		0				
48週	静岡県	0				
	静岡市	3	0	1(遺伝子)	0	0
	浜松市	0				
49週		0				
50週	静岡県	5(西部HC) 1(賀茂HC)		3(遺伝子) 1(遺伝子)		
	静岡市	0				
	浜松市	0				
51週	静岡県	2(賀茂HC) 1(熱海HC)		2(遺伝子) 1(遺伝子)		
	静岡市	0				
	浜松市	0				
52週		0				
R5 1週		0				
2週	静岡県	0				
	静岡市	1	検査中			
	浜松市	0				

【R5 2週の主な全数把握疾患状況(累計)】

疾患名	全国	静岡県
レジオネラ症	57	1
CRE	40	0
梅毒	271	8
侵襲性肺炎球菌感染症	66	0
劇症型溶血性連鎖球菌症	31	1
急性脳炎	18	3
腸管出血性大腸菌	26	2
結核	272	13

・R4同様、結核及び梅毒がハイペースで発生している。
・R5に特筆すべき疾患の発生はなく、R4と同様の発生状況である。

◆感染症発生動向警報システムによる保健所の警報状況

警報 なし

注意報 インフルエンザ（御殿場）



指定届出機関からの特記事項欄コメント

感染症第2週（令和5年1月9日～令和5年1月15日）

高野医院（伊東市）「インフルエンザA型 10名」

聖隷沼津病院（沼津市）「インフルエンザA型 10名」

光ヶ丘小児科（三島市）「インフルエンザA型 8名、ノロウイルス 3名」

伊豆長岡小児クリニック（伊豆の国市）「インフルエンザA型 7名」

岩渕内科医院（沼津市）「インフルエンザA型 3名」

窪田医院（三島市）「インフルエンザA型 1名」

よざ小児科医院（沼津市）「インフルエンザA型 5名」

斉藤医院（御殿場市）「インフルエンザA型 2名」

なかがわ医院（小山町）「インフルエンザA型 5名」

安田内科小児科医院（御殿場市）「インフルエンザA型 10名、ノロウイルス 3名（2歳男児1名、9か月女児1名、11か月女児1名）」

富士病院（御殿場市）「インフルエンザA型 20名」

たうち小児科医院（御殿場市）「インフルエンザA型 28名、インフルエンザB型 2名」

お八幡医院（御殿場市）「インフルエンザA型 3名」

小川小児科内科医院（富士市）「インフルエンザA型 6名」

田子浦クリニック（富士市）「インフルエンザA型 17名」

共立蒲原総合病院・内科（富士市）「インフルエンザA型 3名」

むらまつファミリークリニック（藤枝市）「インフルエンザA型 7名（3歳女児1名、6歳男児1名、8歳女児1名、10～14歳女児1名、15～19歳男性1名、15～19歳女性1名、40～49歳女性1名）」

あしだクリニック（焼津市）「インフルエンザA型 14名（10～14歳男性1名、10～14歳女性4名、15～19歳男性4名、20歳以上男性3名、20歳以上女性2名）」

田中医院（磐田市）「ヒトメタニューモウイルス感染症 1名（4歳女児）、インフルエンザA型 5名（4歳男児1名、6歳男児1名、6歳女児1名、7歳男児1名、15～19歳男性1名）」

総合病院浜松赤十字病院（小児科）（浜松市）「インフルエンザ 1名（3歳男児）」

浜松医療センター（浜松市）「インフルエンザA型 20名（2歳男児1名、2歳女児3名、4歳男児2名、5歳男児2名、6歳男児2名、6歳女児4名、8歳男児1名、8歳女児1名、9歳女児1名、10～14歳男児1名、10～14歳女児1名、15～19歳女

性1名)」

総合病院聖隷浜松病院(小児科) (浜松市)「インフルエンザ 2名(4歳女児1名、30～39歳女性1名)」

クリニックパパ (浜松市)「ヒトメタニューモウイルス感染症 1名(3歳男児)、インフルエンザA型 9名(3歳男児1名、4歳男児1名、4歳女児1名、5歳女児1名、8歳男児2名、10～14歳女児3名)、インフルエンザB型 2名(6歳女児1名、9歳男児1名)」

今西こどもクリニック(浜松市)「インフルエンザA型 7名、インフルエンザB型 1名」

総合病院聖隷三方原病院(小児科) (浜松市)「インフルエンザ 3名(2歳女児1名、10～14歳女児2名)」

げんきこどもクリニック (浜松市)「インフルエンザA型 11名(1歳男児2名、5歳男児3名、7歳女児1名、8歳男児1名、8歳女児1名、9歳女児1名、10～14歳男児1名、10～14歳女児1名)」

いぬかい小児科 (浜松市)「インフルエンザA型 3名(6～11か月男児1名、5歳男児1名、15～19歳男性1名) インフルエンザB型 2名(6～11か月女児1名、20～29歳女性1名)」

すずきこどもクリニック (浜松市)「インフルエンザA型 4名(3歳女児1名、7歳女児1名、8歳女児1名、10～14歳男1名)」

幸田子供クリニック (浜松市)「インフルエンザA型 8名(3歳女児1名、4歳女児1名、5歳女児1名、7歳男児1名、7歳女児1名、15～19歳女性2名、20～29歳女性1名)」

たなか小児科 (浜松市)「インフルエンザ 14名(2歳男児1名、4歳女児1名、5歳女児2名、8歳男児2名、9歳男児1名、10～14歳男児3名、10～14歳女児1名、20～29歳女性2名、30～39歳女性1名)」

天竜こども医院 (浜松市)「インフルエンザ 12名(0～5か月女児1名、2歳男児1名、3歳男児1名、3歳女児1名、5歳男児1名、5歳女児3名、6歳女児1名、7歳男児1名、10～14歳女児1名、20～29歳女性1名)」

小児科竹内医院 (浜松市)「インフルエンザA型 7名(3歳女児1名、5歳男児1名、6歳女児1名、10～14歳男児1名、10～14歳女児1名、30～39歳男性1名、40～49歳女性1名)、インフルエンザB型 1名(6～11か月男児)」

小松診療所 (浜松市)「インフルエンザA型 2名(30～39歳女性1名、50～59歳女性1名)」

金指こどもクリニック (浜松市)「インフルエンザA型 3名(2歳女児1名、6歳男児1名、15～19歳女性1名)」

縣医院 (浜松市)「インフルエンザA型 2名(6歳男児1名、6歳女児1名)」

おおば小児科 (浜松市)「インフルエンザ 2名(5歳男児1名、6歳男児1名)」

遠州病院 (浜松市)「インフルエンザ 1名(50～59歳男性)」

総合病院浜松赤十字病院(内科) (浜松市)「インフルエンザ 1名(60～69歳男性)」

くまがいクリニック (浜松市)「インフルエンザ 4名 (15～19歳女性1名、20～29歳男性1名、20～29歳女性1名、30～39歳男性1名)」

高平内科 (浜松市)「インフルエンザ 8名 (10～14歳男児1名、15～19歳男性3名、15～19歳女性1名、20～29歳男性2名、40～49歳男性1名)」

大竹内科医院 (浜松市)「インフルエンザA型 4名 (10～14歳女児1名、15～19歳男性1名、20～29歳男性1名、60～69歳男性1名)」

鈴木診療院 (浜松市)「インフルエンザA型 1名 (20～29歳男性)」

宮口こんどうクリニック (浜松市)「インフルエンザA型 12名 (4歳女児1名、7歳女児1名、15～19歳男性2名、15～19歳女性1名、20～29歳男性1名、20～29歳女性3名、30～39歳男性1名、30～39歳女性1名、50～59歳女性1名)」

すずしろクリニック (浜松市)「インフルエンザ 4名 (9歳男児1名、20～29歳女性1名、40～49歳男性1名、70～79歳男性1名)」

のづえ内科呼吸器クリニック (浜松市)「インフルエンザA型 4名 (15～19歳男性1名、15～19歳女性1名、40～49歳男性1名、40～49歳女性1名)」

※特記事項欄コメントによるインフルエンザウイルス型別状況 (R4-R5 シーズン累計)

区分	報告数	割合
インフルエンザA型	594名	96%
インフルエンザB型	23名	4%

静岡県の感染症週報は、組織改編に伴い感染症対策課において作成しています。

- ・ 引き続き、疾病対策課ホームページにより御覧いただけます。

<http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/center.html>

2023年 2 週

疾患名	区分	静岡県							全国				
		49週	50週	51週	52週	1週	今週	年累計	51週	52週	1週	今週	年累計
エボラ出血熱													
クリミア・コンゴ出血熱													
痘そう													
南米出血熱													
ペスト													
マールブルグ病													
ラッサ熱													
急性灰白髄炎													
結核		5	6	4	2	3	10	13	197	157	89	154	272
ジフテリア													
重症急性呼吸器症候群(SARS)													
中東呼吸器症候群(MERS)													
鳥インフルエンザH5N1													
鳥インフルエンザH7N9													
新型コロナウイルス		20,589	27,447	32,238	33,020	42,691	40,872	83,563	1,149,932	1,033,054	1,174,110	843,064	2,117,174
コレラ													
細菌性赤痢									1		1		1
腸管出血性大腸菌感染症		2	3	1	1	1	1	2	45	21	8	18	26
腸チフス									1		1	1	2
パラチフス													
E型肝炎									9	6	5	10	17
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)													
A型肝炎									2			1	1
エキノコックス症													
糞熱													
オウム病													
オムスク出血熱													
回帰熱										2			
キヤサヌル森林病													
Q熱													
狂犬病													
コクシジオイデス症													
サル痘									1				
ジカウイルス感染症													
重症熱性血小板減少症候群											1		1
腎臓慢性出血熱													
西部ウマ脳炎													
ダニ媒介脳炎													
炭疽													
チクングニア熱													
つつが虫病		1		1					31	20	15	6	22
デング熱			1						2	1	2	1	3
東部ウマ脳炎													
鳥インフルエンザ													
ニパウイルス感染症													
日本紅斑熱													1
日本脳炎													
ハンタウイルス肺症候群													
Bウイルス病													
鼻疽													
ブルセラ症													
ベネズエラウマ脳炎													
ヘンドラウイルス感染症													
発しんチフス													
ポツリヌス症													
マラリア									1		1		1
野兔病													
ライム病													
リッサウイルス感染症													
リフトバレー熱													
癩鼻疽													
レジオネラ症		2	2	1	1	1		1	17	20	24	25	57
レプトスピラ症										1			
ロッキー山紅斑熱													
アメーバ赤痢		1	1	1					8	9	3	2	6
ウイルス性肝炎(A型肝炎及びE型肝炎を除く)									2	3	1	1	3
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症									23	21	10	14	40
急性弛緩性麻痺										1		2	2
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、日本脳炎等を除く)				1			2	3	6	3	4	10	18
クリプトスポリジウム症													
クロイツフェルト・ヤコブ病									1	2	1	4	5
劇症型溶血性レンサ球菌感染症						1		1	9	12	10	16	31
後天性免疫不全症候群									11	8	5	5	17
ジアルジア症													
侵襲性インフルエンザ菌感染症							1	1	11	3	3	6	16
侵襲性髄膜炎菌感染症													
侵襲性肺炎球菌感染症		1		2					24	18	21	32	66
水痘(入院例に限る)				2					2	4		2	2
先天性風しん症候群													
梅毒		3	6	2		1	7	8	169	114	66	134	271
播種性クリプトコックス症									1	1	1	3	4
破傷風													
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症													
バンコマイシン耐性腸球菌感染症					1					3	1		4
百日咳									4	3	3	8	14
風しん									1				
麻疹													
薬剤耐性アシネトバクター感染症											1		1
新型インフルエンザ等感染症													

※医療機関から届出の追加や取り下げがあった場合、増減することがあります。

定点把握感染症集計表(届出数)

2023年 2 週

	静岡県							全国				
	49週	50週	51週	52週	1週	今週	計	51週	52週	1週	今週	計
RSウイルス感染症	108	88	48	52	20	15	331	1,257	852	576	561	3,246
咽頭結膜熱	9	16	16	10	11	12	74	587	404	362	360	1,713
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	10	25	13	8	7	10	73	1,177	765	667	866	3,475
感染性胃腸炎	324	289	387	231	209	374	1,814	17,619	12,426	10,915	18,155	59,115
水痘	7	6	11	5	13	5	47	323	217	271	266	1,077
手足口病	35	21	15	7	4		82	911	532	322	282	2,047
伝染性紅斑			3	1	1	1	6	31	20	21	21	93
突発性発しん	23	18	20	13	13	18	105	678	517	556	728	2,479
ヘルパンギーナ	1	1	3	1			6	324	198	83	138	743
流行性耳下腺炎	4	3	3	1	4	4	19	97	53	63	68	281
インフルエンザ	35	55	139	195	444	642	1,510	6,103	9,768	23,139	36,388	75,398
急性出血性結膜炎								11	4	4	14	33
流行性角結膜炎	7	3	1		3	4	18	165	100	149	169	583
クラミジア肺炎(オウム病は除く)									1			1
細菌性髄膜炎		1			1		2	5	2	5	3	15
マイコプラズマ肺炎	1				1		2	15	8	8	9	40
無菌性髄膜炎		1					1	4	7	2	4	17
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)								2	3	1	3	9

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎、インフルエンザ
内科	50	インフルエンザ
眼科	22	急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎
基幹	10	クラミジア肺炎(オウム病は除く)、細菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ定点を兼ねている。

定点把握感染症集計表(定点当り)

2023年 2 週

	静岡県						全国			
	第49週	第50週	第51週	第52週	第1週	今週	第51週	第52週	第1週	今週
RSウイルス感染症	1.21	0.99	0.54	0.58	0.22	0.17	0.40	0.28	0.18	0.18
咽頭結膜熱	0.10	0.18	0.18	0.11	0.12	0.13	0.19	0.13	0.12	0.11
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.11	0.28	0.15	0.09	0.08	0.11	0.37	0.25	0.21	0.27
感染性胃腸炎	3.64	3.25	4.35	2.60	2.35	4.20	5.60	4.08	3.50	5.76
水痘	0.08	0.07	0.12	0.06	0.15	0.06	0.10	0.07	0.09	0.08
手足口病	0.39	0.24	0.17	0.08	0.04		0.29	0.17	0.10	0.09
伝染性紅斑			0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
突発性発しん	0.26	0.20	0.22	0.15	0.15	0.20	0.22	0.17	0.18	0.23
ヘルパンギーナ	0.01	0.01	0.03	0.01			0.10	0.06	0.03	0.04
流行性耳下腺炎	0.04	0.03	0.03	0.01	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02
インフルエンザ	0.25	0.40	1.00	1.40	3.19	4.62	1.24	2.05	4.73	7.37
急性出血性結膜炎							0.02	0.01	0.01	0.02
流行性角結膜炎	0.32	0.14	0.05		0.14	0.18	0.24	0.15	0.22	0.24
クラミジア肺炎(オウム病は除く)										
細菌性髄膜炎		0.10			0.10		0.01		0.01	0.01
マイコプラズマ肺炎	0.10				0.10		0.03	0.02	0.02	0.02
無菌性髄膜炎		0.10					0.01	0.01		0.01
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)								0.01		0.01

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎、インフルエンザ
内科	50	インフルエンザ
眼科	22	急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎
基幹	10	クラミジア肺炎(オウム病は除く)、細菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ定点を兼ねている。

感染症 2 週

保健所名	RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
総数	15	0.17	12	0.13	10	0.11	374	4.20	5	0.06
賀茂	2	1.00					1	0.50		
熱海							11	2.75		
東部			2	0.15	1	0.08	45	3.46		
御殿場			1	0.25			33	8.25		
富士			1	0.11			27	3.00	1	0.11
静岡市	4	0.25	1	0.06	4	0.25	86	5.38	1	0.06
中部	2	0.18					40	3.64		
西部	6	0.50	4	0.33			51	4.25	1	0.08
浜松市	1	0.06	3	0.17	5	0.28	80	4.44	2	0.11

保健所名	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳 (全数報告)		ヘルパンギーナ	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	週計	累計	罹患数	定点当り
総数	0		1	0.01	18	0.20	0	0	0	
賀茂										
熱海					1	0.25				
東部					5	0.38				
御殿場					1	0.25				
富士										
静岡市					4	0.25				
中部					1	0.09				
西部					1	0.08				
浜松市			1	0.06	5	0.28				

保健所名	流行性耳下腺炎		インフルエンザ		麻しん (全数報告)		風しん (全数報告)		指定届出機関 (定点)数	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	週計	累計	週計	累計	小児科	内科
総数	4	0.04	642	4.62	0	0	0	0	89	50
賀茂			5	1.67					2	1
熱海			28	4.67					4	2
東部	1	0.08	59	2.95					13	7
御殿場	1	0.25	70	11.67					4	2
富士	1	0.11	45	3.00					9	6
静岡市			112	4.48					16	9
中部			87	5.12					11	6
西部			81	4.26					12	7
浜松市	1	0.06	155	5.54					18	10

*百日咳は、平成30年1月1日より五類(定点把握対象)から五類(全数把握対象)に変更されました。

感染症 2 週

保健所名	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		細菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
総数	0		4	0.18	0		0		0	
賀茂										
熱海										
東部			2	0.50						
御殿場										
富士										
静岡市										
中部			1	0.33						
西部										
浜松市			1	0.33						

保健所名	無菌性髄膜炎		感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルス であるものに限る。)	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
総数	0		0	
賀茂				
熱海				
東部				
御殿場				
富士				
静岡市				
中部				
西部				
浜松市				

指定届出機関 (定点)数	
眼科	基幹
22	10
—	1
—	1
4	1
—	
3	1
5	2
3	1
4	1
3	2

*賀茂・熱海・御殿場の各保健所管内には眼科定点はありません。

*御殿場保健所管内には基幹定点はありません。

定点把握感染症年齢階級別集計表(届出数)





2023年 2 週





年齢階級区分	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計
〃(小児科定点把握感染症分)	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上							
〃(眼科定点把握感染症分)	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上		
〃(基幹定点把握分)	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上					
RSウイルス感染症	1	4	5	2	2				1												15
咽頭結膜熱			4	4				2					2								12
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎				3		1	2	2					1	1							10
感染性胃腸炎	2	17	71	55	48	29	34	27	10	11	13	31	6	20							374
水痘									2		1	2									5
手足口病																					
伝染性紅斑					1																1
突発性発しん		6	9			2	1														18
ヘルパンギーナ																					
流行性耳下腺炎						1	2	1													4
インフルエンザ	2	5	18	21	20	33	38	32	27	24	15	91	92	93	41	38	28	13	7	4	642
急性出血性結膜炎																					
流行性角結膜炎															1		2				3
クラミジア肺炎(オウム病は除く)																					
細菌性髄膜炎																					
マイコプラズマ肺炎																					
無菌性髄膜炎																					
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)																					

定点把握感染症年齢階級別集計表(定点当り)


2023年 2 週

年齢階級区分	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計
〃(小児科定点把握感染症分)	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上							
〃(眼科定点把握感染症分)	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上		
〃(基幹定点把握分)	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上					
RSウイルス感染症	0.01	0.04	0.06	0.02	0.02				0.01												0.17
咽頭結膜熱			0.04	0.04			0.02					0.02									0.13
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎				0.03		0.01	0.02	0.02				0.01	0.01								0.11
感染性胃腸炎	0.02	0.19	0.80	0.62	0.54	0.33	0.38	0.30	0.11	0.12	0.15	0.35	0.07	0.22							4.20
水痘									0.02		0.01	0.02									0.06
手足口病																					
伝染性紅斑					0.01																0.01
突発性発しん		0.07	0.10			0.02	0.01														0.20
ヘルパンギーナ																					
流行性耳下腺炎						0.01	0.02	0.01													0.04
インフルエンザ	0.01	0.04	0.13	0.15	0.14	0.24	0.27	0.23	0.19	0.17	0.11	0.65	0.66	0.67	0.29	0.27	0.20	0.09	0.05	0.03	4.62
急性出血性結膜炎																					
流行性角結膜炎															0.05		0.09				0.14
クラミジア肺炎(オウム病は除く)																					
細菌性髄膜炎																					
マイコプラズマ肺炎																					
無菌性髄膜炎																					
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)																					







ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




クラミジア肺炎(オウム病を除く)



細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く)





定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、百日咳、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎、インフルエンザ
内科	50	インフルエンザ
眼科	22	急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎
基幹	10	クラミジア肺炎(オウム病を除く)、細菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)

定点把握感染症(月報)集計表(届出数)

2022年 12 月

	静岡県							全国				
	7月	8月	9月	10月	11月	今月	計	9月	10月	11月	今月	計
性器クラミジア感染症	48	43	45	57	57	49	299	2,548	2,701	2,614	2,334	10,197
性器ヘルペスウイルス感染症	21	27	8	23	18	19	116	672	736	699	663	2,770
尖圭コンジローマ	8	7	9	18	11	6	59	502	517	580	483	2,082
淋菌感染症	15	10	14	16	11	11	77	834	903	833	755	3,325
性器クラミジア感染症(男)	14	14	10	16	21	18	93	1,275	1,419	1,346	1,173	5,213
性器クラミジア感染症(女)	34	29	35	41	36	31	206	1,273	1,282	1,268	1,161	4,984
性器ヘルペスウイルス感染症(男)	4	11		14	5	5	39	259	300	252	239	1,050
性器ヘルペスウイルス感染症(女)	17	16	8	9	13	14	77	413	436	447	424	1,720
尖圭コンジローマ(男)	4	2	3	8	6	3	26	318	342	400	337	1,397
尖圭コンジローマ(女)	4	5	6	10	5	3	33	184	175	180	146	685
淋菌感染症(男)	11	9	11	8	9	6	54	628	686	618	556	2,488
淋菌感染症(女)	4	1	3	8	2	5	23	206	217	215	199	837
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症								46	79	89		214
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	17	20	14	15	18	10	94	1,274	1,225	1,225	1,210	4,934
薬剤耐性緑膿菌感染症								8	6	8		22

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローマ、淋菌感染症
基幹	10	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症

定点把握感染症(月報)集計表(定点当り)

2022年 12 月

	静岡県						全国			
	7月	8月	9月	10月	11月	今月	9月	10月	11月	今月
性器クラミジア感染症	1.60	1.43	1.50	1.90	1.90	1.63	2.60	2.75	2.67	2.38
性器ヘルペスウイルス感染症	0.70	0.90	0.27	0.77	0.60	0.63	0.69	0.75	0.71	0.68
尖圭コンジローマ	0.27	0.23	0.30	0.60	0.37	0.20	0.51	0.53	0.59	0.49
淋菌感染症	0.50	0.33	0.47	0.53	0.37	0.37	0.85	0.92	0.85	0.77
性器クラミジア感染症(男)	0.47	0.47	0.33	0.53	0.70	0.60	1.30	1.45	1.37	1.19
性器クラミジア感染症(女)	1.13	0.97	1.17	1.37	1.20	1.03	1.30	1.31	1.30	1.18
性器ヘルペスウイルス感染症(男)	0.13	0.37		0.47	0.17	0.17	0.26	0.31	0.26	0.24
性器ヘルペスウイルス感染症(女)	0.57	0.53	0.27	0.30	0.43	0.47	0.42	0.44	0.46	0.43
尖圭コンジローマ(男)	0.13	0.07	0.10	0.27	0.20	0.10	0.32	0.35	0.41	0.34
尖圭コンジローマ(女)	0.13	0.17	0.20	0.33	0.17	0.10	0.19	0.18	0.18	0.15
淋菌感染症(男)	0.37	0.30	0.37	0.37	0.30	0.20	0.64	0.70	0.63	0.57
淋菌感染症(女)	0.13	0.03	0.10	0.27	0.07	0.17	0.21	0.22	0.22	0.20
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症							0.10	0.17	0.19	0.17
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	1.70	2.00	1.40	1.50	1.80	1.00	2.68	2.58	2.57	2.54
薬剤耐性緑膿菌感染症							0.02	0.01	0.02	0.01

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症
基幹	10	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症

2022年 12 月

保健所名	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
総数	49	1.63	19	0.63	6	0.20	11	0.37
賀茂								
熱海	3	3.00	1	1.00				
東部	1	0.20	1	0.20				
御殿場	4	4.00	2	2.00				
富士	6	2.00	2	0.67			1	0.33
静岡市	14	2.33	5	0.83	3	0.50	4	0.67
中部	6	1.50	2	0.50			1	0.25
西部	11	2.20	3	0.60			1	0.20
浜松市	4	0.80	3	0.60	3	0.60	4	0.80

保健所名	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
総数			10	1.00		
賀茂						
熱海						
東部			1	1.00		
御殿場						
富士						
静岡市			6	3.00		
中部						
西部			2	2.00		
浜松市			1	0.50		

保健所名	定点(指定届出機関)数	
	性感染症	基幹
総数	30	10
賀茂	-	1
熱海	1	1
東部	5	1
御殿場	1	-
富士	3	1
静岡市	6	2
中部	4	1
西部	5	1
浜松市	5	2

* 薬剤耐性アシネトバクター感染症は、平成26年9月19日から全数把握の対象となりました。

定点把握感染症(月報)年齢階級別集計表(届出数)









2022年 12 月








年齢階級区分	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上	計
性器クラミジア感染症						22	6	8	7	1	1	1	1	1		1	49
性器ヘルペスウイルス感染症						2	1	6	6	1		2		1			19
尖圭コンジローマ						1		2	2					1			6
淋菌感染症					1	2	1	1	3				2	1			11
性器クラミジア感染症(男)						8	2	2	3				1	1		1	18
性器クラミジア感染症(女)						14	4	6	4	1	1	1					31
性器ヘルペスウイルス感染症(男)								2	3								5
性器ヘルペスウイルス感染症(女)						2	1	4	3	1		2		1			14
尖圭コンジローマ(男)								2	1								3
尖圭コンジローマ(女)						1			1					1			3
淋菌感染症(男)					1	1		1	2				1				6
淋菌感染症(女)						1	1		1				1	1			5
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症																	
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症													1			9	10
薬剤耐性緑膿菌感染症																	

定点把握感染症(月報)年齢階級別集計表(定点当り)

2022年 12 月

年齢階級区分	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上	計
性器クラミジア感染症						0.73	0.20	0.27	0.23	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		0.03	1.63
性器ヘルペスウイルス感染症						0.07	0.03	0.20	0.20	0.03		0.07		0.03			0.63
尖圭コンジローマ						0.03		0.07	0.07					0.03			0.20
淋菌感染症					0.03	0.07	0.03	0.03	0.10				0.07	0.03			0.37
性器クラミジア感染症(男)						0.27	0.07	0.07	0.10				0.03	0.03		0.03	0.60
性器クラミジア感染症(女)						0.47	0.13	0.20	0.13	0.03	0.03	0.03					1.03
性器ヘルペスウイルス感染症(男)								0.07	0.10								0.17
性器ヘルペスウイルス感染症(女)						0.07	0.03	0.13	0.10	0.03		0.07		0.03			0.47
尖圭コンジローマ(男)								0.07	0.03								0.10
尖圭コンジローマ(女)						0.03			0.03					0.03			0.10
淋菌感染症(男)					0.03	0.03		0.03	0.07				0.03				0.20
淋菌感染症(女)						0.03	0.03		0.03				0.03	0.03			0.17
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症																	
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症													0.10			0.90	1.00
薬剤耐性緑膿菌感染症																	







定点種別	県内定点数	届出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症
基幹	10	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症

新型コロナウイルスに関するPCR検査状況等（令和5年1月18日時点）

項目	PCR・抗原検査実施者数	1週間の検査実施者数	PCR・抗原検査陽性者数	1週間の陽性者数	1週間の検査陽性率
1月11日 水	6,836		5,750		検査件数の報告が追いついていない場合や自己検査陽性者がいるため100%を超えています。 104.6%
1月12日 木	6,956		9,189		
1月13日 金	6,534		6,479		
1月14日 土	3,576	37,666	5,734	39,402	
1月15日 日	2,178		5,304		
1月16日 月	7,617		3,132		
1月17日 火	3,969		3,814		



静岡県の今シーズンのインフルエンザ年齢別の累積報告数・割合
 2023年第2週(1/9-1/15)時点 (政令市含む全県)



☆県民のみなさまへ注意喚起

(1) 「うつらない」・「うつさない」ための取組の徹底

(新型コロナウイルス対策と同じです)

- なるべく密を避けましょう
- こまめに手洗いをしましょう
- 人混みや会話時のマスク着用や咳エチケット（ティッシュや腕の内側などで口と鼻を覆い顔を他の人に向けない）を励行しましょう
- 十分な栄養と睡眠をとり、健康管理につとめましょう

(2) インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症にそなえて

- インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンのできるだけ早い接種を検討してください
- 発熱などの体調不良時にそなえて、解熱鎮痛薬、生活必需品（体温計、日持ちする食料（5～7日分）など）、新型コロナ抗原定性検査キットなどを早めに購入しておきましょう
- 発熱、頭痛、咳等の症状が出た場合にあわてないよう、かかりつけ医療機関、静岡県発熱等診療医療機関などの電話相談窓口を確認しておきましょう
- インフルエンザと診断されたら医師の指示を守って服薬し、外出を控えるとともに、家庭内でも咳エチケットを徹底し、十分な休養をとりましょう
- インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行による外来医療機関のひっ迫が懸念されていますので、企業や学校等は、従業員や児童等が体調不良で療養を開始する際に、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の検査結果を証明する書類や診断書を求めないように御配慮ください（復帰する際の検査の陰性証明や治癒証明も同様です）

サル痘

- ・サル痘は、サル痘ウイルス感染による急性発疹性疾患であり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）では、四類感染症に指定されています。1970年にザイール（現在のコンゴ民主共和国）でヒトで初めて感染が確認された感染症で、中央アフリカから西アフリカにかけて流行しています。
- ・2022年5月以降、従前のサル痘流行国への海外渡航歴のないサル痘患者が欧州、米国等で報告されており、日本では感染症発生動向調査において、集計の開始された2003年以降、輸入例を含めサル痘患者の報告はありませんでしたが、2022年7月25日、東京都在住の方の感染が初めて報告されました（R5.1.19現在：国内9例）。

<感染経路・予防法等>

項目	内容
感染経路	<ul style="list-style-type: none"> ・サル痘ウイルスに感染した動物（リスなどのげっ歯類）の血液、体液、皮膚病変との接触による感染が確認されています。 ・主に感染した人や動物の皮膚の病変・体液・血液に触れた場合（性的接触を含む）、患者と近くで対面し、長時間の飛沫にさらされた場合、患者が使用した寝具やタオル等に触れた場合等により感染します。
症状	<ul style="list-style-type: none"> ・潜伏期間は5～21日（通常7～14日）であり、発熱、頭痛、リンパ節腫脹、筋肉痛などが1～5日続いた後、発疹や水ぶくれが出現します（特に顔、口、手足、肛門、性器、お尻の発疹に注意）。 ・多くの場合、2～4週間持続し自然軽快するが、免疫力の低下している人では重症化するケースもあります。また、皮膚の二次細菌感染、気管支肺炎、敗血症、脳炎、角膜炎などの合併症をまれに起こすことがあります。
治療法	<ul style="list-style-type: none"> ・現在国が内服治療薬やワクチンを使用できるよう準備中です。
予防法	<ul style="list-style-type: none"> ・流行地では感受性のある動物や感染者との接触をさけることが大切です。 ・患者等が使用したりネン類や衣類に触れるときは、手袋などを着用して直接的な接触を避けること、触れた後に手洗いをするのが大切です。 ・発熱、発疹がありサル痘が疑われる場合、マスク着用、手指衛生を行うことが重要です。 ・また、天然痘ワクチンが有効（日本では1976年以降天然痘ワクチンの接種は行われていない）であるとの報告がなされています。
法令上の取り扱い	<ul style="list-style-type: none"> ・感染症法において、全数把握対象（四類感染症）であり、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出なければならない。

県民の皆様へ

- ・サル痘は、サル痘ウイルスによる急性発疹性疾患です。主にアフリカ大陸に生息するリスなどのげっ歯類が自然宿主とされており、感染した動物に噛まれたり、感染した動物の血液、体液、皮膚病変（発疹部位）との接触による感染が確認されています。主に感染した人や動物の皮膚の病変・体液・血液に触れた場合（性的接触を含む）、患者と近くで対面し、長時間の飛沫にさらされた場合、患者が使用した寝具等に触れた場合等により感染します。
- ・これまでアフリカ大陸の流行地域（アフリカ大陸西部から中央部）で主に発生が確認されていましたが、2022年5月以降海外渡航歴のないサル痘患者が欧米等を中心に世界各国で確認されています。
- ・サル痘の潜伏期間は7～14日（最大5～21日）とされており、潜伏期間の後、発熱、頭痛、リンパ節腫脹、筋肉痛などの症状が0～5日続き、発熱1～3日後に発疹が出現、発症から2～4週間で治癒するとされています。
- ・発熱、発疹等、体調に異常がある場合には身近な医療機関に相談するとともに、手指消毒等の基本的な感染対策を行ってください。
- ・海外からの帰国された方で、体調に異常がある場合は、到着した空港等の検疫ブースで検疫官に申し出てください。帰国後に症状が認められた場合は、医療機関を受診し、医師へ海外への渡航歴を教えてください。
- ・なお、海外では、サル痘の予防に対しては、天然痘ワクチンが有効であるとの報告がなされており、ウイルスへの曝露後4日以内の接種で感染予防効果が、曝露後4～14日以内の接種で重症化予防効果があるとされています。天然痘ワクチンについては、国において十分な量の備蓄が行われています。

<関連情報>

- ・静岡県ホームページ（サル痘について）
<https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/kansen/monkeypox.html>
- ・厚生労働省ホームページ（サル痘について）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html
- ・国立感染症研究所ホームページ（サル痘とは）
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/408-monkeypox-intro.html>

県内での麻疹(はしか)患者の発生

令和4年7月28日、中部保健所管内の医療機関から麻疹患者発生の届出がありました。静岡県内での麻疹患者発生は、約2年ぶりとなります(前回発生は、2020年5月)。

中部保健所の調査により麻疹患者との接触者は全て特定され、医療機関から個別連絡の実施をする等、感染拡大の防止に努めています。

1 患者の概要

- ・焼津市在住の1歳6か月男児(MRワクチン未接種、現在は回復している)
- ・6月中旬から7月中旬までインドネシアへ渡航、麻疹患者と接触

2 患者確認に至った経緯

日時	状況
7月17日	・発熱
7月19日	・焼津市内の医療機関Aを受診
7月20日	・発熱・発疹のため同市内の医療機関Bを受診(接触者なし)
7月21日	・医療機関Bからの紹介により同市内の医療機関Cを受診・入院
7月25日	・解熱
7月26日	・退院、自宅待機
7月28日	・検体(25日採取)の検査結果が判明 ・医療機関Cから麻疹患者として届出

3 麻疹患者の発生状況

(単位：人)

年		平成29年 (2017年)	平成30年 (2018年)	令和元年 (2019年)	令和2年 (2020年)	令和3年 (2021年)	令和4年 (2022年) ^{※1}
国内	全国	177	279	744	10	6	3
	静岡県	1	5	10	1	0	1
参考	インドネシア ※2	3,949	2,885	1,822	393	290	753

※1 令和4年の全国は7月31日時点、静岡県は8月3日時点、インドネシアは3月時点

※2 インドネシアの報告数はWHO資料(<https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/surveillance/monitoring/provisional-monthly-measles-and-rubella-data>)より

県民の皆様へ（麻しん（はしか）について）

< 感染経路・予防法等 >

項目	内容
感染経路	<ul style="list-style-type: none"> ・麻しんウイルスの感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染です。 ・ヒトからヒトへ感染が伝播し、感染力は非常に強いと言われており、感染する時期は、発症の1日前から解熱後3日後までとされています。 ・免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症し、一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われてしています。
症状	<ul style="list-style-type: none"> ・潜伏期は通常10～12日間であり、カタル期（2～4日）には38℃前後の発熱、咳、鼻汁、くしゃみ、結膜充血などの症状があり、熱が下降した頃に頬粘膜にコプリック斑が出現します。 ・発疹期（3～4日）には一度下降した発熱が再び高熱となり（39～40℃）、特有の発疹（小鮮紅色斑が暗紅色丘疹、それらが融合し網目状になる）が出現します。発疹は耳後部、頸部、顔、体幹、上肢、下肢の順に広がります。 ・回復期（7～9日）には解熱し、発疹は消退し、色素沈着がおこります。 ・なお、上記症状を十分満たさず、一部症状のみの麻しん（修飾麻しん）もみられることがあり、これは麻しん・風しんワクチン（MRワクチン）による免疫が低下してきた者に見られることが多くあります。
治療	<ul style="list-style-type: none"> ・特異的な根治療法はなく、対症療法を行います。
予防法	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>ワクチンの効果は非常に高く、ワクチン接種を受けた人の95%以上が免疫を獲得します。しかし、接種しても、数%は免疫が獲得できない場合や、獲得した免疫が持続しない場合があります。</u> ・<u>現在、1歳（第1期）と小学校入学前年度（第2期）に、MRワクチンの定期予防接種を実施しており、予防接種をしていれば感染するリスクは少なくなります。</u> ・なお、本県では第1期では97.1%、第2期では94.8%の方がMRワクチンを接種しています（令和2年度実績）。
海外での麻しん	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>海外（特に、アジア、アフリカ、欧州）では、麻しんが発生しています。</u> ・<u>海外に行く前には、麻しんの予防接種歴を母子手帳などで確認し、2回接種していない方は予防接種を検討してください。</u> ・<u>帰国後2週間程度は健康状態に注意しましょう。</u>
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・MRワクチン未接種の方で、麻しん（はしか）と診断された方や熱や発疹のある方と接触後に、37.5℃を超える熱や、全身の発疹等麻しんを疑う症状が現れた場合は、事前に医療機関に連絡しマスク着用の上、指示に従い受診してください。 ・また、移動の際は、周囲の方への感染を拡げないように、公共交通機関等の利用を避けてください。

< 関連情報 >

- ・厚生労働省ホームページ（麻しんについて）

[https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-ansenshou/measles/index.html](https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/measles/index.html)