

静岡県飼料作物奨励品種の品種特性（令和7年度版）

＜青刈飼料作物＞

草種	早晩性	品 種	来 歴 [系統名]	耐 抵 抗 性				特 性
				病 害	耐 干 性	耐 湿 性	耐 倒 伏 性	
とうもろこし	極 早 生	パイオニア 108	[34N84]	病害抵抗性は強い 方である	中	中	強	RM108タイプ。初期生育に優れ、同熟期帯の中では乾物収量が高い。子実が揃いが良く、先端まで充実する。
	早 生	タカネスター	長野県中信農業試験場育成	病害抵抗性は強い 方である	中	中	強	RM112タイプ。茎葉収量高く、耐倒伏性に優れる。
	早 生	スノーデント 115	[SH4681]	病害抵抗性は強い 方である	中	中	強	RM115タイプ。長稈だが着雌穂高が低く、耐倒伏性に優れる。雌穂の粒列数が多く、子実収量が高い。
らい麦	極 早 生	春一番	雪印種苗 育成	雪腐抵抗性に強い	強	中	中	細茎で乾燥しやすく、乾草、ロールベール利用に適している。収穫適期は穂ばらみ期から出穂期。イタリアンとの混播に適している。
	早 生	ハルミドリ	米国由来	病害抵抗性は強い 方である	強	中	強	早生種の中では生育期間が長く、乾物収量が高くなる傾向のある品種。刈遅れると栄養価の低下・倒伏の増加が起こるので適期刈取を心がける。
えん麦	極 早 生	ウルトラハヤテ 韋駄天	雪印種苗 育成	冠さび病に強い	—	—	強	耐倒伏性が強く、茎が細く乾きやすい。越冬性が良好なので、晩秋に播種し、春に収穫する作型にも適する。また、晩夏播きでは年内収穫が可能。
	極 早 生	スーパーハヤ テ 隼	雪印種苗 育成	病害抵抗性は強い 方である	強	中	中	出穂が早く、草丈が高い、多収品種。予乾後、低水分でのラッピングサイレージに適している。8月下旬から9月上旬に播種し、年内収穫が可能。
	早 生	ハイオーツ	雪印種苗 育成	病害抵抗性は強い 方である	強	中	中	細葉、細茎で乾燥しやすく、分けつが多い多収品種。乾草・ロールベール利用に適する。過湿田での栽培には適さない。
ソルガム類	早 生	高消化ソルゴー	[KCS404]	紫斑点病に強い	強	中	中	糖分含量が高く、リグニン含量が少なく消化のよいBMR品種。早生で、収量はやや多い。サイレージ、ロールベール向き。
		ベールスーダン	[HS9401]	—	強	中	強	幹が細く、乾燥速度が速い。乾物収量が高く、再生力が良好で、2～3回刈が可能。ロールベール専用品種で、耐倒伏性に優れている。
		ハイスーダン	[HS-K1]	—	強	中	中	草丈1.5m前後で、出穂前に収穫すると、し好性が高く、再生も良好となる。細茎で乾燥が早い、多収品種。

＜イネ科牧草＞

草種	早晩性	品 種	来 歴	耐 抵 抗 性				特 性
				病 害	耐干性	耐湿性	耐倒伏性	
イタリアンライグラス	早生	タチワセ	雪印種苗育成	冠さび病にやや弱い	中	強	強	草型は強い直立型で、アップライトリーフの草姿を示す。倒伏には極めて強く、又、下部がむれずに乾き易いため機械刈適性が大である。鳥取系他。
	早生	ワセアオバ	北陸農試にて育成。鳥取系	冠さび病・かさ枯れ病の抵抗性は強くない	中	強	強	2倍体の短期利用型品種、越冬前・早春の生育が早く、梅雨期まで旺盛な生育をする。早期多収型でサイレージに向くが乾草調製も可能。
	早生	ワセユタカ	山口県農試にて育成、鳥取系他	冠さび病には強くないが斑点性病には強い	弱	強	強	2倍体の短期利用型品種、2倍体の中では茎が長くて太い。過繁茂しやすいため刈遅れに注意する必要がある。
	中生	タチムシャ	雪印種苗育成	冠さび病抵抗性は強い。	中	中	極強	2倍体の短期利用型品種。直立型の草姿で、耐倒伏性は非常に強い。刈取り後、乾き易いので乾草・サイレージ利用に適する。
	晩生	マンモスB	雪印種苗育成	いもち病などの葉病害に強い	中	強	強	4倍体の中晩生型品種。初期生育・耐寒性・耐病性が強いいため利用範囲が広い。春播性が強いいため早春播種でも利用可能。
リュウムフェストロ		那系1号	農研機構育成	葉腐病・冠さび病に強い	強	中	中	越夏性にライグラス類とメドウフェスクを交配して作出した品種で、既存品種と同等以上の収量が得られ、越夏性に優れている。
オーチャードグラス	極早生	アキミドリⅡ	草地試験場育成	黒さび病及びうどんこ病に強い	中	中	強	耐病性に優れており、越夏性及び秋の再生が良好。温暖地域ほど多収傾向となる。放牧地または放牧・採草兼用の草地に適する。
	早生	ナツミドリ	雪印種苗育成	黒さび病に強い	中	中	強	年間を通じて生育が旺盛なため、季節生産量が安定しており、年間総収量が高い。放牧、採草のいずれにも好適。
	中生	まきばたろう	農研機構育成	冠さび病、雲形病、うどんこ病に強い。	中	中	強	多収で耐病性および永続性に優れる。
トールフェスク	中生	サザンクロス	雪印種苗育成	冠さび病、網斑病に強い。	強	—	強	やや直立型で、葉幅が広く、葉色はやや濃緑である。越夏性および秋季の草勢が良好である。
	中生	ウシブエ	農研機構育成	冠さび病、網斑病に強い。	強	—	中	越夏性及び永続性に優れる。放牧および採草利用が可能である。出穂はサザンクロスよりも若干早い。
スロースクラ		カタンボラ	ザンビアのカタンボラ地域由来	—	強	強	中	2倍体で茎葉が細くて多い。初期生育が早く、地上ほふく茎をよく出す。耐干性は強く、再生も良好である。
パニカム属		ギニアグラス ナツカゼ	アフリカより導入、九州農育成	—	強	弱	中	直立型で葉幅・葉長とも大きい。初期生育が良好で雑草との競合に強い。生育が進むと急激に倒伏性が増し、茎の硬化が起るため刈遅れに注意。

<マメ科牧草>

草 種	早 晩 性	品 種	来 歴	耐 抵 抗 性				特 性
				病 害	耐 干 性	耐 湿 性	耐 倒 伏 性	
ローバ アカク	早 生	ケンランド	米、ケンタッキー州農試育成	炭そ病に対する抵抗性は強いが、茎割病には弱い	強	中	中	耐病性に優れる。再生力が旺盛で温暖地では高収量が期待できる。冬枯するため寒冷地には適さない。
ローバ シロク	中 生	フィア	ニュージーランドの在来種選抜	モザイク病にやや抵抗性あり	強	中	一	中葉型の品種で春期、夏期の生育に優れる。温暖な地域で永続性が高く、放牧地の混播用草種としての利用に適している。
アルファ ファ	早 生	ネオタチワカバ	愛知農総試育成	菌核病等に強い	強	強	強	耐倒伏性、永続性、再生力に優れる。耐湿性が強いため水田転換畑の栽培も可能。多収で、アブラムシ抵抗性が強い。温暖地の他冷涼地での栽培にも適する。