

令和6年度 技術情報第2号
茶 カンザワハダニ

令和6年8月28日
静岡県病虫害防除所長

茶のカンザワハダニが平年よりも多く発生しています。
今後も多発生が予想されるため、防除の徹底をお願いします。

1 発生状況

8月に県内5地域（富士山麓、静岡市北部、牧之原、小笠・磐田原、川根の各10地点）の巡回調査を実施した結果、樹冠面におけるカンザワハダニの平均寄生葉率が10.0%（平年3.3%）と、平年よりも多かった。（表1）。特に、牧之原地域の平均寄生葉率が16.6%（平年4.0%）、川根地域が11.4%（同1.9%）と多かった。

天敵のカブリダニ類の発生状況は、平均叩き落とし虫数が1.9頭（平年0.5頭）とやや多かった。

気象の1か月予報（8月22日発表）によると、降水量は平年より多いものの、気温は平年よりも高いため、今後も平年より多い発生が予想される。

2 防除対策

- 発生が認められる茶園では、天敵への影響が少ない薬剤を選択し、直ちに薬剤防除を実施する。
- 降雨が少ない場合は急激に増殖する恐れがある。茶園の発生に注意し、早期に防除を実施する。
- 薬剤防除については静岡県農薬安全使用指針・農作物病虫害防除基準（<https://www.s-boujo.jp>）を確認する。また、不明な点は病虫害防除所、茶業研究センター、及び農林事務所等の指導機関に問い合わせる。

表1 茶の樹冠面におけるカンザワハダニ発生状況

地域名		富士山麓	静岡市 北部	牧之原	小笠・ 磐田原	川根	県全体
樹冠面 寄生葉率(%)	本年	7.5*	8.0	16.6	6.3	11.4	10.0
	平年	3.7	3.6	4.0	3.1	1.9	3.3
発生面積率 (%)	本年	60	50	70	60	90	66
	平年	33	35	39	39	27	35

* 数値は10地点の平均値。平年は過去10年間の平均値。

【問合せ先】静岡県病虫害防除所

〒438-0803 磐田市富丘678-1 TEL 0538-36-1543 FAX 0538-33-0780

ホームページ <https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/norinjimusho/1058658/boujo/index.html>

