

# チャノキイロアザミウマ発生時期予測

令和8年8月20日  
静岡県病害虫防除所

多くのかんきつ産地におけるチャノキイロアザミウマの発生時期は、  
以下のとおりと予想されます。

**第6世代成虫： 8月17日～9月4日**

**第7世代成虫： 9月4日～27日**


**第8世代成虫： 9月25日～11月3日**

(8月20日以降の気温が平年並で推移した場合)


(昨年並～数日遅い。産地ごとの発生時期は次頁参照)

- ・各世代成虫の発生時期に防除を実施してください。
- ・今後の気温が平年より高く(低く)推移した場合、発生時期は数日早く(遅く)なります。
- ・防除対象園地の標高が、同地域のアメダス地点より100m高い(低い)場合、発生時期は数日遅く(早く)なります。


# チャノキイロアザミウマ第6世代 発生時期予測



# チャノキイロアザミウマ第7世代 発生時期予測



# チャノキイロアザミウマ第8世代 発生時期予測



# 予測に用いるアメダス地点と標高

シミュレーションによる発生予測はアメダスの気象データを用いています。ほ場とアメダス地点の標高が異なる場合はチャノキイロアザミウマの発生時期にズレが生じることから、補正する必要があります。標高が100m高くなるごとに0.6℃低くなると仮定すると、発生時期は5～6日遅くなります(世代により異なる)。

