

IV 作物別主要病害虫の程度別発生面積と発生程度

1 普通作物

イネ (調査点数：50点、栽培面積：15,000ha (早期面積：2,215ha))

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)					調査項目	発生程度		
			甚	多	中	少	計		平均	標準偏差	平年値
いもち病(葉いもち)	田	6月	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.1
	方	7月	0	0	0	0	2	発病株率(%)	0.0	0.0	0.1
	平	8月	0	0	0	0	8		0.0	0.0	2.2
	坦	9月	0	0	0	0	8		0.0	0.0	1.5
	東	6月	0	0	0	0	1	0	0.0	0.0	0.1
	部	7月	0	0	0	0	4	発病株率(%)	0.0	0.0	0.6
	高	8月	0	0	0	0	4		0.0	0.0	0.7
	冷	9月	0	0	0	0	4		0.0	0.0	0.3
	志	6月	0	0	0	0	1	0	0.0	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	13	13	9	0.5	1.3	2.3
	榛	8月	0	0	0	13	13	13	1.0	2.6	2.4
	原	9月	0	0	0	0	18	発病株率(%)	0.0	0.0	1.6
	中	6月	0	0	0	14	14	7	2.3	5.6	0.8
	遠	7月	0	0	0	0	0	15	0.0	0.0	2.5
	西	8月	0	0	0	0	0	17	0.0	0.0	2.7
	部	9月	0	0	0	0	0	17	0.0	0.0	1.5
いもち病(穂いもち)	中	6月	0	0	0	10	10	10	0.4	1.2	0.5
	遠	7月	0	0	0	20	20	22	1.2	2.6	3.7
	早	8月	0	0	0	20	20	12	1.2	2.6	3.0
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	県	6月	0	0	0	6	6	4	0.6	2.7	0.3
	全	7月	0	0	0	7	7	10	0.4	1.4	1.9
	体	8月	0	0	0	7	7	11	0.5	1.8	2.3
	9月	0	0	0	0	0	0	13	0.0	0.0	1.4
	田	6月	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	方	7月	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
	平	8月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	坦	9月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	東	6月	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	部	7月	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
	高	8月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	冷	9月	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.1
いもち病(穂いもち)	志	6月	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	太	7月	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
	榛	8月	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.1
	原	9月	0	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.2
	中	6月	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	遠	7月	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
	西	8月	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.1
	部	9月	0	0	0	0	0	5	0.0	0.0	0.2
	中	6月	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	遠	7月	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
	早	8月	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	県	6月	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	全	7月	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
	体	8月	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
	9月	0	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.1

(巡回調査結果)

イネ (調査点数：50点、栽培面積：15,000ha (早期面積：2,215ha))

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)					調査項目	発生程度		
			甚	多	中	少	計		平均	標準偏差	平年値
白葉枯病	田	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	0	0	発病株率(%)	0.0	0.0	0.0
	平	8月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
	坦	9月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	東	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	冷	9月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	志	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	榛	8月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	原	9月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	中	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	西	8月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	部	9月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
紋枯病	中	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	早	8月	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.1
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	県	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	全	7月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	体	8月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	9月	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	田	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.1
	平	8月	0	0	0	0	22	25	1.3	2.7	2.7
	坦	9月	0	0	11	56	67	58	12.0	11.9	11.7
	東	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.1
	高	8月	0	0	0	13	13	37	0.5	1.3	3.8
	冷	9月	0	0	0	20	20	38	2.4	4.8	6.0
紋枯病	志	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	13	13	18	3.5	9.3	3.1
	榛	8月	13	0	13	13	38	52	16.5	30.4	11.4
	原	9月	0	14	14	14	43	60	21.1	28.1	17.9
	中	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.2
	西	8月	0	0	0	0	0	29	0.0	0.0	5.0
	部	9月	0	0	0	38	38	51	1.5	1.9	7.4
	中	6月	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	10	10	3	0.4	1.2	0.3
	早	8月	0	0	10	20	30	44	7.6	14.6	10.3
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	県	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	全	7月	0	0	0	5	5	6	0.7	4.2	0.8
	体	8月	2	0	5	14	21	37	5.2	16.1	6.7
	9月	0	0	3	5	26	33	53	7.2	15.5	11.3

イネ (調査点数: 50点, 栽培面積: 15, 000ha (早期面積: 2, 215ha))

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率(%)				調査 項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
萎縮病	田	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	0	発病株 率(%)	0.0	0.0
	平	8月	0	0	0	0	率(%)	0.0	0.0
	坦	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	冷	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	志	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	0	1	0.0	0.1
	榛	8月	0	0	0	0	4	0.0	0.3
	原	9月	0	0	0	0	5	0.0	0.6
	中	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	西	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	部	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
萎縮病	中	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	早	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—
	県全体	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	1	0.0	0.1
		9月	0	0	0	0	1	0.0	0.1
	田	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	44	44	1.8	2.0
	平	8月	0	0	0	44	44	4.0	5.3
	坦	9月	0	0	0	44	44	3.6	4.4
	東	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	38	38	4.5	9.0
	冷	9月	0	0	0	80	80	7.2	3.9
萎縮病	志	6月	0	0	0	20	20	8.0	16.0
	太	7月	0	0	13	50	63	14.0	20.9
	榛	8月	0	13	0	75	88	32.0	28.8
	原	9月	0	43	29	100	69	72.6	24.7
	中	6月	0	0	0	29	29	2.9	4.6
	遠	7月	0	11	0	67	78	24.9	29.6
	西	8月	0	25	38	88	61	50.0	36.3
	部	9月	0	38	25	100	91	64.5	33.6
	中	6月	0	0	10	30	40	13.6	20.5
	遠	7月	0	30	30	10	70	53.6	39.3
	早	8月	0	50	10	30	90	66.8	34.4
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—
	県全体	6月	0	0	3	17	20	5.6	13.9
		7月	0	9	9	34	52	20.2	31.9
		8月	0	19	7	44	70	32.5	36.6
		9月	0	15	10	33	59	28.0	37.0

イネ (調査点数: 50点, 栽培面積: 15, 000ha (早期面積: 2, 215ha))

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率(%)				調査 項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
萎縮病	田	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	0	2	0.0	0.1
	平	8月	0	0	0	0	6	0.0	0.5
	坦	9月	0	0	0	0	5	0.0	0.4
	東	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	13	2	0.5	1.3
	高	8月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	冷	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	志	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	榛	8月	0	0	0	0	3	0.0	0.2
	原	9月	0	0	0	0	3	0.0	0.3
	中	6月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	5	0.0	0.4
	西	8月	0	0	0	0	10	0.0	1.4
	部	9月	0	0	0	0	10	0.0	1.8
萎縮病	中	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	早	8月	0	0	0	0	9	0.0	0.5
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—
	県全体	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	2	3	0.1	0.6
		8月	0	0	0	0	6	0.0	0.5
		9月	0	0	0	0	4	0.0	0.6
	田	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	平	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	坦	9月	0	0	0	11	10	0.9	2.5
	東	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	0	5	0.0	0.8
	冷	9月	0	0	0	0	3	0.0	0.3
萎縮病	志	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	榛	8月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	原	9月	0	0	0	57	23	7.4	7.8
	中	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	西	8月	0	0	0	0	5	0.0	0.5
	部	9月	0	0	0	0	14	0.0	1.7
	中	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	1	0.0	0.1
	早	8月	0	0	0	0	2	0.0	0.1
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—
	県全体	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	3	0.0	0.3
		9月	0	0	0	13	13	1.5	4.5

イネ (調査点数：50点、栽培面積：15,000ha (早期面積：2,215ha))

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率(%)				調査 項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
稲こじ病	田	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	0	発病株 率(%)	0.0	0.0
	平	8月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	坦	9月	0	0	0	11	28	0.4	1.3
	東	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	13	16	0.5	1.3
	冷	9月	0	0	20	40	47	8.8	13.9
	志	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	榛	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	原	9月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	中	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	西	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	部	9月	0	0	0	0	10	0.0	0.0
ばか苗病	中	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	早	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—
	県	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	全	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	体	8月	0	0	0	2	4	0.1	0.6
		9月	0	0	3	5	8	1.2	5.8
	田	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	平	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	坦	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	冷	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
※ ばか苗病の平年値は、過去7ヵ年 (H28～R5年度) の平均値	志	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	榛	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	原	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	西	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	部	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	早	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—
	県	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	全	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	体	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0

イネ (調査点数：50点、栽培面積：15,000ha (早期面積：2,215ha))

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率(%)				調査 項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
ニカメイガ	田	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	0	2	被害株 率(%)	0.0
	平	8月	0	0	0	0	2	0.0	0.0
	坦	9月	0	0	0	0	5	0.0	0.0
	東	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	0	7	0.0	0.0
	冷	9月	0	0	0	0	8	0.0	0.0
	志	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	榛	8月	0	0	0	13	2	0.5	1.3
	原	9月	0	0	0	0	12	0.0	0.0
	中	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	西	8月	0	0	0	0	3	0.0	0.0
	部	9月	0	0	0	0	14	1.0	1.7
ヒメトビウンカ	中	6月	0	0	0	0	2	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	3	0.0	0.0
	早	8月	0	0	0	0	10	0.0	0.0
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—
	県	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	全	7月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	体	8月	0	0	0	2	5	0.1	0.6
		9月	0	0	0	5	10	0.2	0.9
	田	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	56	35	0.9	1.0
	平	8月	0	11	22	22	56	4.4	4.8
	坦	9月	0	0	0	44	44	0.4	0.5
	東	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	38	20	0.4	0.5
	高	8月	0	0	0	13	24	0.3	0.7
	冷	9月	0	0	0	0	20	0.0	0.0
※ ばか苗病の平年値は、過去7ヵ年 (H28～R5年度) の平均値	志	6月	0	0	0	20	3	0.4	0.8
	太	7月	0	0	0	13	34	0.3	0.7
	榛	8月	0	0	0	63	54	1.1	1.1
	原	9月	0	0	0	43	58	0.6	0.7
	中	6月	0	0	0	0	11	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	33	29	0.7	1.1
	西	8月	0	0	0	38	63	0.8	1.1
	部	9月	0	0	0	13	46	0.1	0.3
	中	6月	0	0	0	10	19	0.1	0.3
	遠	7月	0	0	0	20	32	0.3	0.6
	早	8月	0	0	0	30	40	0.3	0.5
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—
	県	6月	0	0	0	6	8	0.1	0.4
	全	7月	0	0	0	32	30	0.5	0.8
	体	8月	0	2	5	33	48	1.4	2.8
		9月	0	0	0	21	48	0.2	0.5

イネ (調査点数：50点、栽培面積：15,000ha (早期面積：2,215ha))

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率(%)				調査 項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
トビイロウンカ	田	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	平	8月	0	0	0	11	最高寄 生数/株	0.1	0.3
	坦	9月	0	0	0	20	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	東	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	冷	9月	0	0	0	7	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	志	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	1	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	榛	8月	0	0	0	6	最高寄 生数/株	0.0	0.1
	原	9月	0	0	0	17	最高寄 生数/株	0.0	1.4
	中	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	西	8月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.1
	部	9月	0	0	0	10	最高寄 生数/株	0.0	0.1
セジロウンカ	中	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	早	8月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	期	9月	—	—	—	—	最高寄 生数/株	—	—
	県	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	全	7月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	体	8月	0	0	0	2	最高寄 生数/株	0.0	0.2
	9月	9月	0	0	0	14	最高寄 生数/株	0.0	0.6
	田	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	56	最高寄 生数/株	1.6	1.8
	平	8月	0	0	0	67	最高寄 生数/株	6.6	8.4
	坦	9月	0	0	0	33	最高寄 生数/株	0.4	0.7
	東	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	75	最高寄 生数/株	2.4	1.9
	高	8月	0	0	0	25	最高寄 生数/株	0.4	0.7
	冷	9月	0	0	0	11	最高寄 生数/株	0.0	0.0
斑 点 米 カ	志	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	38	最高寄 生数/株	0.4	0.5
	榛	8月	0	0	0	38	最高寄 生数/株	0.8	1.1
	原	9月	0	0	0	29	最高寄 生数/株	0.3	0.5
	中	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	33	最高寄 生数/株	0.3	0.5
	西	8月	0	0	0	38	最高寄 生数/株	1.4	2.3
	部	9月	0	0	0	59	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	中	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	20	最高寄 生数/株	0.2	0.4
	早	8月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	期	9月	—	—	—	—	最高寄 生数/株	—	—
	県	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	全	7月	0	0	0	43	最高寄 生数/株	0.9	1.5
	体	8月	0	0	0	33	最高寄 生数/株	1.8	4.7
	9月	9月	0	0	0	13	最高寄 生数/株	0.2	0.4

イネ (調査点数：50点、栽培面積：15,000ha (早期面積：2,215ha))

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率(%)				調査 項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
ツマグロヨコバイ	田	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	11	最高寄 生数/株	0.1	0.3
	平	8月	0	0	0	56	最高寄 生数/株	1.6	2.2
	坦	9月	0	0	0	56	最高寄 生数/株	1.0	1.1
	東	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	13	最高寄 生数/株	0.1	0.3
	冷	9月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	志	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	榛	8月	0	0	10	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	原	9月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	中	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	11	最高寄 生数/株	0.1	0.3
	西	8月	0	0	0	25	最高寄 生数/株	0.4	0.7
	部	9月	0	0	0	13	最高寄 生数/株	0.1	0.3
斑 点 米 カ	中	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	早	8月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	期	9月	—	—	—	—	最高寄 生数/株	—	—
	県	6月	0	0	0	0	最高寄 生数/株	0.0	0.0
	全	7月	0	0	0	5	最高寄 生数/株	0.0	0.2
	体	8月	0	0	0	19	最高寄 生数/株	0.4	1.2
	9月	9月	0	0	0	15	最高寄 生数/株	0.3	0.7
	田	6月	0	20	0	40	すくい 取り虫 数30回 振	3.6	—
	方	7月	0	25	0	75	すくい 取り虫 数30回 振	7.0	11.0
	平	8月	0	0	20	40	すくい 取り虫 数30回 振	2.2	—
	坦	9月	0	0	0	78	すくい 取り虫 数30回 振	1.9	—
	東	6月	0	0	0	0	すくい 取り虫 数30回 振	0.0	—
	部	7月	0	0	0	40	すくい 取り虫 数30回 振	0.4	—
	高	8月	0	13	13	25	すくい 取り虫 数30回 振	4.9	1.3
	冷	9月	0	0	25	0	すくい 取り虫 数30回 振	3.3	—
メムシ類	志	6月	30	10	20	10	すくい 取り虫 数30回 振	25.5	15.7
	太	7月	14	29	14	29	すくい 取り虫 数30回 振	19.1	15.9
	榛	8月	0	0	17	33	すくい 取り虫 数30回 振	1.5	—
	原	9月	0	0	14	57	すくい 取り虫 数30回 振	2.1	—
	中	6月	25	13	38	13	すくい 取り虫 数30回 振	44.3	19.0
	遠	7月	13	38	25	13	すくい 取り虫 数30回 振	38.9	31.4
	西	8月	0	0	20	40	すくい 取り虫 数30回 振	2.6	—
	部	9月	0	0	38	38	すくい 取り虫 数30回 振	1.0	—
	中	6月	30	40	20	100	すくい 取り虫 数30回 振	33.7	35.2
	遠	7月	86	60	0	40	すくい 取り虫 数30回 振	9.2	23.5
	早	8月	0	0	0	33	すくい 取り虫 数30回 振	0.3	—
	期	9月	—	—	—	—	すくい 取り虫 数30回 振	—	—
	県	6月	23	20	20	14	すくい 取り虫 数30回 振	27.5	16.6
	全	7月	7	24	17	76	すくい 取り虫 数30回 振	17.8	19.7
	体	8月	0	3	12	30	すくい 取り虫 数30回 振	2.3	—
	9月	9月	0	0	7	50	すくい 取り虫 数30回 振	1.5	1.6

イネ (調査点数: 50点, 栽培面積: 15, 000ha (早期面積: 2, 215ha))

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)				調査項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
イチモンジセセリ	田	6月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	平	8月	0	0	0	22	被害株率(%)	0.2	0.4
	平	9月	0	0	0	33	被害株率(%)	0.8	1.2
	東	6月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	13	被害株率(%)	0.1	0.3
	冷	9月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	志	6月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	13	被害株率(%)	0.3	0.7
	榛	8月	0	0	0	25	被害株率(%)	0.6	1.1
	原	9月	0	0	0	14	被害株率(%)	0.4	1.0
	中	6月	0	0	0	14	被害株率(%)	0.1	0.3
	遠	7月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	西	8月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	部	9月	0	0	0	13	被害株率(%)	0.3	0.7
アブヨトウ	中	6月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	早	8月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	期	9月	—	—	—	—	被害株率(%)	—	—
	県全体	6月	0	0	0	3	被害株率(%)	0.0	0.2
	県全体	7月	0	0	0	2	被害株率(%)	0.0	0.3
	県全体	8月	0	0	0	12	被害株率(%)	0.2	0.6
	県全体	9月	0	0	0	13	被害株率(%)	0.3	0.9
	田	6月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	平	8月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	平	9月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	東	6月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	冷	9月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
イネ	志	6月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	榛	8月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	原	9月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	中	6月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	西	8月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	部	9月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	中	6月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	早	8月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	期	9月	—	—	—	—	25株当り発生数	—	—
	県全体	6月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	県全体	7月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	県全体	8月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0
	県全体	9月	0	0	0	0	25株当り発生数	0.0	0.0

イネ (調査点数: 50点, 栽培面積: 15, 000ha (早期面積: 2, 215ha))

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)				調査項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
コブノメイガ	田	6月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	11	被害株率(%)	0.4	1.3
	平	8月	0	33	0	22	被害株率(%)	22.2	28.0
	平	9月	0	0	33	11	被害株率(%)	12.4	17.6
	東	6月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	5	被害株率(%)	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	25	被害株率(%)	1.0	1.7
	冷	9月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	志	6月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	榛	8月	0	13	13	0	被害株率(%)	13.0	23.3
	原	9月	14	14	0	29	被害株率(%)	27.4	37.4
	中	6月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	西	8月	0	0	0	63	被害株率(%)	5.0	6.2
	部	9月	0	0	13	50	被害株率(%)	6.5	8.2
イネニズメ	中	6月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	10	被害株率(%)	0.8	2.4
	早	8月	0	0	10	10	被害株率(%)	4.8	12.0
	期	9月	—	—	—	—	被害株率(%)	—	—
	県全体	6月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	県全体	7月	0	0	0	5	被害株率(%)	0.3	1.3
	県全体	8月	0	9	5	23	被害株率(%)	9.3	19.1
	県全体	9月	3	3	10	18	被害株率(%)	9.1	20.8
	田	6月	20	0	40	100	被害株率(%)	25.6	29.9
	方	7月	0	0	11	33	被害株率(%)	2.7	3.8
	平	8月	0	0	0	11	被害株率(%)	0.4	1.3
	平	9月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	東	6月	13	75	13	0	被害株率(%)	55.0	21.3
	部	7月	0	0	13	38	被害株率(%)	2.5	2.8
	高	8月	0	0	0	13	被害株率(%)	0.5	1.3
	冷	9月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
イネニズメ	志	6月	0	0	20	40	被害株率(%)	3.2	4.7
	太	7月	0	0	0	13	被害株率(%)	0.5	1.3
	榛	8月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	原	9月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	中	6月	0	14	14	43	被害株率(%)	10.3	17.9
	遠	7月	0	0	11	0	被害株率(%)	0.9	2.5
	西	8月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	部	9月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	中	6月	0	0	10	10	被害株率(%)	1.6	4.8
	遠	7月	0	0	0	10	被害株率(%)	0.4	1.2
	早	8月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0
	期	9月	—	—	—	—	被害株率(%)	—	—
	県全体	6月	6	20	17	11	被害株率(%)	19.2	27.3
	県全体	7月	0	0	7	18	被害株率(%)	1.4	2.7
	県全体	8月	0	0	0	5	被害株率(%)	0.2	0.8
	県全体	9月	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0

イネ (調査点数：50点、栽培面積：15,000ha (早期面積：2,215ha))

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率(%)				調査 項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
スクミリンゴガイ	田	6月				20	3		
	方	7月				11	3		
	平	8月				11	0		
	坦	9月				0	0		
	東	6月				0	1		
	部	7月				0	1		
	高	8月				0	1		
	冷	9月				0	0		
	志	6月				40	92		
	太	7月				75	88		
	榛	8月				75	92		
	原	9月				43	77		
	中	6月				57	50		
	遠	7月				56	54		
	西	8月				25	31		
	部	9月				13	22		
イネドロオイムシ	中	6月				50	42		
	遠	7月				40	47		
	早	8月				10	39		
	期	9月				—	—		
	県	6月				34	39		
	全	7月				36	33		
	体	8月				23	39		
		9月				10	26		
	田	6月				—	—		
	方	7月				—	—		
	平	8月				—	—		
	坦	9月				—	—		
	東	6月	0	0	0	0	9	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	22	0.0	0.0
	高	8月				—	—		
	冷	9月				—	—		
イネ	志	6月				—	—		
	太	7月				—	—		
	榛	8月				—	—		
	原	9月				—	—		
	中	6月				—	—		
	遠	7月				—	—		
	西	8月				—	—		
	部	9月				—	—		
	中	6月				—	—		
	遠	7月				—	—		
	早	8月				—	—		
	期	9月				—	—		
	県	6月				—	—		
	全	7月				—	—		
	体	8月				—	—		
		9月				—	—		

イネ (調査点数：50点、栽培面積：15,000ha (早期面積：2,215ha))

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率(%)				調査 項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
フタオビコヤガ	田	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	11	11	2.8	1.3
	平	8月	0	0	0	0	30.0	0.0	0.0
	坦	9月	0	0	0	22	30.0	0.9	1.7
	東	6月	0	0	0	13	13	5.0	1.3
	部	7月	0	0	13	13	25	21.3	8.0
	高	8月	0	0	0	25	25	21.3	15.1
	冷	9月	0	0	0	0	0	26.6	1.7
	志	6月	0	20	0	0	0	12.8	0.0
	太	7月	0	0	0	13	13	4.5	25.6
	榛	8月	0	0	0	13	13	1.3	9.3
	原	9月	0	0	0	0	0	20.3	3.5
	中	6月	0	0	0	29	29	0.5	1.3
	遠	7月	0	0	0	0	0	21.5	0.0
	西	8月	0	0	0	38	38	1.7	2.9
	部	9月	0	0	0	13	13	7.6	7.9
イネ	中	6月	0	0	0	20	20	3.8	1.5
	遠	7月	0	0	0	60	60	17.5	1.9
	早	8月	0	0	0	30	30	25.6	5.5
	期	9月	—	—	—	—	—	32.3	1.3
	県	6月	0	0	0	14	14	6.4	0.8
	全	7月	0	0	2	32	34	17.5	1.6
	体	8月	0	0	0	21	21	19.6	6.0
		9月	0	0	0	8	8	27.7	8.2
	田	6月	0	3	0	14	17	4.2	1.8
	方	7月	0	0	2	32	34	12.3	—
	平	8月	0	0	0	21	21	25.3	10.7
	坦	9月	0	0	0	8	8	1.1	9.7
	東	6月	0	0	0	0	0	0.8	1.6
	部	7月	0	0	0	0	0	0.3	1.1
	高	8月	0	0	0	0	0	0.8	1.6
	冷	9月	0	0	0	0	0	0.3	1.1

※ フタオビコヤガの平年値は、過去8ヵ年 (H28～R5年度) の平均値

コムギ (調査点数: 10点, 栽培面積: 749ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)					調査項目	発生程度		
			甚	多	中	少	計		平均	標準偏差	平年値
さび病	中遠	4月中	0	0	0	0	0	発病株率(%)	0.0	0.0	2.3
		5月中	0	0	0	60	60	発病株率(%)	2.6	3.6	15.1
うどんこ病	中遠	4月中	0	0	0	40	40	発病株率(%)	2.4	3.8	17.7
		5月中	0	0	0	40	40	発病株率(%)	1.0	1.3	20.2
び赤病	中遠	4月中	0	0	0	0	0	発病株率(%)	0.0	0.0	0.0
		5月中	10	20	0	70	100	発病株率(%)	8.7	10.8	3.8
黒穂病	中遠	4月中	0	0	0	0	0	発病株率(%)	0.0	0.0	0.0
		5月中	0	0	0	0	0	発病株率(%)	0.0	0.0	0.0
シラアブ類	中遠	4月中	0	0	0	50	50	寄生株率(%)	3.4	4.7	11.2
		5月中	0	0	0	30	30	寄生株率(%)	1.6	2.8	6.5
バグハエ	中遠	4月中	0	0	0	50	50	寄生株率(%)	1.6	2.0	6.8
		5月中	0	0	0	20	20	寄生株率(%)	1.0	2.4	0.8

2 野菜、花き

カンショ (調査点数(浜松市南部海岸地帯) : 10点、栽培面積 : 516ha)

病害虫名	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度		
		甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値
ハスモンヨトウ	6月中 7月中 8月上	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 0 幼虫数	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
シロイチモジョトウ	6月中 7月中 8月上	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 10 0	10 6 0 幼虫数	0.0 0.1 0.0	0.0 0.3 0.0	0.3 0.1 0.0
ナカジロシタバ	6月中 7月中 8月上	0 0 0	0 0 0	0 0 0	60 0 0	28 20 10 幼虫数	1.2 0.0 0.0	1.2 0.0 0.0	0.4 0.3 0.1
エビガラズズメ	6月中 7月中 8月上	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 4 5 幼虫数	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.1 0.0 0.1
イモキバガ	6月中 7月中 8月上	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 50 13	22 41 63 巻葉数	0.2 1.0 0.1	0.6 1.3 0.3	0.5 1.4 9.7
ヒルガオハモグリ	6月中 7月中 8月上	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 被害葉	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0

パレイショ (調査点数(三方原地帯) : 10点、栽培面積 : 446ha)

病害虫名	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度		
		甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値
疫病	4月 5月 6月	0 0 0	0 0 17	0 0 17	0 0 17	1 13 - 発生株率 (%)	0.0 0.0 24.0	0.0 0.0 32.6	0.0 0.0 -
ウイルス病	4月 5月 6月	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 - 発生株率 (%)	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 -
ニジエウヤホシデントウ	4月 5月 6月	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 - 被害株率 (%)	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 -
ジャガイモガ	4月 5月 6月	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 - 被害株率 (%)	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.1 -
アブラムシ類	4月 5月 6月	17 0 0	0 0 0	0 0 17	0 0 50	56 85 83 寄生株率 (%)	3.1 5.2 23.3	3.1 4.0 32.4	12.2 15.3 -

冬キヤベツ (調査点数(湖西市) : 10点, 栽培面積 : 377ha)

病害 虫名	調査 時期	程度別発生面積率 (%)					調査 項目	発生程度			
		甚	多	中	少	計		平年値	平均	標準偏差	平年値
黒腐病	10月下	0	0	0	0	0	17	発病 株率	0.0	0.0	2.1
	11月中	0	0	0	10	10	19	株率	0.2	0.6	1.9
	12月中	0	0	0	50	50	22	(%)	2.4	4.1	3.6
軟腐病	10月下	0	0	0	0	0	0	発病 株率	0.0	0.0	0.0
	11月中	0	0	0	0	0	1	株率	0.0	0.0	0.1
	12月中	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
菌核病	10月下	0	0	0	0	0	1	発病 株率	0.0	0.0	0.0
	11月中	0	0	0	10	10	8	株率	0.2	0.6	0.2
	12月中	0	0	0	10	10	14	(%)	0.2	0.6	0.4
べと病	10月下	0	0	0	0	0	4	発病 株率	0.0	0.0	0.2
	11月中	0	0	0	0	0	0	株率	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	1	(%)	0.0	0.0	0.0
黒斑病	10月下	0	0	0	0	0	1	発病 株率	0.0	0.0	0.1
	11月中	0	0	0	10	10	3	株率	0.4	1.2	0.2
	12月中	0	0	0	10	10	3	(%)	0.4	1.2	0.3
コナガ	10月下	0	0	0	22	22	2	寄生 株率	0.4	0.8	0.1
	11月中	0	0	0	0	0	4	株率	0.0	0.0	0.1
	12月中	0	0	0	0	0	8	(%)	0.0	0.0	0.2
アブラ ムシ類	10月下	0	0	0	0	0	13	寄生 株率	0.0	0.0	0.9
	11月中	0	0	0	0	0	15	株率	0.0	0.0	0.7
	12月中	0	0	0	0	0	20	(%)	0.0	0.0	0.7
ハスモ ンヨト ウ	10月下	0	0	22	11	33	7	寄生 株率	1.6	2.5	0.5
	11月中	0	0	0	50	50	1	株率	1.0	1.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
シロイ チモジ ヨトウ	10月下	0	0	22	33	56	9	寄生 株率	2.4	2.8	0.5
	11月中	0	0	0	0	0	6	株率	0.0	0.0	0.1
	12月中	0	0	0	0	0	5	(%)	0.0	0.0	0.1
モンシ ロチョ ウ	10月下	0	0	0	0	0	0	寄生 株率	0.0	0.0	0.0
	11月中	0	0	0	0	0	0	株率	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
ヨトウ ガ	10月下	0	0	0	0	0	0	寄生 株率	0.0	0.0	0.0
	11月中	0	0	0	0	0	1	株率	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
タマナ ギンウ ワバ	10月下	0	0	0	33	33	10	寄生 株率	2.4	4.4	0.2
	11月中	0	0	0	20	20	10	株率	0.4	0.8	0.5
	12月中	0	0	0	0	0	11	(%)	0.0	0.0	0.4
オオタ バコガ	10月下	0	0	0	33	33	10	寄生 株率	2.7	4.7	0.6
	11月中	0	0	0	0	0	5	株率	0.0	0.0	0.2
	12月中	0	0	0	20	20	0	(%)	0.4	0.8	0.0

タマネギ (調査点数(浜松市南部海岸地帯) : 10点, 栽培面積 : 326ha)

病害 虫名	調査 時期	程度別発生面積率 (%)				調査 項目	発生程度		
		甚	多	中	少	計	平均	標準偏差	平年値
さび病	11月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	1月中	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.3
	2月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	3月上	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
白色疫 病	11月中	0	0	10	20	30	1.2	2.0	2.1
	12月中	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.1
	1月中	0	0	0	0	18	0.0	0.0	1.0
	2月中	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.2
	3月上	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.1
べと病	11月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.1
	1月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	2月中	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.2
	3月上	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
ボトリ チス葉 枯病	11月中	0	0	0	10	10	0.4	1.2	0.0
	12月中	0	0	0	0	9	0.0	0.0	0.5
	1月中	0	0	0	20	16	7.0	17.4	1.0
	2月中	0	0	0	11	16	1.8	5.0	1.1
	3月上	0	0	0	33	21	6.3	10.4	5.4
腐敗病	11月中	0	0	0	80	80	19.2	13.5	0.1
	12月中	0	0	0	40	11	2.0	2.8	0.6
	1月中	0	0	0	20	23	1.2	2.6	1.2
	2月中	0	0	0	11	20	0.2	0.6	1.5
	3月上	0	0	0	17	46	1.0	2.2	5.3
灰色腐 敗病	11月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	1月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	2月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	3月上	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
シロイ チモジ ヨトウ	11月中	0	0	0	30	18	0.6	0.9	0.4
	12月中	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.1
	1月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	2月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	3月上	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
ネギハ モグリ バエ	11月中	0	0	0	0	40	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	10	7	0.4	1.2	0.2
	1月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	2月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	3月上	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
ネギア ザミウ マ	11月中	0	0	0	10	71	0.2	0.6	19.7
	12月中	0	0	0	40	84	2.2	3.2	27.6
	1月中	0	0	0	40	79	1.4	2.0	27.8
	2月中	0	0	0	33	91	1.3	2.1	32.0
	3月上	0	0	0	83	93	5.7	4.4	40.1

病害 虫名	調査 時期	程度別発生面積率 (%)				調査 項目	発生程度	
		甚	多	中	少	計	平均	標準偏差
アブラ ムシ類	11月中	0	0	0	0	5	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	1月中	0	0	0	0	3	0.0	0.1
	2月中	0	0	0	0	3	0.0	0.0
	3月上	0	0	0	0	0	0.0	0.0

秋冬ネギ（シロネギ）（調査点数(天竜川周辺地域):10点, 栽培面積, :293ha)

病害 虫名	調査 時期	程度別発生面積率(%)				調査 項目	発生程度		
		甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値
さび病	8月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	9月中	0	0	0	10	1	0.4	1.2	0.0
	10月中	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.1
	11月中	0	0	0	0	10	0.0	0.0	1.3
	12月中	0	0	0	10	19	0.2	0.6	3.4
萎縮病	8月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	9月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	10月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	11月中	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
黒斑病	8月中	0	0	0	0	33	0.0	0.0	3.5
	9月中	0	0	0	30	50	0.8	1.3	4.8
	10月中	0	0	0	20	50	1.0	2.0	3.8
	11月中	0	0	0	40	48	1.4	2.4	3.3
	12月中	0	0	0	40	28	0.8	1.0	1.8
疫病	8月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	9月中	0	0	0	0	1	0.0	0.0	1.0
	10月中	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.8
	11月中	0	0	0	0	5	0.0	0.0	0.1
	12月中	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
べと病	8月中	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
	9月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	10月中	0	0	0	0	5	0.0	0.0	0.3
	11月中	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.1
	12月中	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.5
アブラムシ類	8月中	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0
	9月中	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.0
	10月中	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0
	11月中	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0
ネギハモグリバエ	8月中	0	0	14.29	42.86	57.14	8.6	9.4	28.0
	9月中	10	0	10	20	92	6.8	19.7	40.6
	10月中	30	20	10	40	100	39.4	37.5	44.5
	11月中	0	0	10	70	80	7.8	7.6	23.5
	12月中	0	0	0	50	23	2.6	3.5	1.5
ヨトウガ	8月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	9月中	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.1
	10月中	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.2
	11月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
シロイチモジヨトウ	8月中	0	0	0	85.71	85.71	4.9	3.2	1.4
	9月中	0	0	0	20	35	1.0	2.4	1.6
	10月中	0	0	0	60	25	2.8	3.1	1.2
	11月中	0	0	10	20	8	1.8	4.1	0.2
	12月中	0	0	0	0	2.2222	0.0	0.0	0.1

病害 虫名	調査 時期	程度別発生面積率(%)				調査 項目	発生程度		
		甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値
ハスモンヨトウ	8月中	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.2
	9月中	0	0	0	10	4	0.2	0.6	0.1
	10月中	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0
	11月中	0	0	0	10	2	0.6	1.8	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
ネギアザミウマ	8月中	14.29	14.29	28.57	85.71	65	31.4	31.3	22.0
	9月中	10	0	0	30	66	8.0	22.0	13.5
	10月中	10	0	0	40	66	12.2	26.6	12.8
	11月中	0	0	10	70	66	8.2	9.7	12.8
	12月中	0	0	0	30	58	1.6	2.5	9.0

イチゴ（調査点数：30点、栽培面積：293ha）

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率（％）					発生程度	
			甚	多	中	少	計	平年値	調査項目
灰色かび病	東部	10月	0	0	0	0	0	0	0.0
		11月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中部	1月	0	0	0	0	0	0	0.0
		2月	0	0	0	0	0	0	0.0
		3月	0	0	0	0	0	0	0.0
	西部	10月	0	0	0	0	0	0	0.0
		11月	0	0	0	0	0	0	0.0
		12月	0	0	0	0	0	0	0.0
	県	1月	0	0	0	0	0	0	0.0
		2月	0	0	0	0	0	0	0.0
		3月	0	0	0	0	0	0	0.0
うどんこ病	東部	10月	0	0	0	0	0	0	0.0
		11月	0	0	0	0	0	0	0.0
		12月	0	0	0	0	0	0	0.0
	中部	1月	0	0	0	0	0	0	0.0
		2月	0	0	0	0	0	0	0.0
		3月	0	0	0	0	0	0	0.0
	西部	10月	0	0	0	0	0	0	0.0
		11月	0	0	0	0	0	0	0.0
		12月	0	0	0	0	0	0	0.0
	県	1月	0	0	0	0	0	0	0.0
		2月	0	0	0	0	0	0	0.0
		3月	0	0	0	0	0	0	0.0

イチゴ（調査点数：30点、栽培面積：293ha）

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率（％）					発生程度	
			甚	多	中	少	計	平年値	調査項目
炭疽病	東部	10月	0	0	0	0	0	0	0.2
		11月	0	0	0	0	0	0	0.6
		12月	0	0	0	0	0	0	1.3
	中部	1月	0	0	0	0	0	0	1.2
		2月	0	0	0	0	0	0	3.6
		3月	0	0	0	0	0	0	1.8
	西部	10月	0	0	0	0	0	0	1.8
		11月	0	0	0	0	0	0	3.0
		12月	0	0	0	0	0	0	6.0
	県	1月	0	0	0	0	0	0	2.8
		2月	0	0	0	0	0	0	4.0
		3月	0	0	0	0	0	0	0.5
角斑細菌病	東部	10月	0	0	0	0	0	0	0.0
		11月	0	0	0	0	0	0	0.0
		12月	0	0	0	0	0	0	0.0
	中部	1月	0	0	0	0	0	0	0.0
		2月	0	0	0	0	0	0	0.0
		3月	0	0	0	0	0	0	0.0
	西部	10月	0	0	0	0	0	0	0.0
		11月	0	0	0	0	0	0	0.0
		12月	0	0	0	0	0	0	0.0
	県	1月	0	0	0	0	0	0	0.0
		2月	0	0	0	0	0	0	0.0
		3月	0	0	0	0	0	0	0.0

イチゴ（調査点数：30点、栽培面積：293ha）

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率（％）					発生程度	
			甚	多	中	少	計	平均	標準偏差
アブラムシ類	東 部	10月	0	0	0	10	10	1.0	3.0
		11月	0	0	0	30	30	0.8	1.3
		12月	0	0	0	10	10	0.8	2.4
	中 部	1月	0	0	0	20	20	2.0	4.4
		2月	0	0	0	10	10	0.2	0.6
		3月	0	0	0	10	10	0.2	0.6
	西 部	10月	0	0	0	80	80	6.8	6.1
		11月	0	0	0	30	30	2.2	3.9
		12月	0	0	0	20	20	2.0	4.8
	県	1月	0	0	0	40	40	2.6	3.7
		2月	0	0	10	20	30	6.8	12.9
		3月	0	0	0	60	60	5.4	7.5
ハダニ類	東 部	10月	0	0	11	56	67	8.2	13.1
		11月	0	0	10	40	50	5.6	11.1
		12月	0	0	0	30	30	0.8	1.3
	中 部	1月	0	0	0	30	30	1.0	1.8
		2月	0	0	0	0	0	0.0	0.9
		3月	0	0	0	20	20	1.0	2.4
	西 部	10月	0	0	3	48	52	5.2	8.9
		11月	0	0	3	33	37	2.9	3.0
		12月	0	0	0	20	20	1.2	3.2
	県	1月	0	0	0	30	30	1.9	3.5
		2月	0	0	3	10	13	2.3	8.1
		3月	0	0	0	30	30	2.2	5.1
イチゴ（調査点数：30点、栽培面積：293ha）	東 部	10月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月	10	10	20	0	40	6.0	9.9
		12月	20	20	10	0	50	16.6	23.4
	中 部	1月	10	20	0	30	60	7.4	11.4
		2月	0	10	10	30	51	2.6	5.9
		3月	0	10	20	0	30	4.4	8.0
	西 部	10月	10	20	30	10	70	11.6	16.5
		11月	20	10	20	10	60	13.0	20.2
		12月	10	40	0	90	75	16.8	15.9
	県	1月	20	50	10	0	80	19.8	18.9
		2月	30	20	10	10	70	26.6	33.2
		3月	40	0	20	10	70	31.4	36.8

イチゴ（調査点数：30点、栽培面積：293ha）

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率（％）					発生程度	
			甚	多	中	少	計	平均	標準偏差
ハスモンヨトウ	東 部	10月	0	0	0	10	10	0.2	0.6
		11月	0	0	0	20	20	0.4	0.8
		12月	0	0	0	0	0	0.0	0.3
	中 部	1月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	西 部	10月	0	0	0	50	50	6.0	8.6
		11月	0	0	0	30	30	1.2	2.4
		12月	0	0	0	10	10	0.2	0.6
	県	1月	0	0	0	10	10	0.2	0.6
		2月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
アザミウマ類	東 部	10月	0	0	0	28	28	2.3	5.8
		11月	0	0	0	23	23	0.7	1.8
		12月	0	0	0	10	10	0.3	0.9
	中 部	1月	0	0	0	7	7	0.1	0.5
		2月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	西 部	10月	0	0	0	30	30	2.0	3.1
		11月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月	0	0	0	60	70	7.4	13.1
	県	1月	0	0	0	80	80	5.2	4.7
		2月	0	0	0	20	20	1.6	3.2
		3月	0	0	0	40	60	9.4	15.3

イチゴ（調査点数：30点、栽培面積：293ha）

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率 (%)					調査 項目	発 生 程 度		
			甚	多	中	少	計		平均	標準偏差	
コナジラミ類	東 部	10月	0	0	0	40	40	40	2.6	3.9	3.2
		11月	0	0	0	20	20	31	1.2	3.0	2.3
		12月	0	0	10	0	10	33 寄生株 率(%)	3.0	9.0	1.9
	中 部	1月	0	0	0	20	20	38	2.0	5.4	2.4
		2月	0	0	10	10	20	40	4.0	11.3	4.2
		3月	10	0	0	20	30	40	8.4	22.6	5.2
	西 部	10月	0	0	0	90	90	60	11.4	7.3	7.1
		11月	0	0	11	56	67	53 寄生株 率(%)	9.1	10.3	4.8
		12月	0	0	10	30	40	38	5.8	12.9	4.2
	県	1月	0	0	0	10	20	30	4.6	10.7	2.5
		2月	0	0	0	10	0	24	4.4	13.2	4.1
		3月	10	0	0	10	20	18	8.0	23.3	6.0
		10月	0	0	11	89	100	66	12.3	14.6	7.9
		11月	0	10	40	30	80	66	24.6	21.5	10.6
		12月	10	0	10	50	70	74 寄生株 率(%)	16.2	24.4	12.4
		1月	0	0	10	70	80	72	9.4	10.2	13.9
		2月	0	10	10	60	80	65	16.2	18.2	15.9
		3月	10	10	20	30	70	77	22.2	27.0	20.3
		10月	0	0	3	72	76	57	8.7	10.5	6.4
		11月	0	3	17	34	55	50	11.7	17.1	5.9
		12月	3	0	10	27	40	48 寄生株 率(%)	8.3	17.7	6.2
		1月	0	0	7	37	43	46	5.3	9.6	6.3
		2月	0	3	10	23	37	43	8.2	15.6	8.1
		3月	10	3	7	20	40	46	12.9	25.3	10.5

秋冬ダイコン（調査点数：10点，栽培面積：460ha）

病害虫名	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度	
		甚	多	中	少		平均	標準偏差
モザイク病	10月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	11月下	0	0	0	0	14	0.0	0.0
	12月下	0	0	0	11	19	0.4	1.3
	1月下	0	0	0	0	21	0.0	0.0
黒腐病	10月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	11月下	0	0	0	0	3	0.0	0.0
	12月下	0	0	0	0	5	0.0	0.0
	1月下	0	0	0	0	7	0.0	0.0
白さび病	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	11月下	0	0	0	0	5	0.0	0.0
	12月下	0	0	0	0	33	0.0	0.0
	1月下	0	0	0	0	46	0.0	0.0
黒斑細菌病	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	11月下	0	0	0	11	5	1.1	3.1
	12月下	0	0	0	0	15	0.0	0.0
	1月下	0	0	0	29	35	2.6	5.5
アブラムシ類	10月下	0	0	0	0	6	0.0	0.0
	11月下	0	0	0	11	11	0.2	0.6
	12月下	0	11	11	56	20	24.9	30.4
	1月下	14	14	14	57	33	39.7	34.5
コナガ	10月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
	11月下	0	0	0	0	4	0.0	0.0
	12月下	0	0	0	22	16	1.1	2.1
	1月下	0	0	0	0	14	0.0	0.0

冬レタス (調査点数: 20点, 栽培面積: 802ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)				調査項目	発生程度				
			甚	多	中	少		計	平年値	平均	標準偏差	平年値
灰色かび病	榛原	10月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	
		1月下	0	0	0	0	0	14	0.0	0.0	0.0	
	2月下	—	—	—	—	—	14	—	—	0.5		
	森	10月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		1月下	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	
	2月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	県全体	10月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	
		1月下	0	0	0	0	0	14	0.0	0.0	0.5	
菌核病	榛原	10月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	33	33	13	1.7	2.9	0.5	
		1月下	0	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	
	2月下	—	—	—	—	—	7	—	—	0.1		
	森	10月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		1月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	2月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	県全体	10月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	14	14	7	0.7	2.1	0.3	
		1月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
2月下	—	—	—	—	—	7	—	—	0.1			
すそ枯病	榛原	10月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.1	
		12月下	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	
		1月下	0	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.0	
	2月下	—	—	—	—	—	6	—	—	0.4		
	森	10月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	
		1月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	2月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	県全体	10月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.1	
		12月下	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	
		1月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
2月下	—	—	—	—	—	6	—	—	0.4			

冬レタス (調査点数: 20点, 栽培面積: 802ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)				調査項目	発生程度			
			甚	多	中	少		計	平均	標準偏差	平年値
萎黄病	榛原	10月下	0	0	0	0	0	発病株率(%)	0.0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
	森	2月下	—	—	—	—	0	—	—	0.0	
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	県全体	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		2月下	—	—	—	—	0	—	—	0.0	
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
モザイク病	榛原	12月下	0	0	0	0	0	発病株率(%)	0.0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	0		—	—	0.0
		10月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
	森	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		2月下	—	—	—	—	0	—	—	0.0	
	県全体	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
ビツグベイン病	榛原	2月下	—	—	—	—	0	発病株率(%)	—	—	0.0
		10月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	3		0.0	0.0	0.1
		12月下	0	0	0	0	18		0.0	0.0	1.1
	森	1月下	0	0	0	0	26	0.0	0.0	3.8	
		2月下	—	—	—	—	26	—	—	3.6	
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	県全体	12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		1月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.1	
		2月下	—	—	—	—	—	—	—	—	
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
森	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0		
	12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0		
	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0		
	2月下	—	—	—	—	—	—	—	—		
県全体	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0		
	11月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.1		
	12月下	0	0	0	0	9	0.0	0.0	0.5		
	1月下	0	0	0	0	16	0.0	0.0	1.9		
2月下	—	—	—	—	26	—	—	3.6			

冬レタス (調査点数: 20点, 栽培面積: 802ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度		平年値	
			甚	多	中	少		計	平均		標準偏差
斑点細菌病	榛原	10月下	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	5		0.0	0.0	0.2
		1月下	0	0	0	0	8		0.0	0.0	1.9
	2月下	—	—	—	—	13	—	—	3.1		
	森	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.1	
		12月下	0	0	0	0	10	0.0	0.0	1.2	
1月下		0	0	0	0	16	0.0	0.0	2.1		
2月下	—	—	—	—	—	—	—	—			
軟腐病	県全体	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.1	
		12月下	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.7	
		1月下	0	0	0	0	12	0.0	0.0	2.0	
	2月下	—	—	—	—	13	—	—	3.1		
	榛原	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.1	
		12月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	
1月下		0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0		
2月下	—	—	—	—	—	—	—	0.0			
腐敗病	森	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	2月下	—	—	—	—	—	—	—	—		
	県全体	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	
1月下		0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0		
2月下	—	—	—	—	2	—	—	0.0			
腐敗病	榛原	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	0	6	0.0	0.0	1.0	
		1月下	0	0	0	0	5	0.0	0.0	0.3	
	2月下	—	—	—	—	15	—	—	0.8		
	森	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.1	
		12月下	0	0	0	13	8	0.5	1.3	0.3	
1月下		0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.1		
2月下	—	—	—	—	—	—	—	—			
県全体	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0		
	11月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0		
	12月下	0	0	0	7	7	0.3	1.0	0.6		
	1月下	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.2		
2月下	—	—	—	—	15	—	—	0.8			

冬レタス (調査点数: 20点, 栽培面積: 802ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度		平年値	
			甚	多	中	少		計	平均		標準偏差
べと病	榛原	10月下	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	10	10		0.8	2.4	0.0
		12月下	0	0	0	0	4		0.0	0.0	1.1
		1月下	0	0	0	0	14		0.0	0.0	1.1
	2月下	—	—	—	—	—	14	—	—	1.7	
	森	10月下	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.4
		12月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.7
1月下		0	0	0	0	0	0.0		0.0	1.7	
2月下	—	—	—	—	—	12	—	—	—		
ハスモンヨトウ	県全体	10月下	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	5	5		0.4	1.7	0.2
		12月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.9
		1月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	1.5
	2月下	—	—	—	—	—	14	—	—	1.7	
	榛原	10月下	0	0	0	38	38	寄生株率 (%)	1.5	2.6	0.0
		11月下	0	0	10	40	50		2.4	4.6	0.1
		12月下	0	0	0	17	17		0.3	0.7	0.0
1月下		0	0	0	0	0	0.0		0.0	0.0	
2月下	—	—	—	—	—	0	—	—	0.0		
森	10月下	0	0	33	33	67	寄生株率 (%)	8.4	6.0	0.0	
	11月下	0	0	0	10	10		0.2	0.6	0.1	
	12月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	
	1月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	
2月下	—	—	—	—	—	0	—	—	—		
アブラムシ類	県全体	10月下	0	0	18	35	53	寄生株率 (%)	5.2	5.9	0.0
		11月下	0	0	5	25	30		1.3	3.5	0.1
		12月下	0	0	0	7	7		0.1	0.5	0.0
		1月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
	2月下	—	—	—	—	—	0	—	—	0.0	
	榛原	10月下	0	0	0	0	0	寄生株率 (%)	0.0	0.0	0.0
		11月下	0	0	10	0	10		3.2	9.6	1.0
		12月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.7
1月下		0	0	0	0	0	0.0		0.0	0.1	
2月下	—	—	—	—	—	0	—	—	0.0		
森	10月下	0	0	0	0	0	寄生株率 (%)	0.0	0.0	0.0	
	11月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	
	12月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	
	1月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.1	
2月下	—	—	—	—	—	4	—	—	—		
県全体	10月下	0	0	0	0	0	寄生株率 (%)	0.0	0.0	0.0	
	11月下	0	0	5	0	5		1.6	7.0	0.5	
	12月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	
	1月下	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.1	
2月下	—	—	—	—	—	0	—	—	0.0		

冬害トマト (調査点数：20点，栽培面積：164ha)

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率 (%)				調査 項目	発生程度	
			甚	多	中	少	計	平均	標準偏差
疫病	志太	9月下	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	2	0.0	0.3
	中遠	1月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	1	0.0	0.2
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東部	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	3	0.0	0.2
		1月下	0	0	0	0	4	0.0	0.3
	県全体	2月下	0	0	0	0	2	0.0	0.1
		3月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	—	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	—	0.0	—
灰色かび病	志太	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	8	0.0	1.2
		1月下	0	0	0	0	14	0.0	3.9
		2月下	0	0	0	20	29	0.8	1.6
	中遠	3月下	0	0	0	20	53	4.4	11.9
		9月下	0	11	11	0	22	16.0	29.9
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	1	0.0	0.1
	東部	12月下	0	0	0	0	1	0.0	0.5
		1月下	0	0	0	0	13	0.0	1.6
		2月下	0	0	0	20	21	0.8	1.6
		3月下	0	0	0	20	24	0.8	1.8
	県全体	9月下	0	0	0	10	10	0.4	1.2
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	—	0.0	—
		12月下	0	0	0	0	—	0.0	—

冬害トマト (調査点数：20点，栽培面積：164ha)

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率 (%)				調査 項目	発生程度	
			甚	多	中	少	計	平均	標準偏差
モザイク病	志太	9月下	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中遠	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東部	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	県全体	2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
輪紋病	志太	11月下	—	—	—	—	—	—	—
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	3	0.0	1.2
	中遠	3月下	0	0	0	0	6	0.0	0.4
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.2
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東部	12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	県全体	9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.1
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0

冬春トマト (調査点数: 20点, 栽培面積: 164ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)					調査項目	発生程度		
			甚	多	中	計			平均	標準偏差	
						少	年平値				
黄化葉巻病	志太	9月下半	—	—	—	—	33	24	—	—	—
		10月下半	0	0	0	22	22	24	2.0	3.7	—
		11月下半	0	0	0	22	22	24	2.7	5.0	5.7
	中遠	12月下半	0	0	10	10	20	23	2.8	7.2	8.6
		1月下半	0	0	10	10	20	31	2.6	7.2	8.6
		2月下半	0	0	0	50	50	20	2.2	4.0	5.6
	東部	3月下半	0	0	0	22	22	14	0.4	0.8	4.3
		9月下半	0	0	0	13	13	6	0.3	0.7	5.8
		10月下半	0	0	0	22	22	53	2.0	4.0	16.5
	東部	11月下半	0	0	0	22	22	59	1.1	2.5	14.8
		12月下半	0	0	0	25	25	48	2.3	4.2	16.0
		1月下半	0	0	0	0	0	39	0.0	0.0	10.2
黄化葉巻病	県全体	2月下半	0	0	0	0	0	29	0.0	0.0	6.8
		3月下半	0	0	0	0	0	25	0.0	0.0	6.1
		9月下半	0	0	0	38	38	—	1.0	1.4	—
	志太	10月下半	0	0	0	50	50	—	3.3	3.9	—
		11月下半	0	0	0	38	38	—	3.8	5.2	—
		12月下半	0	13	0	25	38	—	8.3	18.2	—
	中遠	1月下半	0	13	0	50	63	—	8.0	14.1	—
		2月下半	0	13	13	25	50	—	14.0	19.1	—
		3月下半	0	10	10	50	70	—	15.5	21.0	—
	東部	9月下半	0	0	0	25	25	29	0.6	1.2	5.3
		10月下半	0	0	0	35	35	41	2.4	3.9	11.6
		11月下半	0	0	0	27	27	41	2.5	4.5	10.3
黄化葉巻病	志太	12月下半	0	4	4	19	27	36	4.3	11.6	12.1
		1月下半	0	4	4	18	25	37	3.2	9.2	9.7
		2月下半	0	4	4	25	32	26	4.8	3.1	6.5
	中遠	3月下半	0	4	4	19	26	20	4.7	0.6	5.8
		9月下半	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10月下半	0	0	0	0	0	26	0.0	0.0	0.8
	東部	11月下半	0	0	0	44	44	28	1.1	1.4	1.6
		12月下半	0	0	0	10	10	43	0.6	1.8	3.4
		1月下半	0	0	0	0	0	35	0.0	0.0	1.9
	県全体	2月下半	0	0	0	0	0	37	0.0	0.0	1.9
		3月下半	0	0	0	0	0	34	0.0	0.0	2.0
		9月下半	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.7
黄化葉巻病	志太	10月下半	0	0	0	11	11	18	0.2	0.6	1.0
		11月下半	0	0	0	11	11	19	0.2	0.6	1.3
		12月下半	0	0	0	13	13	29	0.3	0.7	1.6
	中遠	1月下半	0	0	0	10	10	28	0.8	2.4	2.4
		2月下半	0	0	0	10	10	21	0.8	2.4	1.6
		3月下半	0	0	0	10	10	18	0.4	1.2	1.4
	東部	9月下半	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		10月下半	0	0	0	13	13	—	0.3	0.7	—
		11月下半	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
	県全体	12月下半	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		1月下半	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		2月下半	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
黄化葉巻病	志太	3月下半	0	0	0	10	10	—	0.0	0.0	—
		9月下半	0	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.7
		10月下半	0	0	0	9	9	20	0.2	0.6	1.0
	中遠	11月下半	0	0	0	19	19	21	0.5	1.0	1.4
		12月下半	0	0	0	8	8	36	0.3	1.2	2.5
		1月下半	0	0	0	4	4	31	0.3	1.5	2.2
	東部	2月下半	0	0	0	4	4	29	0.3	1.7	1.8
		3月下半	0	0	0	4	4	25	0.0	0.9	1.7
		9月下半	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
	県全体	10月下半	0	0	0	13	13	—	0.3	0.7	—
		11月下半	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		12月下半	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—

冬巻トマト (調査点数：20点、栽培面積：164ha)

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率(%)				調査 項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
うどんこ病	志太	9月下	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	—	—	—	—	—	—	—
		11月下	0	11	0	11	7 発病株率	0.7	1.9
		12月下	0	0	0	10	18 株率 (%)	0.8	2.4
	中遠	1月下	0	10	0	20	30 20	6.2	15.5
		2月下	10	0	0	10	20 17	10.0	27.4
		3月下	0	0	0	11	12	0.2	0.6
		3月下	—	—	—	—	—	—	—
	東部	9月下	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	—	—	—	—	—	—	—
		11月下	0	0	0	0	17 発病株率	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	27 株率 (%)	0.0	0.0
	県全体	1月下	0	10	10	20	35 10.7	10.8	22.5
		2月下	0	0	10	20	27 6.5	5.0	10.3
		3月下	0	0	0	20	28 8.4	1.6	4.2
		3月下	—	—	—	—	—	—	—
アブラムシ類	志太	9月下	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	—	—	—	—	—	—	—
		11月下	4	4	0	0	13 発病株率	11.3	29.8
		12月下	0	0	0	38	38 3.5	2.3	3.5
	中遠	1月下	0	0	0	38	38 1.8	2.7	2.7
		2月下	0	0	0	50	50 7.8	6.3	7.8
		3月下	10	0	0	60	70 25.1	13.3	25.1
		3月下	—	—	—	—	—	—	—
	東部	9月下	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	—	—	—	—	—	—	—
		11月下	0	0	0	0	8 13 発病株率	3.7	17.3
		12月下	0	0	0	15	23 4.6	1.0	2.6
	県全体	1月下	0	7	4	18	29 6.9	6.6	16.8
		2月下	4	0	4	25	32 5.6	7.1	20.9
		3月下	4	0	0	22	26 5.9	4.6	3.1
		3月下	—	—	—	—	—	—	—
ハダニ類	志太	9月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	1 1 寄生株率	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	1 0	0.0	0.0
	中遠	1月下	0	0	0	0	2 0.3	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	4 0.1	0.0	0.0
		3月下	—	—	—	—	—	—	—
	東部	9月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0 1 寄生株率	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	1 0	0.0	0.0
	県全体	1月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
		3月下	—	—	—	—	—	—	—
コナジラミ類	志太	9月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0 1 寄生株率	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
	中遠	1月下	0	0	0	0	0 1	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	1 0	0.0	0.0
		3月下	—	—	—	—	—	—	—
	東部	9月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0 1 寄生株率	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
	県全体	1月下	0	0	0	0	0 1	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0 1	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	1 1	0.0	0.0
		3月下	—	—	—	—	—	—	—

冬巻トマト (調査点数：20点、栽培面積：164ha)

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率(%)				調査 項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
コナジラミ類	志太	9月下	—	0	—	—	63	—	—
		10月下	0	0	17	83	100	23.0	14.6
		11月下	0	0	22	67	89	22.7	19.9
		12月下	0	0	0	60	60	11.6	15.3
	中遠	1月下	0	0	10	50	60	13.0	12.5
		2月下	0	0	10	60	70	13.4	17.2
		3月下	0	0	11	67	78	18.1	9.1
		3月下	—	—	—	—	—	13.8	19.7
	東部	9月下	0	0	13	38	50	11.5	15.9
		10月下	0	0	22	56	78	17.3	19.1
		11月下	0	0	11	56	67	17.1	19.7
		12月下	0	0	13	50	63	10.3	13.2
	県全体	1月下	0	0	0	30	30	4.4	10.7
		2月下	0	0	0	50	50	4.8	8.2
		3月下	0	0	0	30	30	4.8	9.2
		3月下	—	—	—	—	—	13.3	21.9
ハダニ類	志太	9月下	0	0	0	0	40	8.3	12.4
		10月下	0	0	17	70	87	17.0	17.2
		11月下	0	0	12	69	81	16.8	17.7
		12月下	0	0	4	62	65	10.0	12.7
	中遠	1月下	0	0	4	46	50	7.0	13.0
		2月下	0	0	4	54	57	8.2	14.7
		3月下	0	0	7	44	52	10.3	15.8
		3月下	—	—	—	—	—	—	—
	東部	9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	1 1 寄生株率	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
	県全体	1月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	1 0	0.0	0.1
		3月下	0	0	0	0	1 0	0.0	0.0
		3月下	—	—	—	—	—	—	—
コナジラミ類	志太	9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	2 2 寄生株率	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0 1	0.0	0.0
	中遠	1月下	0	0	0	0	0 1	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	1 0	0.0	0.0
		3月下	—	—	—	—	—	—	—
	東部	9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0 1 寄生株率	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0 0	0.0	0.0
	県全体	1月下	0	0	0	0	0 1	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0 1	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	1 1	0.0	0.0
		3月下	—	—	—	—	—	—	—

冬害トマト (調査点数：20点、栽培面積：164ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)				調査項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
ハスモンヨトウ	志太	9月下	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	0	0	0	0	寄生株率	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	33	2	1.3	2.5
		12月下	0	0	0	0	3	0.0	0.0
	中遠	1月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	10	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.2	0.6
		9月下	0	0	0	13	0	0.3	0.7
	東部	10月下	0	0	0	44	4	3.8	4.8
		11月下	0	0	0	22	4	0.7	1.3
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ハモグリバエ類	志太	2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	13	—	0.0	0.0
	中遠	11月下	0	0	0	0	—	0.5	1.3
		12月下	0	0	0	0	—	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	—	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	—	0.0	0.0
	東部	3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ハモグリバエ類	志太	12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中遠	9月下	0	0	0	6	6	0.1	0.5
		10月下	0	0	0	22	4	1.7	3.6
		11月下	0	0	0	19	2	0.7	1.7
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東部	1月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	4	4	0.1	0.4
ハモグリバエ類	志太	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中遠	2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東部	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ハモグリバエ類	志太	3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中遠	12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東部	9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ハモグリバエ類	志太	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中遠	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東部	2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ハモグリバエ類	志太	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中遠	3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東部	12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ハモグリバエ類	志太	9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中遠	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東部	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ハモグリバエ類	志太	2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中遠	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東部	3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ハモグリバエ類	志太	12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中遠	9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東部	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ハモグリバエ類	志太	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中遠	2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東部	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ハモグリバエ類	志太	3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中遠	12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東部	9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ハモグリバエ類	志太	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中遠	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	東部	2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0

キク (調査点数(浜松市、湖西市): 10点、栽培面積: 149a)

被害 病虫名	調査 時期	程度別発生面積率 (%)					調査 項目	発生程度			
		甚	多	中	少	計		年平値	平均	標準偏差	年平値
ハダニ 類	5月下	0	0	14	14	29	12	10寒	1.1	2.4	0.4
	6月下	0	22	11	0	33	39	雌寄	5.9	9.6	2.4
	7月下	63	13	13	13	100	48	生数	13.2	13.7	3.5
アザミ ウマ類	8月中	0	25	50	25	100	75	(頭)	6.9	3.7	4.2
	5月下	0	14	29	14	57	60	被害	10.9	13.6	11.2
	6月下	11	11	0	22	44	45	株率	16.4	32.2	17.1
アブラ ムシ類	7月下	25	0	0	13	38	49	(%)	21.8	36.1	16.4
	8月中	25	0	0	0	25	45		25.0	43.3	14.8
	5月下	0	0	0	0	0	11	寄生	0.0	0.0	1.0
マメハ モグリ ノエ	6月下	0	0	0	0	0	11	株率	0.0	0.0	1.6
	7月下	0	0	0	0	0	3	(%)	0.0	0.0	0.1
	8月中	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
カスミ カメム シ類	5月下	0	0	0	0	0	0	被害	0.0	0.0	0.0
	6月下	0	0	0	0	0	0	株率	0.0	0.0	0.0
	7月下	0	0	0	0	0	2	(%)	0.0	0.0	0.0
ツバキ 食害	8月中	0	0	0	0	0	3		0.0	0.0	0.1
	5月下	0	0	0	0	0	0	被害	0.0	0.0	0.1
	6月下	0	0	0	11	11	4	株率	0.2	0.6	0.1
ツバキ 食害	7月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
	8月中	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
	5月下	0	0	0	0	0	19	被害	0.0	0.0	1.1
アワダ チソウ グンバ イ	6月下	0	0	0	0	16	株率	(%)	0.0	0.0	0.5
	7月下	0	0	0	25	25	17	(%)	0.5	0.9	1.7
	8月中	0	0	0	0	0	19		0.0	0.0	0.4
アワダ チソウ グンバ イ	5月下	0	0	0	0	0	0	被害	0.0	0.0	0.0
	6月下	0	0	0	0	0	0	株率	0.0	0.0	0.0
	7月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
アワダ チソウ グンバ イ	8月中	0	0	0	0	0	3		0.0	0.0	0.1

※平年値は過去5カ年の平均値

3 チヤ

チヤ (調査点数：50点， 栽培面積：13,300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	調査項目	程度別発生面積率 (%)				発生程度	
				甚	多	中	少	平均	標準偏差
				計	平年値	計	平年値	平均	標準偏差
輪 斑 病	富士山麓	3月		0	0	0	40	1.9	3.4
		5月		0	0	0	0	0.0	0.1
		6月	病葉数	0	0	20	20	1.8	5.1
		7月	/1.25 m ²	0	10	40	50	10.5	18.1
		8月	m ²	0	0	40	40	5.8	13.7
	静岡市北部	9月		0	0	0	40	3.9	8.8
		10月		0	0	0	40	4.7	8.8
		3月		0	0	0	60	4.8	9.1
		5月		0	0	0	0	0.0	0.0
		6月	病葉数	0	0	40	40	3.7	4.6
輪 斑 病	牧之原	7月	/1.25 m ²	0	0	70	70	7.9	9.7
		8月	m ²	0	0	50	50	2.4	4.5
		9月		0	0	60	60	1.1	1.0
		10月		0	0	40	40	1.3	1.7
		3月		0	0	70	70	1.0	0.9
	小笠・磐田原	5月		0	0	0	0	0.0	0.0
		6月	病葉数	0	0	70	70	2.5	2.5
		7月	/1.25 m ²	0	0	60	60	5.6	9.8
		8月	m ²	0	0	40	40	2.3	3.8
		9月		0	0	60	60	2.1	2.1
輪 斑 病	川根地域	10月		0	0	50	50	2.0	2.9
		3月		0	0	60	60	1.5	1.9
		5月		0	0	0	0	0.0	0.0
		6月	病葉数	0	0	70	70	6.4	7.8
		7月	/1.25 m ²	0	0	70	70	13.1	19.9
	県全体	8月	m ²	0	0	60	60	4.7	8.8
		9月		0	0	90	90	4.2	3.3
		10月		0	0	60	60	2.8	3.6
		3月		0	0	70	70	2.2	2.1
		5月		0	0	0	0	0.0	0.0
輪 斑 病	川根地域	6月	病葉数	0	0	70	70	2.3	2.1
		7月	/1.25 m ²	0	0	60	60	12.3	16.7
		8月	m ²	0	0	50	50	1.0	1.3
		9月		0	0	50	50	3.6	7.3
		10月		0	0	80	80	3.8	6.1
	県全体	3月		0	0	60	60	2.3	4.7
		5月		0	0	0	0	0.0	0.0
		6月	病葉数	0	0	54	54	3.3	5.2
		7月	/1.25 m ²	0	0	2	60	9.9	17.4
		8月	m ²	0	0	48	48	3.2	7.9
輪 斑 病	川根地域	9月		0	0	60	60	3.0	5.6
		10月		0	0	54	54	3.0	5.4
	県全体	3月		0	0	60	60	2.3	4.7
		5月		0	0	0	0	0.0	0.0
		6月	病葉数	0	0	54	54	3.3	5.2
		7月	/1.25 m ²	0	0	2	60	9.9	17.4
		8月	m ²	0	0	48	48	3.2	7.9
	県全体	9月		0	0	60	60	3.0	5.6
		10月		0	0	54	54	3.0	5.4
		3月		0	0	60	60	2.3	4.7
		5月		0	0	0	0	0.0	0.0

チヤ (調査点数：50点， 栽培面積：13,300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	調査項目	程度別発生面積率 (%)				発生程度	
				甚	多	中	少	平均	標準偏差
				計	平年値	計	平年値	平均	標準偏差
新 梢 枯 死 症	山富麓	7月		0	0	0	30	0.9	1.6
		8月	発症枝数	0	0	10	50	5.0	7.9
		9月	/1.25 m ²	0	0	10	80	11.4	13.5
		10月		0	0	0	80	4.1	5.3
		7月		0	0	0	20	0.4	0.8
	静岡市	8月	発症枝数	0	0	0	50	5.1	7.4
		9月	/1.25 m ²	0	0	30	50	25.5	29.7
		10月		0	0	0	90	10.0	7.0
		7月		0	0	10	10	3.0	8.4
		8月	発症枝数	0	0	30	50	13.3	13.6
新 梢 枯 死 症	牧之原	9月	/1.25 m ²	0	0	10	90	12.2	15.3
		10月		0	0	10	30	4.2	11.0
		7月		0	0	0	10	0.2	0.6
		8月	発症枝数	0	0	0	60	3.9	5.0
		9月	/1.25 m ²	0	0	0	70	7.3	8.6
	磐小笠田原	10月		0	0	10	60	5.6	8.6
		7月		0	0	0	20	0.2	0.4
		8月	発症枝数	0	0	20	80	20.3	33.3
		9月	/1.25 m ²	0	0	40	60	24.6	30.6
		10月		0	0	10	70	8.4	10.0
新 梢 枯 死 症	川根	7月		0	0	0	20	0.9	4.0
		8月	発症枝数	0	0	12	58	9.5	18.1
		9月	/1.25 m ²	0	0	18	70	16.2	22.7
		10月		0	0	6	66	6.5	9.0
		7月		0	0	2	18	0.9	4.0
	県全体	8月	発症枝数	0	0	0	70	9.5	18.1
		9月	/1.25 m ²	0	0	0	88	16.2	22.7
		10月		0	0	6	66	6.5	9.0
		7月		0	0	2	18	0.9	4.0
		8月	発症枝数	0	0	12	58	9.5	18.1

チャ (調査点数：50点，栽培面積：13,300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	調査項目	程度別発生面積率 (%)				発生程度			
				甚	多	中	少	計	平均	標準偏差	平年値
炭疽病	富士山麓	3月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	50	3.1	5.4	18.2
		5月		0	0	0	0	40	3.5	7.7	2.9
		6月		0	0	0	0	30	0.6	1.0	2.7
		7月		0	0	20	0	40	23.3	30.3	25.6
		8月		0	0	0	0	30	0.9	1.6	18.5
	静岡北部市	9月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	50	7.9	14.4	28.9
		10月		0	0	10	0	80	20.9	35.8	38.8
		3月		0	0	0	0	100	5.1	4.2	19.5
		5月		0	0	0	0	20	0.6	1.3	3.5
		6月		0	0	0	0	70	10.4	19.6	5.3
炭疽病	牧之原	7月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	40	8.9	20.5	22.6
		8月		0	0	0	0	20	5.0	10.2	9.4
		9月		0	10	0	0	50	39.0	107.3	18.7
		10月		0	10	0	0	80	34.7	81.8	33.5
		3月		0	0	0	0	90	25.6	39.9	18.9
	磐小田笠原・	5月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	50	5.3	11.7	2.0
		6月		0	0	10	0	60	17.6	39.3	2.0
		7月		0	0	10	0	60	28.6	68.0	9.7
		8月		0	0	10	0	50	21.8	42.4	39.0
		9月		0	10	0	0	70	18.0	41.9	34.6
炭疽病	川根	10月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	80	18.6	40.5	39.1
		3月		0	0	0	0	80	9.8	12.9	8.9
		5月		0	0	0	0	40	1.7	4.1	0.6
		6月		0	0	0	0	30	6.7	15.7	4.1
		7月		0	0	0	0	50	7.2	15.6	6.9
	県全体	8月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	30	0.9	1.8	22.2
		9月		0	0	0	0	50	1.7	2.2	9.9
		10月		0	0	0	0	60	4.5	4.7	15.0
		3月		0	0	30	0	70	51.1	50.6	28.8
		5月		0	0	10	0	50	23.1	42.3	4.8
炭疽病	川根	6月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	60	8.3	9.4	5.2
		7月		0	0	10	0	80	19.3	39.8	12.8
		8月		0	0	0	0	30	7.5	21.5	29.5
		9月		0	0	10	0	60	18.4	51.6	53.5
		10月		0	0	0	0	70	23.1	35.4	56.4
	県全体	3月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	8	0	76	18.9	34.6	18.9
		5月		0	0	2	0	42	6.8	21.7	2.8
		6月		0	0	2	0	50	8.7	22.0	3.8
		7月		0	0	8	0	52	17.5	40.3	15.5
		8月		0	0	2	0	32	7.2	23.1	23.7
炭疽病	川根	9月	病葉数 /1.25 m ²	0	2	4	0	56	17.0	58.2	29.1
		10月		0	2	6	0	68	20.4	47.7	36.5
	県全体	3月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	78	18.9	34.6	18.9
		5月		0	0	2	0	42	6.8	21.7	2.8
		6月		0	0	2	0	50	8.7	22.0	3.8
		7月		0	0	8	0	52	17.5	40.3	15.5
		8月		0	0	2	0	32	7.2	23.1	23.7
炭疽病	川根	9月	病葉数 /1.25 m ²	0	2	4	0	56	17.0	58.2	29.1
		10月		0	2	6	0	68	20.4	47.7	36.5
	県全体	3月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	78	18.9	34.6	18.9
		5月		0	0	2	0	42	6.8	21.7	2.8
		6月		0	0	2	0	50	8.7	22.0	3.8
		7月		0	0	8	0	52	17.5	40.3	15.5
		8月		0	0	2	0	32	7.2	23.1	23.7
炭疽病	川根	9月	病葉数 /1.25 m ²	0	2	4	0	56	17.0	58.2	29.1
		10月		0	2	6	0	68	20.4	47.7	36.5
	県全体	3月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	78	18.9	34.6	18.9
		5月		0	0	2	0	42	6.8	21.7	2.8
		6月		0	0	2	0	50	8.7	22.0	3.8
		7月		0	0	8	0	52	17.5	40.3	15.5
		8月		0	0	2	0	32	7.2	23.1	23.7
炭疽病	川根	9月	病葉数 /1.25 m ²	0	2	4	0	56	17.0	58.2	29.1
		10月		0	2	6	0	68	20.4	47.7	36.5
	県全体	3月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	78	18.9	34.6	18.9
		5月		0	0	2	0	42	6.8	21.7	2.8
		6月		0	0	2	0	50	8.7	22.0	3.8
		7月		0	0	8	0	52	17.5	40.3	15.5
		8月		0	0	2	0	32	7.2	23.1	23.7
炭疽病	川根	9月	病葉数 /1.25 m ²	0	2	4	0	56	17.0	58.2	29.1
		10月		0	2	6	0	68	20.4	47.7	36.5
	県全体	3月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	78	18.9	34.6	18.9
		5月		0	0	2	0	42	6.8	21.7	2.8
		6月		0	0	2	0	50	8.7	22.0	3.8
		7月		0	0	8	0	52	17.5	40.3	15.5
		8月		0	0	2	0	32	7.2	23.1	23.7
炭疽病	川根	9月	病葉数 /1.25 m ²	0	2	4	0	56	17.0	58.2	29.1
		10月		0	2	6	0	68	20.4	47.7	36.5
	県全体	3月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	78	18.9	34.6	18.9
		5月		0	0	2	0	42	6.8	21.7	2.8
		6月		0	0	2	0	50	8.7	22.0	3.8
		7月		0	0	8	0	52	17.5	40.3	15.5
		8月		0	0	2	0	32	7.2	23.1	23.7
炭疽病	川根	9月	病葉数 /1.25 m ²	0	2	4	0	56	17.0	58.2	29.1
		10月		0	2	6	0	68	20.4	47.7	36.5
	県全体	3月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	78	18.9	34.6	18.9
		5月		0	0	2	0	42	6.8	21.7	2.8
		6月		0	0	2	0	50	8.7	22.0	3.8
		7月		0	0	8	0	52	17.5	40.3	15.5
		8月		0	0	2	0	32	7.2	23.1	23.7
炭疽病	川根	9月	病葉数 /1.25 m ²	0	2	4	0	56	17.0	58.2	29.1
		10月		0	2	6	0	68	20.4	47.7	36.5
	県全体	3月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	78	18.9	34.6	18.9
		5月		0	0	2	0	42	6.8	21.7	2.8
		6月		0	0	2	0	50	8.7	22.0	3.8
		7月		0	0	8	0	52	17.5	40.3	15.5
		8月		0	0	2	0	32	7.2	23.1	23.7
炭疽病	川根	9月	病葉数 /1.25 m ²	0	2	4	0	56	17.0	58.2	29.1
		10月		0	2	6	0	68	20.4	47.7	36.5
	県全体	3月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	78	18.9	34.6	18.9
		5月		0	0	2	0	42	6.8	21.7	2.8
		6月		0	0	2	0	50	8.7	22.0	3.8
		7月		0	0	8	0	52	17.5	40.3	15.5
		8月		0	0	2	0	32	7.2	23.1	23.7
炭疽病	川根	9月	病葉数 /1.25 m ²	0	2	4	0	56	17.0	58.2	29.1
		10月		0	2	6	0	68	20.4	47.7	36.5
	県全体	3月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	78	18.9	34.6	18.9
		5月		0	0	2	0	42	6.8	21.7	2.8
		6月		0	0	2	0	50	8.7	22.0	3.8
		7月		0	0	8	0	52	17.5	40.3	15.5
		8月		0	0	2	0	32	7.2	23.1	23.7
炭疽病	川根	9月	病葉数 /1.25 m ²	0	2	4	0	56	17.0	58.2	29.1
		10月		0	2	6	0	68	20.4	47.7	36.5
	県全体	3月	病葉数 /1.25 m ²	0	0	0	0	78	18.9	34.6	18.9
		5月		0	0	2	0	42	6.8	21.7	2.8
		6月		0	0	2	0	50	8.7	22.0	3.

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13, 300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	甚	程度別発生面積率 (%)			調査項目	発生程度	
				多	中	少		平均	標準偏差
赤 焼 病	山富 魔士	2月	0	0	0	0	病葉数	0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	/1.25 m ²	0.0	0.0
		4月	0	0	0	0		0.0	0.1
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0
	静岡 北岡 部市	2月	0	0	0	0	病葉数	0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	/1.25 m ²	0.0	0.2
		4月	0	0	0	0		0.0	1.5
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0
	牧之 原	2月	0	0	0	0	病葉数	0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	/1.25 m ²	0.0	0.2
		4月	0	0	0	0		0.0	0.4
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0
	磐小 田笠 原・	2月	0	0	0	0	病葉数	0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	/1.25 m ²	0.0	0.1
		4月	0	0	0	0		0.0	0.0
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0
	川 根	2月	0	0	0	0	病葉数	0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	/1.25 m ²	0.0	0.0
		4月	0	0	0	0		0.0	0.1
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0
	県全 体	2月	0	0	0	0	病葉数	0.0	0.1
		3月	0	0	0	0	/1.25 m ²	0.0	0.1
		4月	0	0	0	0		0.0	0.4
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13, 300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	甚	程度別発生面積率 (%)			調査項目	発生程度	
				多	中	少		平均	標準偏差
網 も ち 病	富士 山 魔	3月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0	3	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	静岡 北岡 部市	3月	0	0	0	0	3	0.0	0.1
		7月	0	0	0	0	6	0.0	0.7
		8月	0	0	0	0	6	0.0	0.2
		9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	牧之 原	3月	0	0	0	0	5	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0	0	0.2	0.6
		8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	磐小 田笠 原・	3月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	川 根	3月	0	0	0	0	4	0.1	0.3
		7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	県全 体	3月	0	0	0	0	2	0.1	0.3
		7月	0	0	0	0	2	0.1	0.3
		8月	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
褐色 円 星 病	山富 魔士	3月	0	0	0	0	93	16.7	18.1
		4月	0	0	0	0	100	45.9	21.4
		7月	0	0	0	0	67	6.8	10.9
	静岡 北岡 部市	3月	0	0	0	0	72	28.4	26.0
		4月	0	0	0	0	99	41.4	28.2
		7月	0	0	0	0	76	17.8	18.4
	牧之 原	3月	0	0	0	0	92	15.3	11.3
		4月	0	0	0	0	100	40.2	20.5
		7月	0	0	0	0	57	4.8	8.6
	磐小 田笠 原・	3月	0	0	0	0	89	18.8	17.3
		4月	0	0	0	0	99	52.0	19.4
		7月	0	0	0	0	70	12.1	14.3
	川 根	3月	0	0	0	0	72	5.8	4.7
		4月	0	0	0	0	99	28.0	20.7
		7月	0	0	0	0	55	3.3	4.7
	県全 体	3月	0	0	0	0	82	17.0	18.5
		4月	0	0	0	0	99	41.5	23.6
		7月	0	0	0	0	65	9.0	13.4

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13, 300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)					調査項目	発生程度			
			甚	多	中	少	計		平年値	平均	標準偏差	平年値
チャ	富士山麓	3月	0	0	0	20	20	14		0.2	0.4	0.4
		4月	0	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0
		5月	0	0	0	30	30	17	幼虫数	0.9	1.8	0.7
		6月	0	0	0	0	0	6	/1.25 m ²	0.0	0.0	0.1
		7月	0	0	0	10	10	14		0.1	0.3	0.2
		8月	0	0	0	0	0	14		0.0	0.0	0.6
		9月	0	0	0	0	0	10		0.0	0.0	0.4
		10月	0	0	0	10	10	24		0.2	0.6	0.6
		3月	0	0	0	20	20	19		0.2	0.4	0.3
		4月	0	0	0	40	40	3		0.4	0.5	0.0
ヤマ	静岡北都市	5月	0	0	0	10	10	18	幼虫数	0.1	0.3	0.5
		6月	0	0	0	10	10	12	/1.25 m ²	0.1	0.3	0.4
		7月	0	0	0	20	20	22		0.2	0.4	0.9
		8月	0	0	0	0	0	11		0.0	0.0	0.4
		9月	0	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0
		10月	0	0	0	0	0	8		0.0	0.0	0.4
		3月	0	0	0	60	60	15		0.9	0.8	0.5
		4月	0	0	0	20	20	2		0.2	0.4	0.0
		5月	0	0	0	20	20	10	幼虫数	0.2	0.4	0.3
		6月	0	0	0	20	20	8	/1.25 m ²	0.2	0.4	0.2
キ	牧之原	7月	0	0	0	0	0	11		0.0	0.0	0.1
		8月	0	0	0	20	20	7		0.4	0.8	0.1
		9月	0	0	0	0	0	4		0.0	0.0	0.1
		10月	0	0	0	20	20	11		0.4	0.9	0.2
		3月	0	0	0	20	20	10		0.2	0.4	0.1
		4月	0	0	0	20	20	5		0.6	1.3	0.1
		5月	0	0	0	30	30	7	幼虫数	0.3	0.5	0.1
		6月	0	0	0	30	30	6	/1.25 m ²	0.5	0.9	0.1
		7月	0	0	0	10	10	17		0.1	0.3	0.4
		8月	0	0	0	0	0	5		0.0	0.0	0.1
ハ	磐小田笠原・	9月	0	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0
		10月	0	0	0	0	0	15		0.0	0.0	0.4
		3月	0	0	0	40	40	14		0.5	0.7	0.3
		4月	0	0	0	20	20	4		0.2	0.4	0.1
		5月	0	0	10	10	20	24	幼虫数	1.0	2.4	0.8
		6月	0	0	0	10	10	18	/1.25 m ²	0.1	0.3	0.5
		7月	0	0	0	0	0	32		0.0	0.0	1.6
		8月	0	0	0	0	0	17		0.0	0.0	1.5
		9月	0	0	10	20	30	7		1.6	3.9	0.2
		10月	0	0	0	30	30	14		0.8	1.3	0.8
カ	川根	3月	0	0	0	32	32	14		0.4	0.6	0.3
		4月	0	0	0	20	20	3		0.3	0.7	0.1
		5月	0	0	2	20	22	15	幼虫数	0.5	1.4	0.5
		6月	0	0	0	14	14	10	/1.25 m ²	0.2	0.5	0.3
		7月	0	0	0	8	8	19		0.1	0.3	0.7
		8月	0	0	0	4	4	11		0.1	0.4	0.5
		9月	0	0	2	4	6	5		0.3	1.8	0.1
		10月	0	0	0	12	12	14		0.3	0.8	0.5
		3月	0	0	0	20	20	3		0.4	0.6	0.3
		4月	0	0	0	20	20	15	幼虫数	0.3	0.7	0.1
ク	県全体	5月	0	0	0	20	22	15	/1.25 m ²	0.5	1.4	0.5
		6月	0	0	0	14	14	10		0.2	0.5	0.3
		7月	0	0	0	8	8	19		0.1	0.3	0.7
		8月	0	0	0	4	4	11		0.1	0.4	0.5
		9月	0	0	0	4	6	5		0.3	1.8	0.1
		10月	0	0	0	12	12	14		0.3	0.8	0.5
		3月	0	0	0	32	32	14		0.4	0.6	0.3
		4月	0	0	0	20	20	3		0.3	0.7	0.1
		5月	0	0	2	20	22	15	幼虫数	0.5	1.4	0.5
		6月	0	0	0	14	14	10	/1.25 m ²	0.2	0.5	0.3

チャ ハ マ キ

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13, 300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)					調査項目	発生程度			
			甚	多	中	少	計		平年値	平均	標準偏差	平年値
チャ	富士山麓	3月	0	0	0	10	10	11	幼虫数 /1.25 m ²	0.3	0.9	0.2
		4月	0	0	0	0	0	4		0.0	0.0	0.1
		5月	0	0	0	10	10	9		0.1	0.3	0.3
		6月	0	0	0	0	0	6		0.0	0.0	0.1
		7月	0	0	0	0	0	20		0.0	0.0	0.7
		8月	0	0	0	0	0	27		0.0	0.0	1.0
		9月	0	0	0	0	0	18		0.0	0.0	0.9
		10月	0	0	0	0	0	28		0.0	0.0	0.6
		3月	0	0	0	0	0	7		0.0	0.0	0.1
		4月	0	0	0	0	0	4		0.0	0.0	0.0
ヤ	静岡北都市	5月	0	0	0	10	10	3	幼虫数 /1.25 m ²	0.1	0.3	0.1
		6月	0	0	0	10	10	7		0.1	0.3	0.1
		7月	0	0	0	0	0	16		0.0	0.0	0.5
		8月	0	0	0	10	10	7		0.4	1.2	0.1
		9月	0	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0
		10月	0	0	0	0	0	4		0.0	0.0	0.1
		3月	0	0	10	40	50	18		2.4	2.9	0.4
		4月	0	0	0	10	10	11		0.2	0.6	0.2
		5月	0	0	0	10	10	6		0.1	0.3	0.1
		6月	0	0	0	0	0	5		0.0	0.0	0.1
ノ	牧之原	7月	0	0	0	0	0	11	0.0	0.0	0.2	
		8月	0	0	0	20	20	21	1.0	2.0	0.8	
		9月	0	0	0	0	0	15	0.0	0.0	0.3	
		10月	0	0	0	0	0	14	0.0	0.0	0.4	
		3月	0	0	0	20	20	18	0.6	1.5	0.3	
		4月	0	0	0	10	10	10	0.1	0.3	0.2	
		5月	0	0	0	0	0	5	0.0	0.0	0.1	
		6月	0	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.0	
		7月	0	0	0	10	10	23	0.1	0.3	0.6	
		8月	0	0	0	10	10	14	0.1	0.3	0.6	
コ	磐小田笠原・ 田原	9月	0	0	0	0	0	8	0.0	0.0	0.2	
		10月	0	0	0	0	0	15	0.0	0.0	0.3	
		3月	0	0	0	20	20	9	0.4	0.9	0.1	
		4月	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	
		5月	0	0	0	40	40	6	0.5	0.7	0.2	
		6月	0	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.1	
		7月	0	0	0	0	0	24	0.0	0.0	0.7	
		8月	0	0	0	10	10	22	0.1	0.3	0.6	
		9月	0	0	0	30	30	11	0.3	0.5	0.2	
		10月	0	0	0	0	0	11	0.0	0.0	0.3	
カ	川根	3月	0	0	0	2	2	13	0.7	1.8	0.2	
		4月	0	0	0	4	4	7	0.1	0.3	0.1	
		5月	0	0	0	14	14	8	0.2	0.4	0.1	
		6月	0	0	0	2	2	5	0.0	0.1	0.1	
		7月	0	0	0	2	2	19	0.0	0.1	0.5	
		8月	0	0	0	10	10	18	0.3	1.1	0.6	
		9月	0	0	0	6	6	11	0.1	0.2	0.3	
		10月	0	0	0	0	0	14	0.0	0.0	0.3	
		3月	0	0	0	18	18	9	0.4	0.9	0.1	
		4月	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	
5月	0	0	0	40	40	6	0.5	0.7	0.2			
6月	0	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.1			
7月	0	0	0	0	0	24	0.0	0.0	0.7			
8月	0	0	0	10	10	22	0.1	0.3	0.6			
9月	0	0	0	30	30	11	0.3	0.5	0.2			
10月	0	0	0	0	0	11	0.0	0.0	0.3			
ク	県全体	3月	0	0	2	18	20	13	0.7	1.8	0.2	
		4月	0	0	0	4	4	7	0.1	0.3	0.1	
		5月	0	0	0	14	14	8	0.2	0.4	0.1	
		6月	0	0	0	2	2	5	0.0	0.1	0.1	
		7月	0	0	0	2	2	19	0.0	0.1	0.5	
		8月	0	0	0	10	10	18	0.3	1.1	0.6	
		9月	0	0	0	6	6	11	0.1	0.2	0.3	
		10月	0	0	0	0	0	14	0.0	0.0	0.3	
		3月	0	0	0	20	20	9	0.4	0.9	0.1	
		4月	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	
5月	0	0	0	40	40	6	0.5	0.7	0.2			
6月	0	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.1			
7月	0	0	0	0	0	24	0.0	0.0	0.7			
8月	0	0	0	10	10	22	0.1	0.3	0.6			
9月	0	0	0	30	30	11	0.3	0.5	0.2			
10月	0	0	0	0	0	11	0.0	0.0	0.3			

チャ (調査点数：50点，栽培面積：13,300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				発生程度	
			甚	多	中	少	計	平均
チャノホソガ	富士山麓	5月	0	0	0	0	50	1.7
		6月	0	0	0	0	20	1.5
		7月	0	0	0	0	38	3.6
		8月	0	0	0	0	30	2.3
		9月	0	0	0	0	10	0.3
	静岡北部市	5月	0	0	0	0	10	0.1
		6月	0	0	0	0	10	0.3
		7月	0	0	0	0	25	1.6
		8月	0	0	0	0	30	1.2
		9月	0	0	0	0	10	0.4
チャノホソガ	牧之原	5月	0	0	0	0	30	0.8
		6月	0	0	0	0	60	1.5
		7月	0	0	0	0	21	2.1
		8月	0	0	0	0	15	2.7
		9月	0	0	0	0	10	0.9
	磐小田笠原・	5月	0	0	0	0	10	0.2
		6月	0	0	0	0	30	0.6
		7月	0	0	0	0	20	0.4
		8月	0	0	0	0	18	0.9
		9月	0	0	0	0	10	0.3
チャノホソガ	川根	5月	0	0	0	0	20	0.4
		6月	0	0	0	0	40	1.5
		7月	0	0	0	0	19	2.1
		8月	0	0	0	0	17	0.0
		9月	0	0	0	0	20	0.0
	県全体	5月	0	0	0	0	22	0.6
		6月	0	0	0	0	38	1.2
		7月	0	0	0	0	18	2.3
		8月	0	0	0	0	8	0.6
		9月	0	0	0	0	14	0.2

チャ (調査点数：50点，栽培面積：13,300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
チャノナガサビダニ	山富麓	5月				10	4	1.0	3.0
		6月				0	0	0.0	0.0
		5月				0	1	0.0	0.0
		6月				0	1	0.0	0.0
		6月				0	1	0.0	0.0
	磐小田笠原・	5月				10	6	1.0	3.0
		6月				0	1	0.0	0.0
		5月				0	4	0.0	0.0
		6月				0	1	0.0	0.0
		6月				0	1	0.0	0.0
チャノホソガ	山富麓	8月				0	0	0.0	0.0
		9月				0	0	0.0	0.0
		10月				10	0	1.0	3.0
		8月				0	0	0.0	0.0
		9月				0	0	0.0	0.0
	磐小田笠原・	8月				0	0	0.0	0.0
		9月				0	0	0.0	0.0
		10月				0	4	0.0	0.0
		8月				0	0	0.0	0.0
		9月				0	1	0.0	0.0
チャノホソガ	川根	8月				0	0	0.0	0.0
		9月				0	0	0.0	0.0
		10月				0	0	0.0	0.0
		8月				0	0	0.0	0.0
		9月				0	0	0.0	0.0
	県全体	8月				0	0	0.0	0.0
		9月				0	0	0.0	0.0
		10月				0	0	0.0	0.0
		8月				0	0	0.0	0.0
		9月				0	0	0.0	0.0

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度			
			甚	多	中	少		計	平年値	平均	標準偏差
カ ン ザ ワ ハ ダ ニ 摘 採 面	富士山麓	2月	0	0	0	30	30	19	0.7	1.3	0.4
		3月	0	0	0	40	40	28	1.7	2.1	1.4
		4月	0	0	0	40	40	46	2.0	2.5	2.3
		5月	0	0	0	20	20	35	0.4	0.9	1.9
		6月	0	0	0	10	10	6	0.1	0.3	0.4
		7月	0	0	0	20	20	18	0.2	0.4	0.5
		8月	0	10	10	40	60	33	7.5	12.9	3.7
		9月	0	0	0	0	0	48	0.0	0.0	3.4
		10月	0	0	0	10	10	32	0.1	0.3	1.2
		2月	0	0	0	50	50	21	1.2	1.8	0.5
静岡 北部市	3月	0	0	0	40	40	31	1.0	1.6	0.9	
	4月	0	0	0	80	80	55	3.0	2.8	2.7	
	5月	0	0	0	40	40	42	1.2	2.1	2.8	
	6月	0	0	0	0	0	30	0.0	0.0	1.0	
	7月	0	0	0	50	50	13	1.0	1.3	0.2	
	8月	0	0	40	10	50	35	8.0	10.4	3.6	
	9月	0	0	0	0	0	52	0.0	0.0	3.0	
	10月	0	0	0	20	20	38	0.2	0.4	2.4	
	2月	0	0	0	70	70	13	2.6	2.9	0.2	
	3月	0	0	10	70	80	19	3.8	5.2	0.3	
牧之原	4月	0	10	0	70	80	48	6.9	10.8	1.7	
	5月	0	0	0	60	60	57	2.1	2.9	3.9	
	6月	0	0	0	0	0	24	0.0	0.0	1.6	
	7月	0	0	0	50	50	18	2.1	2.6	0.7	
	8月	10	10	20	30	70	39	16.6	23.7	4.0	
	9月	0	0	0	20	20	29	0.3	0.6	2.5	
	10月	0	0	0	0	0	22	0.0	0.0	0.7	
	2月	0	0	0	20	40	17	3.3	5.1	0.4	
	3月	0	0	10	50	60	27	3.7	4.8	0.6	
	4月	0	10	10	70	90	32	7.6	10.9	1.3	
磐小 田笠原・	5月	0	0	0	30	30	53	0.5	0.9	2.1	
	6月	0	0	0	20	20	31	0.2	0.4	1.0	
	7月	0	0	0	40	40	20	1.4	2.2	0.6	
	8月	0	10	10	40	60	39	6.3	12.6	3.1	
	9月	0	0	0	10	10	41	0.1	0.3	3.1	
	10月	0	0	0	10	10	26	0.1	0.3	1.0	
	2月	0	0	0	30	30	17	0.3	0.5	0.3	
	3月	0	0	0	50	50	35	1.1	1.2	1.3	
	4月	0	0	0	40	40	47	1.3	2.0	3.0	
	5月	0	0	0	20	20	43	0.2	0.4	2.3	
川根	6月	0	0	0	0	0	23	0.0	0.0	1.2	
	7月	0	0	0	40	40	17	0.5	0.7	0.3	
	8月	0	10	30	50	90	27	11.4	10.9	1.9	
	9月	0	0	0	10	10	33	0.1	0.3	1.2	
	10月	0	0	0	10	10	25	0.1	0.3	1.2	

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生積率 (%)				調査項目	発生程度			
			甚	多	中	少		計	平年値	平均	標準偏差
カンザワハダニ 摘採面	県全体	2月	0	0	4	40	44	17	1.6	3.0	0.4
		3月	0	0	4	50	54	28	2.3	3.7	0.9
		4月	0	4	2	60	66	46	4.2	7.6	2.2
		5月	0	0	0	34	34	46	0.9	1.9	2.6
		6月	0	0	0	6	6	23	0.1	0.2	1.0
		7月	0	0	0	40	40	17	1.0	1.8	0.5
		8月	2	8	22	34	66	35	10.0	15.4	3.3
		9月	0	0	0	8	8	41	0.1	0.4	2.6
		10月	0	0	0	10	10	28	0.1	0.3	1.3
		2月	0	0	0	30	30	36	3.0	6.3	1.0
カンザワハダニ裾部	山富麓士	3月	0	0	0	50	50	25	3.0	4.4	1.3
		4月	0	0	0	50	50	38	2.0	2.5	1.8
	静岡北部市	2月	0	0	0	50	50	23	0.8	0.9	0.6
		3月	0	0	0	90	90	26	2.0	1.6	0.6
	4月	0	0	0	60	60	41	2.3	2.4	1.5	
	牧之原	2月	0	0	0	90	90	49	4.5	5.3	1.6
		3月	0	0	0	90	90	40	6.2	7.4	1.3
	4月	0	0	0	80	80	57	6.6	7.0	2.6	
	磐小田笠原・	2月	0	0	0	90	90	39	7.4	7.8	0.9
		3月	0	0	0	100	100	26	7.2	6.5	0.8
川根	田笠原・	4月	0	0	0	70	70	40	7.1	9.0	1.4
		2月	0	0	0	50	50	31	1.1	1.3	1.7
	川根	3月	0	0	0	50	50	36	4.0	5.3	1.6
		4月	0	0	0	40	40	44	1.3	2.0	2.3
	県全体	2月	0	0	0	62	62	36	3.4	5.7	1.2
		3月	0	0	0	76	76	31	4.5	5.8	1.1
		4月	0	0	0	60	60	44	4.2	7.6	1.9
		4月	0	0	0	60	60	44	4.2	7.6	1.9

チャ (調査点数：50点，栽培面積：13,300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	調査項目	程度別発生面積率 (%)				発生程度	
				甚	多	中	少	平均	標準偏差
チャ	富士山麓	4月	叩き落とし虫数/4か所	0	0	0	60	1.4	1.6
		5月		0	0	0	100	4.2	2.3
		6月		0	10	20	70	5.0	6.9
		7月		0	0	30	60	5.2	3.8
		8月		0	0	0	20	0.3	0.6
		9月		0	0	10	30	1.5	2.7
		10月		0	0	10	80	3.9	2.8
		4月		0	0	0	20	0.3	0.6
		5月		0	10	20	50	6.2	6.3
		6月		0	0	30	70	6.0	4.7
チャ	静岡北都市	7月	叩き落とし虫数/4か所	0	0	10	40	2.2	4.7
		8月		0	0	0	50	1.2	1.5
		9月		0	0	0	50	1.1	1.3
		10月		0	0	0	60	0.8	0.9
		4月		0	0	0	20	0.3	0.6
		5月		0	0	10	20	2.6	3.9
		6月		0	10	40	30	10.5	7.8
		7月		0	0	0	30	1.0	1.8
		8月		0	0	0	30	1.0	1.9
		9月		0	0	0	40	0.8	1.2
ノ	牧之原	10月	叩き落とし虫数/4か所	0	10	0	60	3.7	6.7
		4月		0	0	0	20	0.3	0.6
		5月		0	0	0	70	2.6	3.9
		6月		0	10	40	30	10.5	7.8
		7月		0	0	0	30	1.0	1.8
		8月		0	0	0	30	1.0	1.9
		9月		0	0	0	40	0.8	1.2
		10月		0	0	0	60	3.7	6.7
		4月		0	0	0	20	0.3	0.6
		5月		0	0	10	20	2.6	3.9
ド	磐小田笠原	6月	叩き落とし虫数/4か所	0	10	30	60	10.5	7.8
		7月		0	0	0	30	1.0	1.8
		8月		0	0	0	30	1.0	1.9
		9月		0	0	0	40	0.8	1.2
		10月		0	0	0	60	3.7	6.7
		4月		0	0	0	20	0.3	0.6
		5月		0	0	0	70	2.6	3.9
		6月		0	10	30	60	10.5	7.8
		7月		0	0	0	30	1.0	1.8
		8月		0	0	0	30	1.0	1.9
リ	川根	9月	叩き落とし虫数/4か所	0	0	0	20	0.3	0.6
		10月		0	0	0	70	1.6	1.4
		4月		0	0	0	20	0.3	0.6
		5月		0	0	0	60	1.3	1.3
		6月		0	0	30	70	7.3	5.3
		7月		0	0	0	80	1.8	1.4
		8月		0	0	0	30	0.9	1.8
		9月		0	0	0	70	2.0	2.1
		10月		0	0	0	20	0.2	0.4
		4月		0	0	0	30	0.5	1.0
ヒ	県全体	5月	叩き落とし虫数/4か所	0	2	12	68	3.9	4.3
		6月		0	6	30	54	7.6	6.9
		7月		0	0	8	54	2.4	3.4
		8月		0	0	0	34	0.8	1.4
		9月		0	0	2	42	1.1	1.8
		10月		0	2	2	58	2.0	3.7
		4月		0	0	0	30	0.5	1.0
		5月		0	0	0	60	3.9	4.3
		6月		0	0	0	70	7.6	6.9
		7月		0	0	0	80	2.4	3.4
メ	県全体	8月		0	0	0	34	0.8	1.4
		9月		0	0	2	42	1.1	1.8
		10月		0	2	2	58	2.0	3.7
		4月		0	0	0	30	0.5	1.0
		5月		0	0	0	60	3.9	4.3
		6月		0	0	0	70	7.6	6.9
		7月		0	0	0	80	2.4	3.4
		8月		0	0	0	34	0.8	1.4
		9月		0	0	2	42	1.1	1.8
		10月		0	2	2	58	2.0	3.7
ヨ	県全体	4月	叩き落とし虫数/4か所	0	0	0	20	0.3	0.6
		5月		0	0	0	60	1.3	1.3
		6月		0	0	30	70	7.3	5.3
		7月		0	0	0	80	1.8	1.4
		8月		0	0	0	30	0.9	1.8
		9月		0	0	0	70	2.0	2.1
		10月		0	0	0	20	0.2	0.4
		4月		0	0	0	30	0.5	1.0
		5月		0	0	0	60	3.9	4.3
		6月		0	0	0	70	7.6	6.9
コ	県全体	7月		0	0	0	80	2.4	3.4
		8月		0	0	0	34	0.8	1.4
		9月		0	0	2	42	1.1	1.8
		10月		0	2	2	58	2.0	3.7
		4月		0	0	0	30	0.5	1.0
		5月		0	0	0	60	3.9	4.3
		6月		0	0	0	70	7.6	6.9
		7月		0	0	0	80	2.4	3.4
		8月		0	0	0	34	0.8	1.4
		9月		0	0	2	42	1.1	1.8
バ	県全体	10月		0	2	2	58	2.0	3.7
		4月		0	0	0	30	0.5	1.0
		5月		0	0	0	60	3.9	4.3
		6月		0	0	0	70	7.6	6.9
		7月		0	0	0	80	2.4	3.4
		8月		0	0	0	34	0.8	1.4
		9月		0	0	2	42	1.1	1.8
		10月		0	2	2	58	2.0	3.7
		4月		0	0	0	30	0.5	1.0
		5月		0	0	0	60	3.9	4.3
イ	県全体	6月		0	0	0	70	7.6	6.9
		7月		0	0	0	80	2.4	3.4
		8月		0	0	0	34	0.8	1.4
		9月		0	0	2	42	1.1	1.8
		10月		0	2	2	58	2.0	3.7
		4月		0	0	0	30	0.5	1.0
		5月		0	0	0	60	3.9	4.3
		6月		0	0	0	70	7.6	6.9
		7月		0	0	0	80	2.4	3.4
		8月		0	0	0	34	0.8	1.4
マ	県全体	9月		0	0	2	42	1.1	1.8
		10月		0	2	2	58	2.0	3.7
		4月		0	0	0	30	0.5	1.0
		5月		0	0	0	60	3.9	4.3
		6月		0	0	0	70	7.6	6.9
		7月		0	0	0	80	2.4	3.4
		8月		0	0	0	34	0.8	1.4
		9月		0	0	2	42	1.1	1.8
		10月		0	2	2	58	2.0	3.7
		4月		0	0	0	30	0.5	1.0

チャ (調査点数：50点，栽培面積：13,300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	調査項目	程度別発生面積率 (%)				発生程度	
				甚	多	中	少	平均	標準偏差
チャ	富士山麓	4月	叩き落とし虫数/4か所	0	0	0	20	0.7	1.8
		5月		0	0	0	70	5.4	10.6
		6月		0	0	10	70	8.6	11.4
		7月		0	0	10	80	16.1	14.2
		8月		0	0	10	70	24.2	23.6
		9月		0	0	0	80	3.8	4.0
		10月		0	0	0	100	5.7	6.6
		4月		0	0	0	20	0.3	0.6
		5月		0	0	0	80	2.6	2.7
		6月		0	0	0	100	6.8	4.9
ヤ	静岡北都市	7月	叩き落とし虫数/4か所	0	0	0	90	6.5	7.3
		8月		0	0	0	80	5.6	4.5
		9月		0	0	0	40	0.5	0.7
		10月		0	0	0	80	3.0	2.5
		4月		0	0	0	20	0.6	1.5
		5月		0	0	0	60	0.9	0.9
		6月		0	0	0	100	13.9	9.7
		7月		0	10	20	70	29.6	38.5
		8月		10	0	20	70	45.8	78.4
		9月		0	0	0	90	2.4	1.8
ノ	牧之原	10月	叩き落とし虫数/4か所	0	0	0	80	18.6	17.2
		4月		0	0	0	20	0.6	1.5
		5月		0	0	0	60	0.9	0.9
		6月		0	0	0	100	13.9	9.7

チャ (調査点数：50点，栽培面積：13,300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)					調査項目		発生程度		
			甚	多	中	少	計	平年値	項目	平均	標準偏差	平年値
クワシロカイガラムシ	富士山麓	4月	0	0	0	0	0	25	雄繭寄生株率%	0.0	0.0	5.9
		6月	0	0	0	10	10	30		1.0	3.0	8.1
		7月	0	0	0	0	0	3		0.0	0.0	0.4
		8月	0	0	0	0	0	16		0.0	0.0	3.2
		9月	0	0	0	10	10	8		1.0	3.0	1.4
		10月	0	0	10	10	20	31		6.0	15.0	8.4
	静岡県北部市	4月	0	0	0	10	10	19	雄繭寄生株率%	1.0	3.0	4.5
		6月	0	0	10	10	20	28		5.0	10.2	5.8
		7月	0	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.4
		8月	0	0	0	10	10	14		2.0	6.0	3.1
牧之原	9月	0	0	0	0	0	5	雄繭寄生株率%	0.0	0.0	0.9	
	10月	0	0	0	0	0	37		0.0	0.0	8.7	
	4月	0	0	0	20	20	28		2.0	4.0	6.8	
	6月	0	0	20	50	70	56		14.0	12.8	17.9	
	7月	0	0	0	10	10	6		1.0	3.0	0.8	
	8月	0	0	0	40	40	33		4.0	4.9	8.5	
磐小田笠原・	9月	0	0	0	0	0	12	雄繭寄生株率%	0.0	0.0	2.1	
	10月	0	0	0	10	10	49		1.0	3.0	14.5	
	4月	0	0	0	20	20	26		2.0	4.0	8.9	
	6月	0	0	20	10	30	46		10.0	17.9	12.5	
	7月	0	0	0	10	10	9		1.0	3.0	1.2	
	8月	0	10	0	10	20	32		7.0	17.9	6.6	
川根	9月	0	0	0	0	0	12	雄繭寄生株率%	0.0	0.0	1.7	
	10月	0	0	0	10	10	47		2.0	6.0	12.9	
	4月	10	0	0	40	50	22		14.0	26.2	5.1	
	6月	0	0	0	20	20	33		3.0	6.4	7.1	
	7月	0	0	0	0	0	10		0.0	0.0	1.1	
	8月	0	0	0	10	10	27		1.0	3.0	5.9	
県全体	9月	0	0	0	10	10	7	雄繭寄生株率%	1.0	3.0	2.2	
	10月	0	0	0	10	10	35		1.0	3.0	9.6	
	4月	2	0	0	18	20	24		3.8	13.1	5.8	
	6月	0	0	10	20	30	39		6.6	12.3	10.3	
	7月	0	0	0	4	4	6		0.4	2.0	0.8	
	8月	0	2	0	14	16	24		2.8	9.2	5.5	
	9月	0	0	0	4	4	9	雄繭寄生株率%	0.4	2.0	1.7	
	10月	0	0	2	8	10	40		2.0	7.7	10.8	

チャ (調査点数：50点，栽培面積：13,300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	調査項目	程度別発生面積率 (%)					発生程度				
				甚	多	中	少	計	平年値	項目	平均	標準偏差	平年値
シマゲロアオカスミカメ	山富麓土	4月	被害	0	0	0	0	0	0	被害	0.0	0.0	0.0
		5月	芽数	0	0	0	0	0	10	芽数	0.0	0.0	0.2
		6月	/1.25	0	0	0	10	10	13	/1.25	0.1	0.3	1.7
		7月	m ²	0	0	0	10	10	6	m ²	0.1	0.3	0.6
		4月	被害	0	0	0	0	0	0	被害	0.0	0.0	0.0
	静岡北部市	5月	芽数	0	0	0	20	20	14	芽数	0.5	1.2	0.5
		6月	/1.25	0	0	0	0	0	32	/1.25	0.0	0.0	2.6
		7月	m ²	0	0	0	0	0	4	m ²	0.0	0.0	0.1
		4月	被害	0	0	0	0	0	2	被害	0.0	0.0	0.0
		5月	芽数	0	0	0	10	10	13	芽数	0.1	0.3	0.2
コシカシラ	磐小田笠原・	6月	/1.25	0	0	0	30	30	9	/1.25	0.4	0.7	0.2
		7月	m ²	0	0	0	10	10	13	m ²	0.1	0.3	0.8
		4月	被害	0	0	0	0	0	2	被害	0.0	0.0	0.1
		5月	芽数	0	0	0	20	20	16	芽数	0.2	0.4	0.5
		6月	/1.25	0	0	0	10	10	21	/1.25	0.2	0.6	0.8
	川根	7月	m ²	0	0	0	0	0	15	m ²	0.0	0.0	0.7
		4月	被害	0	0	0	0	0	0	被害	0.0	0.0	0.0
		5月	芽数	0	0	0	10	10	10	芽数	0.1	0.3	0.4
		6月	/1.25	0	0	0	20	20	15	/1.25	0.4	0.9	0.5
		7月	m ²	0	0	0	0	0	7	m ²	0.0	0.0	0.2
コシカシラ	県全体	4月	被害	0	0	0	0	0	1	被害	0.0	0.0	0.0
		5月	芽数	0	0	0	12	12	12	芽数	0.2	0.6	0.3
		6月	/1.25	0	0	0	14	14	18	/1.25	0.2	0.6	1.1
		7月	m ²	0	0	0	4	4	9	m ²	0.0	0.2	0.5
		4月	寄生	0	0	0	0	0	8	寄生	0.0	0.0	0.1
	山富麓土	5月	芽数/1.25m ²	0	0	0	10	10	20	芽数/1.25m ²	0.1	0.3	0.4
		6月	m ²	0	0	0	0	0	13	m ²	0.0	0.0	0.2
		4月	寄生	0	0	0	0	0	0	寄生	0.0	0.0	0.0
		5月	芽数/1.25m ²	0	0	0	20	20	24	芽数/1.25m ²	0.2	0.4	0.4
		6月	m ²	0	0	0	10	10	20	m ²	0.1	0.3	0.4
コシカシラ	静岡北部市	4月	寄生	0	0	0	0	0	0	寄生	0.0	0.0	0.0
		5月	芽数/1.25m ²	0	0	0	10	10	20	芽数/1.25m ²	0.1	0.3	0.3
		6月	m ²	0	0	0	10	10	11	m ²	0.1	0.3	0.2
		4月	寄生	0	0	0	0	0	0	寄生	0.0	0.0	0.0
		5月	芽数/1.25m ²	0	0	0	20	20	14	芽数/1.25m ²	0.2	0.4	0.3
	磐小田笠原・	6月	m ²	0	0	0	20	20	11	m ²	0.4	0.8	0.2
		4月	寄生	0	0	0	0	0	5	寄生	0.0	0.0	0.1
		5月	芽数/1.25m ²	0	0	0	20	20	28	芽数/1.25m ²	0.3	0.6	1.1
		6月	m ²	0	0	0	13	13	6	m ²	0.2	0.5	0.1
		4月	寄生	0	0	0	0	0	3	寄生	0.0	0.0	0.1
コシカシラ	川根	5月	芽数/1.25m ²	0	0	0	16	16	21	芽数/1.25m ²	0.2	0.4	0.5
		6月	m ²	0	0	0	10	10	12	m ²	0.1	0.4	0.2
		4月	寄生	0	0	0	0	0	0	寄生	0.0	0.0	0.0
		5月	芽数/1.25m ²	0	0	0	20	20	28	芽数/1.25m ²	0.3	0.6	1.1
		6月	m ²	0	0	0	13	13	6	m ²	0.2	0.5	0.1
	県全体	4月	寄生	0	0	0	0	0	3	寄生	0.0	0.0	0.1
		5月	芽数/1.25m ²	0	0	0	16	16	21	芽数/1.25m ²	0.2	0.4	0.5
		6月	m ²	0	0	0	10	10	12	m ²	0.1	0.4	0.2
		4月	寄生	0	0	0	0	0	0	寄生	0.0	0.0	0.0
		5月	芽数/1.25m ²	0	0	0	20	20	28	芽数/1.25m ²	0.3	0.6	1.1

チャ 病害虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率 (%)				調査 項目	発生程度			
			甚	多	中	少		計	平年値	発生程度	
										平均	標準偏差
マダラカサハラムシ	富士山麓	4月					0	0	0.0	0.0	
		5月					10	2	0.1	0.3	
		6月					0	2	0.0	0.0	
		7月					0	0	0.0	0.1	
		8月					0	0	0.0	0.0	
	静岡市北部	9月					0	5	0.0	0.0	
		10月					0	9	0.0	0.1	
		4月					0	2	0.0	0.0	
		5月					0	0	0.0	0.0	
		6月					0	2	0.0	0.0	
牧之原	7月					0	0	0.0	0.0		
	8月					0	0	0.0	0.0		
	9月					10	8	0.1	0.3		
	10月					20	15	0.2	0.4		
	4月					0	8	0.0	0.0		
小笠・磐田原	5月					0	0	0.0	0.0		
	6月					0	0	0.0	0.0		
	7月					0	0	0.0	0.0		
	8月					0	0	0.0	0.0		
	9月					0	5	0.0	0.1		
川根地域	10月					20	6	0.0	0.1		
	4月					0	2	0.2	0.4		
	5月					0	1	0.0	0.0		
	6月					0	1	0.0	0.0		
	7月					0	1	0.0	0.0		
県全体	8月					0	0	0.0	0.0		
	9月					0	1	0.0	0.0		
	10月					0	6	0.0	0.0		
	4月					10	4	0.1	0.3		
	5月					10	3	0.1	0.3		
マダラカサハラムシ	6月					10	0	0.1	0.3		
	7月					0	0	0.0	0.0		
	8月					0	0	0.0	0.0		
	9月					0	4	0.0	0.0		
	10月					10	8	0.1	0.3		
マダラカサハラムシ	4月					0	2	0.0	0.0		
	5月					2	1	0.0	0.1		
	6月					4	2	0.0	0.2		
	7月					2	1	0.0	0.0		
	8月					0	0	0.0	0.0		
マダラカサハラムシ	9月					0	0	0.0	0.0		
	10月					2	5	0.0	0.1		
	4月					6	9	0.1	0.2		
	5月					4	4	0.0	0.2		
	6月					0	0	0.0	0.0		

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,300ha)												
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度				
			甚	多	中	少		計	平年値	平均	標準偏差	平年値
ヨモギエダシヤク	富士山麓	4月	0	0	0	0	0	0	叩き落とし 虫数 /4か所	0.0	0.0	0.0
		5月	0	0	0	0	0	1		0.0	0.0	0.0
		6月	0	0	0	0	0	8		0.0	0.0	0.2
		7月	0	0	0	0	0	9		0.0	0.0	0.1
		8月	0	0	0	0	20	7		0.2	0.4	0.1
		9月	0	0	0	20	20	8		0.2	0.4	0.1
	10月	0	0	10	0	10	3	0.2	0.6	0.0		
	静岡県北部市	4月	0	0	0	0	0	1	叩き落とし 虫数 /4か所	0.0	0.0	0.0
		5月	0	0	0	10	10	5		0.1	0.3	0.1
		6月	0	0	0	20	20	4		0.2	0.4	0.0
7月		0	0	0	0	0	11	0.0		0.0	0.1	
牧之原	8月	0	0	0	0	0	3	叩き落とし 虫数 /4か所	0.0	0.0	0.0	
	9月	0	0	0	0	0	12		0.0	0.0	0.1	
	10月	0	0	0	20	20	3		0.2	0.4	0.0	
	4月	0	0	0	0	0	0		叩き落とし 虫数 /4か所	0.0	0.0	0.0
	5月	0	0	0	0	0	4			0.0	0.0	0.0
	6月	0	0	0	60	60	15			0.6	0.5	0.2
7月	0	0	30	30	30	7	0.3	0.5		0.1		
8月	0	0	0	20	20	6	0.2	0.4		0.1		
磐田原・小笠原	9月	0	0	0	0	0	18	叩き落とし 虫数 /4か所	0.0	0.0	0.3	
	10月	0	0	0	20	20	12		0.2	0.4	0.2	
	4月	0	0	0	0	0	0		叩き落とし 虫数 /4か所	0.0	0.0	0.0
	5月	0	0	0	0	0	6			0.0	0.0	0.1
	6月	0	0	10	20	30	10			0.4	0.7	0.1
	7月	0	0	10	30	40	14	0.5		0.7	0.2	
8月	0	0	0	0	0	8	0.0	0.0		0.1		
川根	9月	0	0	0	10	10	10	叩き落とし 虫数 /4か所	0.1	0.3	0.2	
	10月	0	0	0	20	20	9		0.2	0.4	0.1	
	4月	0	0	0	10	10	0		叩き落とし 虫数 /4か所	0.1	0.3	0.0
	5月	0	0	0	10	10	2			0.1	0.3	0.0
	6月	0	0	0	20	20	11			0.2	0.4	0.1
	7月	0	0	0	0	0	6	0.0		0.0	0.1	
8月	0	0	0	10	10	8	0.1	0.3		0.1		
県全体	9月	0	0	0	20	20	6	叩き落とし 虫数 /4か所	0.2	0.4	0.1	
	10月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	
	4月	0	0	0	2	2	0		叩き落とし 虫数 /4か所	0.0	0.1	0.0
	5月	0	0	0	4	4	4			0.0	0.2	0.0
	6月	0	0	2	24	26	10			0.3	0.5	0.1
	7月	0	0	2	14	14	9	0.2		0.4	0.1	
8月	0	0	0	10	10	6	0.1	0.3		0.1		
9月	0	0	0	10	10	11	叩き落とし 虫数 /4か所	0.1	0.1	0.3		
10月	0	0	2	12	14	5		0.2	0.4	0.1		

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)					調査項目		発生程度	
			甚	多	中	少	計	平年値	平均	標準偏差	平年値
チャトゲコナジラミ摘採面	富士山麓	3月	0	0	0	0	60	90	0.8	0.9	14.3
		4月	0	0	0	0	40	84	0.9	1.8	14.3
		5月	0	0	0	0	0	44	0.0	0.0	4.6
		6月	0	0	0	0	20	41	1.0	2.0	5.5
		7月	0	0	0	0	30	57	2.9	5.4	10.8
	静岡北都市	8月	0	0	0	0	10	13	0.1	0.3	1.0
		9月	0	0	0	0	0	22	0.0	0.0	1.0
		10月	0	0	0	0	0	46	0.0	0.0	3.7
		3月	0	0	0	0	70	85	2.2	2.6	12.0
		4月	0	0	0	0	70	88	3.7	4.4	11.9
チャトゲコナジラミ摘採面	牧之原	5月	0	0	0	0	30	34	0.5	0.9	2.4
		6月	0	0	0	0	20	31	0.3	0.6	2.3
		7月	0	0	10	60	70	73	8.5	12.8	19.4
		8月	0	0	0	0	20	14	0.2	0.4	1.0
		9月	0	0	0	0	0	23	0.0	0.0	1.0
	磐小田笠原・	10月	0	0	0	0	10	54	0.1	0.3	4.1
		3月	0	0	10	60	70	82	4.0	7.5	10.7
		4月	0	0	10	70	80	91	4.7	8.3	11.5
		5月	0	0	0	0	10	25	0.1	0.3	1.7
		6月	0	0	0	0	0	36	0.0	0.0	3.0
チャトゲコナジラミ摘採面	川根	7月	0	0	0	0	20	42	0.2	0.4	6.9
		8月	0	0	0	0	0	23	0.0	0.0	1.4
		9月	0	0	0	0	0	15	0.0	0.0	0.7
		10月	0	0	0	0	20	59	0.7	1.8	4.2
	県全体	3月	0	0	0	0	70	86	2.6	3.3	12.2
		4月	0	0	0	0	80	86	4.6	4.5	11.7
		5月	0	0	0	0	10	36	0.2	0.6	2.1
		6月	0	0	0	0	0	44	0.0	0.0	3.0
		7月	0	0	0	0	60	63	2.4	2.9	5.1
チャトゲコナジラミ摘採面	川根	8月	0	0	0	0	40	24	1.3	2.6	1.1
		9月	0	0	0	0	10	27	0.2	0.6	1.2
		10月	0	0	0	0	20	53	0.3	0.6	3.7
	県全体	3月	0	0	10	50	60	89	3.9	8.5	13.5
		4月	0	0	10	70	80	82	4.3	6.2	8.3
チャトゲコナジラミ摘採面	川根	5月	0	0	0	0	10	37	0.1	0.3	3.3
		6月	0	0	10	20	30	40	3.0	6.8	6.8
		7月	0	0	0	0	20	63	0.6	1.3	10.4
		8月	0	0	0	0	10	16	0.2	0.6	0.6
		9月	0	0	0	0	0	16	0.0	0.0	0.8
チャトゲコナジラミ摘採面	川根	10月	0	0	0	0	40	61	1.6	2.7	8.3
	県全体	3月	0	0	4	62	66	86	2.7	5.5	12.6
		4月	0	0	4	66	70	86	3.6	5.7	11.5
		5月	0	0	0	0	12	35	0.2	0.6	2.8
		6月	0	0	2	12	14	38	0.9	3.4	4.1
チャトゲコナジラミ摘採面	川根	7月	0	0	0	0	38	40	2.9	7.0	10.5
		8月	0	0	0	0	16	18	0.4	1.3	1.0
		9月	0	0	0	0	2	21	0.0	0.3	0.9
		10月	0	0	0	0	18	55	0.5	1.6	4.8
	県全体	3月	0	0	0	0	70	85	2.2	2.6	12.0

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,300ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)					調査項目	発生程度	
			甚	多	中	少	計		平均	標準偏差
チャトゲコナジラミ摘採面	富士山麓	3月	0	0	0	0	90	97	3.9	4.4
		4月	0	0	0	0	80	98	3.2	3.0
		5月	0	0	0	0	30	69	0.5	0.9
		6月	0	0	0	0	60	85	2.8	4.1
		7月	0	0	0	0	70	89	3.9	4.2
	静岡北都市	8月	0	0	0	0	60	81	3.3	4.3
		9月	0	0	0	0	50	83	1.6	2.0
		10月	0	0	0	0	60	81	1.9	2.4
		3月	0	0	20	80	100	95	8.7	10.5
		4月	0	0	20	80	100	97	16.6	15.5
チャトゲコナジラミ摘採面	牧之原	5月	0	0	0	0	50	77	0.7	0.9
		6月	0	0	0	0	20	74	1.6	3.2
		7月	0	0	0	0	90	93	5.9	4.9
		8月	0	0	0	0	50	85	2.3	2.9
		9月	0	0	0	0	50	77	1.7	2.3
	磐小田笠原・	10月	0	0	0	0	50	84	4.1	4.9
		3月	0	0	10	90	100	98	9.2	7.8
		4月	0	0	30	70	100	97	16.9	13.3
		5月	0	0	0	0	20	78	1.0	2.0
		6月	0	0	0	0	60	76	1.9	2.2
チャトゲコナジラミ摘採面	川根	7月	0	0	0	0	40	82	0.7	1.0
		8月	0	0	0	0	40	84	2.1	4.7
		9月	0	0	0	0	70	88	2.0	3.1
		10月	0	0	0	0	70	85	3.1	3.1
	県全体	3月	0	0	20	70	90	97	12.6	15.0
		4月	0	0	20	70	90	98	11.7	12.6
		5月	0	0	0	0	20	80	0.5	1.2
		6月	0	0	0	0	40	88	0.5	0.7
		7月	0	0	10	60	70	87	4.8	7.1
チャトゲコナジラミ摘採面	川根	8月	0	0	0	0	50	83	3.6	7.0
		9月	0	0	0	0	70	80	3.4	4.2
		10月	0	0	0	0	60	87	7.4	8.2
	県全体	3月	0	10	20	60	90	99	16.3	19.7
		4月	0	10	20	60	90	99	19.1	19.4
チャトゲコナジラミ摘採面	川根	5月	0	0	0	0	50	87	2.0	3.0
		6月	0	0	0	0	70	80	4.4	7.4
		7月	0	0	10	40	50	88	4.8	7.1
		8月	0	0	0	0	80	80	3.1	4.8
		9月	0	0	0	0	40	81	1.6	2.4
チャトゲコナジラミ摘採面	川根	10月	0	0	0	0	80	84	4.4	6.4
	県全体	3月	0	2	14	78	94	97	10.1	13.4
		4月	0	2	18	72	92	97	13.5	15.0
		5月	0	0	0	0	34	78	0.9	1.9
		6月	0	0	2	50	52	82	2.2	4.4
チャトゲコナジラミ摘採面	川根	7月	0	0	4	60	64	88	3.6	5.4
		8月	0	0	0	2	56	83	2.9	5.0
		9月	0	0	0	0	56	82	2.1	3.0
		10月	0	0	2	64	66	84	4.2	5.7
	県全体	3月	0	0	10	80	90	99	16.3	19.7

チャ (調査点数：50点, 栽培面積：13,300ha)

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率 (%)			調査 項目	発生程度			
			甚	多	中		少	平均	標準偏差	
(カ ン ザ ワ ハ ダ ニ 天 敵)	県全体	3月					0	3	0.0	0.1
		4月					10	7	0.1	0.4
		5月					32	32	叩き	1.1
		6月					62	57	落とし	2.3
		7月					34	46	虫数	0.9
		8月					54	25	/4か所	3.3
		9月					34	23		1.0
		10月					32	16		1.0

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,300ha)

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	甚	程度別発生面積率 (%)			調査 項目	発生程度	
				多	中	少		平均	標準偏差
カ ン ザ ワ ハ ダ ニ 天 敵	山 富 士 麓	3月				0	1	0.0	0.0
		4月				20	8	0.3	0.6
		5月				40	36	0.9	1.3
		6月				50	50	3.5	4.2
		7月				40	35	0.9	1.4
		8月				50	22	0.9	1.0
		9月				40	19	0.6	0.8
		10月				60	13	1.0	1.2
カ ン ザ ワ ハ ダ ニ 天 敵	静 岡 市	3月				0	6	0.0	0.0
		4月				0	10	0.0	0.0
		5月				30	28	0.5	0.8
		6月				80	47	2.0	2.0
		7月				50	54	0.8	1.2
		8月				40	22	0.5	0.7
		9月				40	15	0.7	1.2
		10月				50	16	0.9	0.9
カ ン ザ ワ ハ ダ ニ 天 敵	牧 之 原	3月				0	0	0.0	0.0
		4月				10	7	0.1	0.3
		5月				0	36	0.0	0.0
		6月				70	69	4.2	4.4
		7月				30	42	0.4	0.7
		8月				70	24	5.4	5.5
		9月				40	30	0.8	1.2
		10月				20	15	0.2	0.4
カ ン ザ ワ ハ ダ ニ 天 敵	磐 小 田 原	3月				0	4	0.0	0.0
		4月				10	4	0.1	0.3
		5月				70	42	1.7	1.3
		6月				40	68	2.0	3.2
		7月				40	39	0.4	0.5
		8月				60	19	1.6	1.9
		9月				30	25	0.7	1.2
		10月				20	24	0.6	1.2
カ ン ザ ワ ハ ダ ニ 天 敵	川 根	3月				0	4	0.0	0.0
		4月				10	6	0.1	0.3
		5月				20	16	0.2	0.4
		6月				70	52	2.3	2.6
		7月				10	62	0.1	0.3
		8月				50	36	1.0	1.5
		9月				20	26	0.2	0.4
		10月				10	12	0.1	0.3

4 果樹

かんきつ (調査点数: 30点, 栽培面積: 5,350ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				発生程度		
			甚	多	中	少	計	平均	標準偏差
黒点病	東 部	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	70	70	2.9	5.0
		8月	0	0	10	90	100	8.2	6.4
		9月	0	0	20	70	90	10.3	6.8
	中 部	10月	0	0	30	70	100	12.6	6.6
		6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	60	60	2.0	2.9
		8月	0	0	20	70	90	6.9	7.0
	西 部	9月	0	0	10	90	100	7.0	6.8
		10月	10	0	0	90	100	15.8	26.4
		6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	80	80	2.3	4.6
	県全体	8月	0	0	0	90	90	4.2	4.8
		9月	0	0	10	70	80	4.4	5.7
		10月	0	0	10	90	100	4.5	5.2
		6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
そうか病	東 部	7月	0	0	0	70	70	2.4	4.3
		8月	0	0	10	83	93	6.4	6.4
		9月	0	0	13	77	90	7.2	6.9
		10月	3	0	13	83	100	11.0	16.7
	中 部	3月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		5月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		6月	0	0	0	50	50	0.4	0.8
		6月	0	0	0	20	20	0.1	0.2
	西 部	7月	0	0	0	50	50	1.9	3.0
		8月	0	0	0	20	20	0.1	0.3
		3月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		5月	0	0	0	10	10	0.0	0.1
	県全体	6月	0	0	0	20	20	0.6	1.5
		6月	0	0	0	10	10	0.0	0.1
		7月	0	0	0	20	20	0.1	0.3
		8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
青緑かび病	東 部	3月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		5月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		6月	0	0	0	20	20	0.2	0.7
		6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中 部	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		5月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	西 部	6月	0	0	0	20	20	0.2	0.7
		6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	県全体	3月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		5月	0	0	0	3	3	0.0	0.1
		6月	0	0	0	30	30	0.4	1.0
		6月	0	0	0	0	0	0.1	0.2

かんきつ (調査点数: 30点, 栽培面積: 5,350ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
かいよう病	東 部	3月	0	0	0	0	29	0.0	0.0
		5月	0	0	0	0	5	0.0	0.0
		6月	0	0	0	40	22	1.2	2.2
		6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中 部	7月	0	0	0	10	5	0.0	0.1
		8月	0	0	0	30	9	1.0	2.1
		9月	0	0	0	50	9	0.7	1.1
		10月	0	0	0	30	10	0.6	1.1
	西 部	3月	0	0	0	0	4	0.0	0.0
		5月	0	0	0	0	10	0.0	0.0
		6月	0	0	0	20	11	0.1	0.1
		6月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	県全体	7月	0	0	0	30	0	0.4	0.7
		8月	0	0	0	20	2	0.2	0.4
		9月	0	0	0	20	4	0.7	1.6
		10月	0	0	0	20	3	0.5	1.1
青緑かび病	東 部	3月	0	0	0	0	11	0.0	0.0
		5月	0	0	0	0	12	0.0	0.0
		6月	0	0	0	0	9	0.0	0.0
		6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	中 部	7月	0	0	0	0	4	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月	0	0	0	10	4	0.1	0.3
	西 部	3月	0	0	0	0	15	0.0	0.0
		5月	0	0	0	0	9	0.0	0.0
		6月	0	0	0	20	14	0.4	1.4
		6月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	県全体	7月	0	0	0	13	3	0.1	0.4
		8月	0	0	0	17	4	0.4	1.3
		9月	0	0	0	23	4	0.5	1.2
		10月	0	0	0	20	6	0.4	0.9
青緑かび病	東 部	10月	—	—	0	10	10	0.1	0.3
		11月	—	—	0	70	70	4.0	2.9
		10月	—	—	0	0	—	0.0	0.0
		11月	—	—	0	90	90	4.7	3.8
	中 部	10月	—	—	0	0	—	0.0	0.0
		11月	—	—	0	0	—	0.0	0.0
		10月	—	—	0	0	—	0.0	0.0
		11月	—	—	0	50	50	2.3	2.8
	西 部	10月	—	—	0	3	3	0.0	0.2
		11月	—	—	0	70	70	3.7	3.3
		10月	—	—	0	0	—	0.0	0.0
		11月	—	—	0	0	—	0.0	0.0

かんきつ（調査点数：30点，栽培面積：5,350ha）

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率（％）				調査 項目	発生程度		
			甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値
ミカンハダニ	東 部	3月	0	0	0	30	26	2.4	4.3	1.3
		4月	0	0	10	10	24	7.1	14.8	2.6
		5月	0	10	10	30	22	15.5	23.6	0.9
		6月	0	0	0	20	22	0.2	0.4	1.3
		7月	0	0	0	70	26	6.0	8.1	3.0
		8月	10	0	0	50	35	15.0	26.9	4.7
	中 部	9月	0	0	0	0	14	0.0	0.0	0.7
		10月	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.8
		11月	0	0	0	0	9	0.0	0.0	1.4
		3月	0	0	10	50	56	10.0	14.4	5.2
		4月	10	0	20	30	55	18.7	31.1	9.4
	西 部	5月	0	10	10	20	43	11.8	24.0	3.9
		6月	0	0	0	20	49	3.1	7.3	9.9
		7月	0	0	0	40	49	3.3	5.8	9.3
		8月	0	0	10	30	52	6.8	12.7	8.2
		9月	0	0	0	10	35	0.1	0.3	4.2
		10月	0	0	0	20	34	1.0	2.4	2.6
県全体	東 部	11月	0	0	0	10	36	0.4	1.2	3.0
		3月	0	10	30	50	43	25.9	22.0	2.6
		4月	0	0	40	50	53	22.1	20.4	4.9
		5月	0	10	0	50	25	10.2	21.2	1.6
		6月	10	0	0	30	64	13.0	25.7	8.1
		7月	0	10	10	50	57	15.5	23.7	10.3
	中 部	8月	0	0	0	20	41	0.3	0.6	4.5
		9月	0	0	10	20	33	4.0	9.8	1.8
		10月	0	0	10	40	28	9.7	15.7	1.5
		11月	0	0	10	20	43	6.0	11.1	3.1
		3月	0	3	13	43	60	12.8	18.2	3.0
県全体	西 部	4月	3	0	23	30	43	16.0	24.0	5.8
		5月	0	10	7	33	28	12.5	23.0	2.4
		6月	3	0	0	23	43	5.4	16.3	5.8
		7月	0	3	3	53	40	8.3	15.8	7.9
		8月	3	0	3	33	40	7.4	18.2	5.5
		9月	0	0	3	10	26	1.4	6.0	2.0
	東 部	10月	0	0	3	20	21	3.6	10.2	1.3
		11月	0	0	3	10	27	2.1	7.0	2.2

かんきつ（調査点数：30点，栽培面積：5,350ha）

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率（％）				調査 項目	発生程度		
			甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値
ヤノネカイガラムシ	東 部	3月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
		5月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		6月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		7月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		7月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		8月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
	中 部	9月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		10月	0	0	0	10	10	0.1	0.3	—
		3月	0	0	0	10	10	0.3	0.9	—
		5月	0	0	0	30	30	0.4	0.7	—
		6月	0	0	10	0	10	0.5	1.5	—
県全体	西 部	7月	0	0	0	10	10	0.3	0.9	—
		7月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		8月	0	0	0	10	10	0.3	0.9	—
		9月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		10月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		3月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
	東 部	5月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		6月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		7月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		7月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		8月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
県全体	西 部	9月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		10月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
		3月	0	0	0	3	3	0.1	0.5	0.4
		5月	0	0	0	10	10	0.1	0.4	0.1
		6月	0	0	3	0	3	0.2	0.9	0.1
		7月	0	0	0	3	3	0.1	0.5	0.1
	東 部	7月	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	3	3	0.1	0.5	0.0
		9月	0	0	0	0	5	0.0	0.0	0.1
		10月	0	0	0	3	3	0.0	0.2	0.2

かんきつ（調査点数：30点，栽培面積：5,350ha）

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率（％）						調査項目	発生程度			
			甚	多	中	少	計	平年値		平均	標準偏差	平年値	
チャノキイロアザミウマ	東 部	6月	0	0	0	0	0	0	9	寄生果率（％）	0.0	0.0	0.2
		7月	0	0	0	0	0	0	8		0.0	0.0	0.1
		8月	0	0	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0
		10月	0	0	0	10	10	5	5		0.1	0.3	0.1
		6月	0	0	0	0	0	0	3	果梗部被害度	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0	0	0	41		0.0	0.0	0.3
		8月	0	0	0	20	20	61	61		0.1	0.2	0.8
		9月	0	0	0	80	80	66	66		0.5	0.5	0.9
		10月	0	0	0	70	70	61	61		0.7	0.8	0.6
	中 部	6月	0	0	0	0	0	0	0	果頂部被害度	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0	0	0	4		0.0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	0	7		0.0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0	25		0.0	0.0	0.2
		10月	0	0	0	0	0	0	31		0.0	0.0	0.1
		6月	0	0	0	0	0	0	6	寄生果率（％）	0.0	0.0	0.1
		7月	0	0	0	0	0	0	4		0.0	0.0	0.1
		8月	0	0	0	10	10	3	3		0.1	0.3	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0	7		0.0	0.0	0.1
		10月	0	0	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0
	中 部	6月	0	0	0	0	0	0	1	果梗部被害度	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	40	40	44	44		0.2	0.3	0.5
		8月	0	0	0	10	10	59	59		0.1	0.2	0.8
		9月	0	0	0	50	50	60	60		0.2	0.2	1.3
		10月	0	0	0	80	80	56	56		0.9	1.1	0.7
		6月	0	0	0	0	0	0	0	果頂部被害度	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0	0	3	3		0.0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	8	8		0.0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	10	10	21	21		0.0	0.1	0.1
		10月	0	0	0	0	0	46	46		0.0	0.0	0.4
西 部	6月	0	0	0	0	0	0	16	寄生果率（％）	0.0	0.0	0.3	
	7月	0	0	0	10	10	8	8		0.1	0.3	0.2	
	8月	0	0	0	0	0	6	6		0.0	0.0	0.1	
	9月	0	0	0	0	0	0	8		0.0	0.0	0.1	
	10月	0	0	0	10	10	5	5		0.0	0.0	0.1	
	6月	0	0	0	0	0	1	1	果梗部被害度	0.0	0.0	0.0	
	7月	0	0	0	20	20	48	48		0.1	0.2	0.5	
	8月	0	0	0	90	90	69	69		0.8	0.6	1.3	
	9月	0	0	0	0	0	65	65		0.0	0.0	1.0	
	10月	0	0	0	90	90	62	62		0.7	0.4	0.8	
西 部	6月	0	0	0	0	0	2	2	果頂部被害度	0.0	0.1	0.0	
	7月	0	0	0	0	0	8	8		0.0	0.0	0.1	
	8月	0	0	0	0	0	31	31		0.0	0.0	0.1	
	9月	0	0	0	0	0	50	50		0.0	0.0	0.4	
西 部	10月	0	0	0	70	70	75	75		0.5	0.7	0.9	

かんきつ（調査点数：30点，栽培面積：5,350ha）

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)					調査項目	発生程度			
			発生率(%)						平均	標準偏差	平年値	
			甚	多	中	少	計					平年値
チャノキイロアザミウマ	県全体	6月	0	0	0	0	0	10	寄生果率(%)	0.0	0.0	0.2
		7月	0	0	0	3	3	7		0.0	0.2	0.1
		8月	0	0	0	3	3	4		0.0	0.2	0.1
		9月	0	0	0	0	0	6		0.0	0.0	0.1
		10月	0	0	0	7	7	4		0.2	1.1	0.1
		6月	0	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	20	20	45	果梗部被害度	0.1	0.2	0.5
		8月	0	0	0	40	40	56		0.3	0.5	1.0
		9月	0	0	0	43	43	64		0.2	0.4	1.1
		10月	0	0	0	80	80	60		0.8	0.8	0.7
ナシマルカイガラムシ	東部	6月	0	0	0	3	3	1	果頂部被害度	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0	0	5		0.0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	16		0.0	0.0	0.1
		9月	0	0	0	3	3	33		0.0	0.0	0.1
		10月	0	0	0	23	23	46		0.2	0.5	0.3
		3月	0	0	0	0	0	—	寄生果率(%)	0.0	0.0	—
		7月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		8月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		9月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		10月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
ナシマルカイガラムシ	中部	3月	0	0	0	0	0	—	寄生果率(%)	0.0	0.0	—
		7月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		8月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		9月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		10月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		3月	0	0	0	0	0	—	寄生果率(%)	0.0	0.0	—
		7月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		8月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		9月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		10月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
ナシマルカイガラムシ	西部	3月	0	0	0	0	0	—	寄生果率(%)	0.0	0.0	—
		7月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		8月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		9月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		10月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		3月	0	0	0	0	0	—	寄生果率(%)	0.0	0.0	—
		7月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		8月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		9月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
		10月	0	0	0	0	0	—		0.0	0.0	—
ナシマルカイガラムシ	県全体	3月	0	0	0	0	0	0	寄生果率(%)	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		10月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		10月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0

かんきつ（調査点数：30点，栽培面積：5,350ha）

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率（％）				調査 項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
ルビローラムシ	東 部	3月	0	0	0	30	寄生枝 率 (%)	0.4	0.7
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0
		8月	0	0	0	10		0.7	2.1
		9月	0	0	0	10		1.1	3.3
	中 部	10月	0	0	10	30		4.3	8.8
		3月	0	0	0	30	寄生枝 率 (%)	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0
		8月	0	0	0	10		1.0	3.0
		9月	0	0	0	20		1.0	2.7
		10月	0	0	0	20		0.5	1.0
	西 部	3月	0	0	0	30	寄生枝 率 (%)	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0
		8月	0	0	0	10		0.4	1.2
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0
ツノロウムシ	県全体	10月	0	0	0	0		0.0	0.0
		3月	0	0	0	30	寄生枝 率 (%)	0.1	0.4
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0
		8月	0	0	0	10		0.7	2.2
	東 部	9月	0	0	0	10		0.7	2.5
		10月	0	0	3	17		1.6	5.5
		3月	0	0	0	0	寄生枝 率 (%)	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0
	中 部	8月	0	0	0	0		0.0	0.0
		9月	0	0	0	10		0.1	0.3
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	寄生枝 率 (%)	0.0	0.0
	西 部	7月	0	0	0	0		0.0	0.0
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0
		9月	0	0	0	10		0.2	0.6
		10月	0	0	0	10		0.1	0.3
かんきつ（調査点数：30点，栽培面積：5,350ha）	県全体	3月	0	0	0	0	寄生枝 率 (%)	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0
		9月	0	0	0	10		0.2	0.6
	東 部	10月	0	0	0	10		0.1	0.3
		3月	0	0	0	0	寄生枝 率 (%)	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0
	中 部	9月	0	0	0	0		0.0	0.0
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	寄生枝 率 (%)	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0
	西 部	8月	0	0	0	0		0.0	0.0
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	寄生枝 率 (%)	0.0	0.0
	県全体	7月	0	0	0	0		0.0	0.0
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0
		9月	0	0	0	7		0.1	0.4
		10月	0	0	0	3		0.0	0.2

かんきつ（調査点数：30点，栽培面積：5,350ha）

病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率（％）				調査 項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
イセリヤカイガラムシ	東 部	3月	0	0	0	10	寄生枝 率 (%)	0.1	0.3
		5月	0	0	0	0		0.0	0.0
		6月	0	0	0	0		0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0
	中 部	8月	0	0	0	20		0.2	0.4
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	寄生枝 率 (%)	0.0	0.0
		5月	0	0	0	10		0.1	0.3
		6月	0	0	0	0		0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0
かんきつ（調査点数：30点，栽培面積：5,350ha）	西 部	9月	0	0	0	0		0.0	0.0
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	寄生枝 率 (%)	0.0	0.0
		5月	0	0	0	0		0.0	0.0
	県全体	6月	0	0	0	0		0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0
	東 部	3月	0	0	0	3	寄生枝 率 (%)	0.0	0.2
		5月	0	0	0	3		0.0	0.2
		6月	0	0	0	0		0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0
	中 部	8月	0	0	0	0		0.0	0.0
		9月	0	0	0	7		0.1	0.2
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	寄生枝 率 (%)	0.0	0.0
		5月	0	0	0	0		0.0	0.0
		6月	0	0	0	0		0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0

かんきつ（調査点数：30点，栽培面積：5,350ha）

病害虫名	調査地域	調査時期	調査項目	程度別発生面積率（％）				発生程度	
				甚	多	中	少	平均	標準偏差
カメムシ類	東 部	5月	叩き落	—	—	0	40	0.6	1.0
		6月	とし虫	—	—	0	10	0.1	0.2
		7月	数／5	—	—	0	0	0.0	0.0
		8月	枝	—	—	0	0	0.0	0.0
	中 部	9月	—	—	—	0	10	0.1	0.2
		10月	—	—	—	0	60	1.2	1.5
		5月	叩き落	—	—	0	30	0.4	0.7
		6月	とし虫	—	—	0	0	0.0	0.0
		7月	数／5	—	—	0	0	0.0	0.0
		8月	枝	—	—	0	0	0.0	0.0
アブラムシ類	西 部	9月	叩き落	—	—	0	10	0.8	2.3
		10月	とし虫	—	—	0	40	1.3	2.1
		5月	叩き落	—	—	0	40	0.5	0.7
		6月	とし虫	—	—	0	0	0.0	0.0
	県全体	7月	数／5	—	—	0	0	0.0	0.0
		8月	枝	—	—	0	30	0.2	0.3
		9月	—	—	—	0	20	0.3	0.5
		10月	—	—	—	0	90	1.3	1.0
	県全体	5月	叩き落	—	—	0	37	0.5	0.8
		6月	とし虫	—	—	0	3	0.0	0.1
		7月	数／5	—	—	0	0	0.0	0.0
		8月	枝	—	—	0	10	0.1	0.2

かんきつ（調査点数：30点，栽培面積：5,350ha）

病害虫名	調査地域	調査時期	調査項目	程度別発生面積率（％）				発生程度	
				甚	多	中	少	平均	標準偏差
アブラムシ類	東 部	4月	寄生	0	0	0	0	0.0	0.0
		5月	新梢率	0	0	0	0	0.0	0.0
		6月	(%)	0	0	0	0	0.0	0.0
		7月	—	0	0	0	3	0.0	0.0
	中 部	8月	—	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月	—	0	0	0	50	1.1	1.2
		4月	寄生	0	0	0	0	0.0	0.0
		5月	新梢率	0	0	0	0	0.0	0.0
		6月	(%)	0	0	0	0	0.0	0.0
		7月	—	0	0	0	10	0.3	0.9
アブラムシ類	西 部	8月	—	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月	—	0	0	0	20	0.4	0.8
		4月	寄生	0	0	0	0	0.0	0.0
		5月	新梢率	0	0	0	10	0.1	0.3
	県全体	6月	(%)	0	0	0	0	0.0	0.0
		7月	—	0	0	0	0	0.0	0.0
		8月	—	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月	—	0	0	0	0	0.0	0.0
	県全体	4月	寄生	0	0	0	0	0.0	0.0
		5月	新梢率	0	0	0	3	0.0	0.2
		6月	(%)	0	0	0	0	0.0	0.0
		7月	—	0	0	0	3	0.1	0.5

中晩柑（調査点数：10点，栽培面積：430ha）

病害虫名	調査時期	調査項目	程度別発生面積率（％）				発生程度	
			甚	多	中	少	平均	標準偏差
かいよう病	3月	葉の発	0	0	0	30	0.6	1.1
	4月	病度	0	0	0	60	1.4	1.8
	5月	—	0	0	0	0	0.0	0.0
	6月	—	0	0	10	30	1.5	3.4
	10月	—	0	0	10	30	4.2	9.4
	3月	果実の	0	0	0	20	0.0	0.1
	4月	発病度	0	0	0	30	1.0	2.5
	5月	—	0	0	10	30	1.6	3.4
	6月	—	0	0	0	40	1.3	1.8
	10月	—	0	0	0	20	1.7	3.5

中晩柑の栽培面積は、なつみかん、はつきく、いよかん、ネーブルの合計値

なし (調査点数：10点、栽培面積：116 ha)

病害虫名	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度		
		甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年
赤星病	5月	0	0	0	0	11 発病葉率 (%)	0.0	0.0	0.2
	5月	0	0	0	10	4 発病葉率 (%)	0.1	0.3	0.1
	7月	0	0	10	20	5 発病葉率 (%)	1.5	3.9	0.4
黒星病	5月	0	0	10	0	8 発病果率 (%)	0.9	2.7	0.2
	7月	0	0	0	0	6 発病果率 (%)	0.0	0.0	0.1
アブラムシ類	5月	0	0	0	20	- 寄生新梢率 (%)	0.6	1.5	-
	7月	0	0	0	0	- 寄生新梢率 (%)	0.0	0.0	-
カメムシ類	5月	0	0	0	0	2 叩き落とし虫数	0.0	0.0	0.0
	7月	0	0	0	0	1 叩き落とし虫数	0.0	0.0	0.2
	5月	0	0	10	10	1 被害果率 (%)	0.1	0.3	0.0
シジメ類	7月	0	0	0	0	3 被害果率 (%)	0.0	0.0	0.1
	7月	0	0	0	0	2 被害果率 (%)	0.0	0.0	0.0
ハダニ類	5月	0	0	0	0	2 寄生葉率 (%)	0.0	0.0	0.0
	7月	0	0	0	40	25 寄生葉率 (%)	1.7	2.6	2.9
ハヤシメ類	5月	0	0	0	0	3 被害果率 (%)	0.0	0.0	0.04
	7月	0	0	0	0	0 被害果率 (%)	0.0	0.0	0.0

かき (調査点数：10点、栽培面積：380ha)

病害虫名	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度		
		甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年
炭疽病	9月	0	0	0	0	0 発病葉率 (%)	0.0	0.0	0.0
	9月	0	0	0	10	10 発病葉率 (%)	0.2	0.6	9.9
	5月	0	0	0	20	0 発病葉率 (%)	0.2	0.4	0.0
うどんこ病	8月	0	0	0	0	5 発病葉率 (%)	0.0	0.0	0.1
	9月	0	0	0	0	12 発病葉率 (%)	0.0	0.0	0.2
カメムシ類	5月	0	0	0	0	0 叩き落とし虫数 / 5枝	0.0	0.0	0.0
	6月	0	0	0	0	0 叩き落とし虫数 / 5枝	0.0	0.0	0.0
	7月	0	0	0	0	1 叩き落とし虫数 / 5枝	0.0	0.0	0.0
	8月	0	0	0	0	2 叩き落とし虫数 / 5枝	0.0	0.0	0.0
	9月	0	10	0	20	7 叩き落とし虫数 / 5枝	1.4	3.9	0.1
カキハダシガ	7月	0	0	0	0	1 被害果率 (%)	0.0	0.0	0.0
	8月	0	0	0	0	17 被害果率 (%)	0.0	0.0	0.4
	10月	10	0	0	10	44 被害果率 (%)	2.1	6.3	1.6
カキハダシガ	6月	0	0	0	0	0 被害果率 (%)	0.0	0.0	0.0
	8月	0	0	0	0	0 被害果率 (%)	0.0	0.0	0.0
チャノミダシガ	6月	0	0	0	0	5 寄生果率 (%)	0.0	0.0	0.1
	7月	0	0	0	0	1 寄生果率 (%)	0.0	0.0	0.0
	6月	0	0	0	0	6 被害果率 (%)	0.0	0.0	0.1
チャノミダシガ	7月	0	0	0	10	5 被害果率 (%)	0.1	0.3	0.1
	8月	0	0	0	0	4 被害果率 (%)	0.0	0.0	0.0
カキハダシガ	5月	0	0	0	0	1 被害果率 (%)	0.0	0.0	0.0
	6月	0	0	0	0	0 被害果率 (%)	0.0	0.0	0.0
	5月	0	0	0	0	0 寄生果率 (%)	0.0	0.0	0.0
カキハダシガ	6月	0	0	0	0	22 寄生果率 (%)	0.0	0.0	0.0
	7月	0	0	0	20	22 寄生果率 (%)	0.3	0.6	0.7

キウイフルーツ (調査点数：10点、栽培面積：101ha)

病害虫名	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度		
		甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年
かいよう病	4月	0	0	20	30	50 発病葉率 (%)	1.7	2.4	-
	5月	10	0	10	50	70 発病葉率 (%)	7.2	17.7	-
	6月	10	10	20	40	80 発病葉率 (%)	16.5	28.4	-